

神州醫學社新編

增註
徐洄溪古方新解

上海廣文書局出版



中華民國十年四月初版

增註
古方新解 (全二冊)

價洋八角

編輯者

青浦陸士謬

印刷者

上海廣文書局

發行者

上海世界書局

版權所有
不准翻印

總發行所

上海四馬路

世界書局



● 世 界 書 局 出 版 書 目 ●

最近醫書

醫學南針

一厚冊 七角

新編 葉天士醫案

二厚冊 九角

新編 葉天士女科醫案

一冊 四角

新編 葉天士幼科醫案

一冊 四角

新編 薛生白醫案

一冊 四角

葉天士手集秘方

一厚冊 五角

增註 徐靈胎古方新解

二厚冊 八角

補增 單方大全

一厚冊 六角

續刊醫書預告

評加 溫病條辨

四冊 六角

批增 溫熱經緯

四冊 六角

新編 吳鞠通醫案

二冊 五角

新編 王潛齋分類醫案

二冊 六角

醫學南針續編

一厚冊 八角

柯韻伯傷寒三書

一冊 五角

廣註 素靈類纂

三冊 一元



增註古方新解 卷五

吳江徐靈胎洄溪著

青浦陸士諤編訂

(一) 喘門

素問

經脈別論。夜行則喘出於腎。淫氣病肺。有所墮恐。喘出於肝。淫氣害脾。有所驚恐。喘出於肺。淫氣傷心。度水跌仆。喘出於腎與骨。當是之時。勇者氣行則已。怯者則著而為病也。陽明脈解篇。陽明厥則喘而惋。惋則惡人。帝曰。或喘而死。或喘而生者。何也。岐伯曰。厥逆連臟則死。連經則生。脈要精微論。肝脈搏堅而長。因血在脇下。令人喘逆。逆調論。腎者水臟。主津液。主卧與喘也。此句又為喘之總訣生氣通天論。因於暑汗煩則喘喝。靜則多言。陰陽別論。陰爭於內。陽擾於外。魄汗未藏。四逆而起。起則熏肺。使人喘鳴。水熱穴論。水病者下為跗腫。大腹上為喘呼。不得卧者。標本俱病。故肺為喘呼。腎為水腫。肺為逆不得卧。

金匱

上氣面浮腫肩息。其脈浮大不治。又加痢尤甚。

喘方

麥冬湯

金匱

大逆上氣咽喉不利。止逆下氣此主之。



麥冬升一

半夏升七

人參

甘草各二

粳米合三

大棗枝十二

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃

之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

喻嘉言曰

此方治胃中津液乾枯虛火上炎治本之良法也夫用降火之藥而火反升用寒涼之藥而熱轉熾者徒知與火熱相爭者正氣不致津液不生不維無益而反害之矣凡肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也本草有知母之名者謂肺藉其清涼知清涼為肺之母也有貝母之名者謂肺藉其豁痰豁痰為肺之母也然屢試於火逆上氣咽喉不利之證而屢不應名不稱矣孰知仲景妙法於麥冬人參甘草大棗粳米大補中氣以生津液津液隊中又增入半夏辛溫之味以開胃行津而助潤肺宜特用其利咽下氣哉顧其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功矣

桂枝加厚朴杏仁湯傷寒論

喘家主之

於桂枝湯內加厚朴二兩

杏仁五十個

餘依

前法

柯韻伯曰

治太陽下後微喘而表未解者夫喘為麻黃症方中治喘者功在杏仁桂枝本不治喘此因妄下後表雖不解腠理已疎則不當用麻黃而宜桂枝矣所以宜桂枝者以其中有芍藥也既有芍藥之斂若但加杏仁則喘雖微恐不能勝任必加厚朴之辛溫佐桂以解肌佐杏仁以降氣故凡喘家不當用麻黃湯而作桂枝湯者加厚朴杏仁為佳法矣

麻黃杏仁甘草石膏湯傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃四兩

杏仁五十個

甘草二兩

石膏半斤

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongboo

右四味以水七升。先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥煮取二升。去滓。溫服一升。

即越婢湯

加杏仁
去薑棗

柯韻伯曰

此溫病發汗逐邪之主劑也。凡冬不藏精之人。熱邪內伏於藏府。至春風解凍。伏邪自內而出。法

當乘其勢而汗之。勢隨汗散矣。然發汗之劑。多用桂枝。此雖頭項強痛。反不惡寒而渴。是有熱而無寒。桂枝下咽。陽盛則弊。故於麻黃湯去桂枝之辛熱。易石膏之甘寒。以解表裡俱熱之症。岐伯所云未滿三升。可汗而已者。此法是也。此病得於寒時。而發於風令。故又名風溫。其脉陰陽俱浮。其症自汗身重。蓋陽浮則獨於衛外而閉氣。故身重。當用麻黃開表以逐邪。陰浮不能藏精而汗出。當用石膏鎮陰以清火。表裡俱熱。則中氣不運。升降不得自如。故多眠息。語言難出。當用杏仁甘草以調氣。此方備升降輕重之性。足以當之。若攻下太重。降法。此粗工促病之術也。凡風寒在表。頭痛發熱惡寒無汗者。必用麻黃發汗。汗後復煩。更用桂枝發汗。若溫病發汗。已而身灼熱。是內熱猖獗。雖汗出而喘。不可更用桂枝湯。蓋溫暑之邪。當與汗俱出。而勿得止其汗。即灼然之大熱。仍當用此方開表以清裡。降火而平喘。蓋治內蘊之大邪。與外感之餘熱不同法也。若被下而小便不利。直視失溲者。真陰虛極而不治。若汗出而喘。是勢仍從外越。雖未下前之大熱。因下而稍輕。仍當涼散。亦不得仿風寒未解之例。下後氣上冲者。更行桂枝湯。是方也。溫病初起。可用以解表而清裡。汗後可復用。下後可復用。與風寒不解而用桂枝湯同法。仲景因治風寒汗下不解之症。必須桂枝。故特出此涼解之義。以比類桂枝加厚朴杏仁湯證。正與風寒溫病分涇渭處。合觀溫病提綱。而大旨顯然矣。此大青龍之變局。白虎湯之先着也。石膏為清大重劑。青龍白虎皆賴以建功。然用之謹甚。故青龍以惡寒脈緊。兼用姜桂以扶衛外之陽。白虎以汗後煩渴。兼用參米以保胃腕之陽也。此但熱無寒。佐姜桂則脉流薄疾。斑黃狂亂作矣。此但熱不虛。加參米則食入於陰。氣長於陽。詭語腹脹矣。凡外感之汗下後。汗出而喘為實。重在存陰者。不必慮其亡陽也。然此為解表之劑。若無喘。語言難出等證。則有白虎湯之證治矣。此方治溫病表裡之實。白虎加參米。

治溫病表裡之虛。相須相濟者也。若葛根黃連黃芩湯。則治利而不治喘。要知溫病下後無利不止證。葛根黃連之燥。非治溫藥。且麻黃專於外達。與葛根之和。中發表不同。石膏甘潤。與黃連之苦燥懸殊。同是涼解表裡。同是汗出而喘。而用藥有毫釐千里之辨矣。

定喘湯

振生方

治肺寒膈熱哮喘。

麻黃

款冬花

半夏

桑皮

各三錢

蘇子

二錢

杏仁

一錢五分

白果

二十枚

黃芩

甘草

各一錢

右以水煎。徐徐服。

皺肺丸

治喘。

款冬花

知母

秦艽

百部

去心

紫苑

貝母

阿膠

糯米

炒各一兩

杏仁

另研四兩

右為末。將羊肺一具。先以水灌洗。看容得水多少。即更添些。煮杏仁令沸。濾過。灌入肺中。繫定以糯米泔煮熟。研爛成膏。搜和前藥末。杵數千下。丸梧子大。每服五十丸。

食前桑白皮煎湯下。

清燥救肺湯

治臆鬱喘嘔。

桑葉

三錢經霜者

石膏

二錢半炒

甘草

一錢

胡麻仁

一錢炒研

阿膠

八分

人參

七分

杏仁

七分

去皮夫

枇杷葉

一片去毛蜜炙

麥冬

一錢二分

右九味以水一碗。煎六分。頻頻二三。次滾熱服。



喻嘉言曰按諸氣臍鬱之屬於肺者。於肺之燥也。而古今治鬱之方。用辛香行氣。絕無一方治肺之燥者。諸痿喘嘔之屬於上者。亦屬於肺之燥也。而古今治法。以痿嘔屬陽明。以喘屬肺。是則痿與嘔屬之中下。而惟喘屬上矣。所以亦無一方及於肺之燥也。即喘之屬於肺者。非表即下。非行氣即瀉氣。間有一二用潤劑者。又不得其肯綮。今擬此方名清燥掇肺。大約以胃為主。胃土為肺金之母也。其天冬知母能清金滋水。以苦寒而不用。至如苦寒降火之藥。尤在所忌。蓋肺金自至於燥。所存陰氣不過一綫耳。倘更以苦寒下其氣。傷其胃。其人尚有生理乎。誠做此增損。以救肺燥變生諸症。庶克有濟耳。

柯韻伯曰古方用香燥之品。以治氣鬱。不獲奏効者。以火就燥也。惟繆仲醇知之。故用甘涼滋潤之品。以清金保肺立法。喻氏宗其旨。集諸潤劑。而製清燥救肺湯。用意深取藥當。無遺蘊矣。石膏麥冬。稟西方之色。多液而甘寒。培肺金主氣之源。而氣可不鬱。土為金母。子病則母虛。用甘草調補中宮主氣之源。而金有所恃。金燥則水無以食氣而相生。母令子虛矣。取阿膠胡麻黑色通腎者。滋其陰。以上通水生之源。而金始不孤。西方虛則東實矣。木實金平之二葉。稟東方之色。入通於肝。枇杷葉外應毫毛。固肝家之肺藥。而經霜之桑葉。非肺家之肝藥乎。損其肺者益其氣。人參之甘以補氣。氣有餘便是大。故杏仁佐之。苦以降氣。氣降火亦降。而治節有權。氣行則不鬱。諸痿喘嘔自除矣。要知諸氣臍鬱。則肺氣必大虛。若泥於肺氣傷肺之說。而不用人參。必鬱不開而大愈熾。皮聚毛落。喘而不休。此名之救肺。涼而能補之謂也。若謂實火可瀉。而久服芩連。反從大化亡可立待耳。愚所以服膺此方而深贊之。

小青龍加石膏湯 越婢加半夏湯

俱見咳嗽

按此二方為喘病之主方。其餘眾方。意不能外此。即有他法。必有別因。當隨症增減

也。

麻黃湯

見傷寒

資生腎氣丸

瀉白散

錢一

黑錫丸

俱見通治

按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

(二) 臃脹水腫門

靈素

靈素論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外四字總括明透排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脹帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也臃中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀榮氣循脈衛氣逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹臃脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間皤皤然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也臃脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘕肉内生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉瘀則留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下陰陽別論云

陰陽結邪。多陰少陽曰石水。少腹腫。邪氣臌。臌病形篇。督脈微大為石水。起臍已下至小腹垂垂然。上至胃脘。死不治。水為有形之物。故按之即起。膚脈為無形之氣。故按之不堅。故月事不行。各有定理也。至石水則在少腹之中。水結不散之症。若臌脹則非氣非水。臌病皮肉俱堅腫。邪盛正衰。難為治矣。

素腹中論。黃帝問曰。有病心腹滿。旦食則不暮食。此為何病。岐伯對曰。名為臌脹。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之以雞矢醴。一劑知。二劑已。水熱穴論。黃帝問曰。少陰何以主腎。腎何以主水。岐伯對曰。腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者太陰也。少陰者冬脈也。故其本在腎。其末在肺。皆聚水也。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。故凡水病。下為跗腫。大腹上為喘呼。不得卧者。標本俱病。氣厥論。肺移寒於腎為涌水。涌水者按腹不堅。水氣客於大腸。疾行則鳴濯濯。如囊裏漿水之病也。陰陽應象大論。濁氣在上則生臌脹。

金匱

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。風水。其脈自浮。外證。骨節疼痛。惡風。皮水。其脈亦浮。外證。跗腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。當發其汗。正水。其脈沈遲。外證。自喘。石水。其脈自沈。外證。腹滿不喘。黃汗。其脈沈遲。身發熱。胸滿。四肢頭面腫。久不愈。必致癰脹。脈浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相搏。身發熱。風強為隱疹。身發熱。身體為痒。痒為泄風。久為痂。癰氣強則為水。難以俛仰。風氣相擊。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。寸口脈沈滑者。中有水氣。面目腫。大有熱。名曰

風水視人之目。裹上微擁。如蠶新卧起狀。其頸脈動時時咳。按其手足上陷而不起者。風水太陽病。脈浮而緊。法當骨節疼痛。反不疼。身體反重而酸。其人不渴。汗出即愈。此為風水惡寒者。此為極虛。發汗得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痹。胸中窒不能食。反聚痛。暮躁不得眠。此為黃汗。痛在骨節。欬而喘。不渴者。此為肺脹。其狀如腫。發汗即愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。裏水者。一身面目黃腫。其脈沈。小便不利。故令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越婢加白朮湯主之。少陰脈緊而沈。緊則為痛。沈則為水。小便即難。脈得諸沈。當責有水。身體腫重。水病脈出者死。夫水病人目下有卧蠶。面目鮮澤。脈伏。其人消渴病。水腹大小便不利。其脈沈絕者。有水可下。問曰。病下痢後。渴飲水。小便不利。腹滿因腫者。何也。答曰。此法當病水。若小便自利及汗出者。自當愈。心水者。其身重而少氣。不得卧。煩而躁。其人陰腫。肝水者。其腹大不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。肺水者。其身腫。小便難。時時鴨澹。脾水者。其腹大四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。腎水者。其腹大。臍腫腰痛。不得溺。陰下濕。如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。師曰。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰以上腫。當發汗。乃愈。師曰。寸口脈沉而遲。沉則為水。遲則為寒。寒水相搏。跌陽脈伏。水穀不化。脾氣衰則鶩澹。胃氣衰則身腫。少陽脈卑。少陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經為血。血不利則為水。名血分。師曰。寸口脈遲而濇。遲則為寒。濇為血不足。跌陽脈微而遲。微則為氣。遲則為寒。

寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿脇鳴。相逐氣轉。膀胱榮衛俱勞。陽氣不通。即身冷。陰氣不通。即骨疼。陽前通則惡寒。陰前通則痹不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺溺。名曰氣分。氣分非水病。但此病無所附。因血分而顯。及之也。

病源

水分候 水分者。言腎氣虛弱。不能制水。令水氣分散。流布四肢。故云水分。但四肢皮膚虛腫。聶聶而動者。名水分也。

燥水候 燥水謂水氣溢於皮膚。因令腫滿。以指畫肉上。則隱隱成文字者。名曰燥水也。

水腫之病。千頭萬緒。雖在形體。而實內連臟腑。不但難愈。即愈最易復。病復即更難再愈。所以內經針水病之穴。多至百外。而調養亦須百日。反不若臌脹之證。一愈可以不再發。治此證者。非醫者能審定病源。神而明之。病者能隨時有察。潛心調攝。鮮有獲全者。此卷載水腫之方。最備。但病臌脹水腫。方情不同。各有所宜。當細辨之。

雞矢醴方 問素 治心腹滿。旦食不暮食。

雞矢 八合 研 炒焦 無灰酒 三碗

右共煎乾至一半許。用布濾取汁。五更熱飲。則腹鳴。辰巳時行二三次。皆黑水也。次日覺足面漸有絢紋。又飲一次。則漸絢至膝上。而病愈矣。

防已茯苓湯 金匱 皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。主之。



防己 黃耆 桂枝 各三兩 甘草 二兩 茯苓 六兩

右五味以水六升。煮取二升。分溫三服。

徐忠可曰：藥亦同防己黃耆湯。但去朮加桂苓者。風水之濕。在經絡近內。皮水之濕。在皮膚近外。故但以苓協桂。滲周身之濕。而不以朮燥其中氣也。不用姜棗者。濕不在上焦之營衛。無取乎宣之也。

甘草麻黃湯 金匱 裏水注之

甘草 二兩 麻黃 四兩

右二味以水五升。先煮麻黃。去上沫。納甘草煮取三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再

服。慎風寒。

麻黃附子湯 金匱 水之為病。其脈沉小屬少陰。浮者為風。無水。虛脹者為氣水。發其汗即

已。脈沉者宜麻黃附子湯。浮者宜杏子湯。 金匱注云：杏子湯未見。恐是麻黃杏仁甘草石膏湯。

麻黃 三兩 甘草 二兩 附子 一枚

右三味以水七升。先煮麻黃。去上沫。納諸藥煮取二升半。溫服八分。日三服。 發汗為治水要

訣。此乃發腎水之汗也。

陳元犀曰：師言脈沈小屬少陰。用附子溫經散寒。主石水之病。即可知脈浮屬太陽。用杏子啟太陰之氣。主

正水之病。為變其脈証言之也。恐石膏之凝寒。大有關於脾腎。故不可用焉。余以為杏子湯即麻黃杏仁甘草三味。不知是否。且俟後之學者。

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 金匱 氣分。心下堅大如盤。邊如旋杯。水飲所作。此方主



之。

桂枝 生薑 各三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 麻黃 細辛 各二兩 附子 一枚

右七味以水七升。先煮麻黃。去上沫。納諸藥。煮取二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。即愈。

枳朮湯 金匱 心下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。此方主之。

枳實 七枚 白朮 二兩

右二味以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中軟即散。

蒲灰散 金匱 治水便利。

蒲灰 七分 滑石 三分

右二味杵為散。飲服方寸匕。日三服。

已椒蘆黃圓 金匱 腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。此方主之。

防己 椒目 葶蘆 大黃 各一兩

右四味末之。蜜丸如梧子大。先食飲服。一丸。日三服。稍增。口中有津液。渴者加芒硝

半兩。 此治腸間之水。外症不必有水象也。

牡蠣澤瀉散 傷寒論 大病瘥後。從腰以下有水氣者。主之。

牡蠣 熬 澤瀉 栝蒌根 蜀漆 洗去腥 葶蘆 熬 商陸根 熬 海藻 洗去鹹



右七味異搗下篩為散更入白中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三

郭潤安曰壯蠅澤瀉散證水蓄於下上焦之氣不能為之化故類葦商陸葦廔以從上下降澤瀉海藻以散水中清氣上行括蕒壯蠅則一以清其清一以下召其濁而使之化耳又曰壯蠅澤瀉散治腰以下水氣不行必先使商陸葦廔從肺及腎開其來源之壅而後壯蠅水藻之賴堅蜀漆澤瀉之開泄方能得力用括蕒根者恐行水之氣過駛有傷上焦之陰仍使之從脾及陰還歸於上如常山之蛇擊其首則尾應擊其尾則首應者不殊也

大腹水腫方金十治氣息不通命在旦夕者

牛黃分二 椒目分三 昆布 海藻 牽牛子 桂心各八分 葶廔分六

右七味為末別搗葶廔如膏合和丸如桐子飲服十丸日二稍加小便利為度王觀
九年漢陽王患水醫所不治余處此方日夜尿一二升五六日即瘥

麻豆湯金十治遍身腫小便澀者

麻黃二升 熱研 烏豆一斗以水四斗 煮取汁一斗 桑根白皮切五升

右三味以豆汁納藥煮取六升一服一升日二服三日令盡豆不多不 能取效

十水九金十

第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝大戟主之 第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶廔主之 第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾甘遂主之 第四之水先從腳腫上氣而欬名曰白水其根在肺藁本主之 第五之水先從足



跌腫名曰黑水其根在腎連翹主之 第六之水先從面至足腫名曰元水其根在膽
羌花主之 第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之
第八之水先四肢小腫其腹獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之 第九之水
先從小腸滿名曰暴水其根在小腸巴豆主之 第十之水乍盛乍虛乍來乍去名曰
氣水其根在大腸赤小豆主之

右十病藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服一丸如小豆日三飲下病者
服三丸弱者當以意節之十水之名病源亦詳載其狀今立此

舟車神祐方河間

治水腫水脹形氣俱實者

黑牽牛兩四

大黃二兩

甘遂一兩

橘紅

大戟麵裹

羌花醋炒

青皮炒各兩

木香錢五

檳榔錢五

輕粉錢一

衰根

右為末水丸每服五分五更滾水下大便利三次為度若一二次不通利次日漸加
至一錢若服後大便利四五次或形氣不支則減其服三分二分俱可或隔一二三
日服一次以愈為度甚者忌食鹽醬百日

大聖濟川丸

方類

大黃

牽牛

郁李仁

木香

芒硝

甘遂

右為末蜜丸桐子大諒人虛實服之

此下峻劑

木香散 方類 治單腹脹

木香 青皮 白朮 薑黃 豆蔻 各半 阿魏 華澄茄 各一

右為末。醋丸如豆大。每服二十丸。薑湯送下。

葶藶丸 外 治水腫及脚並虛腫。

葶藶子 兩半 牽牛子 牛兩生 澤漆葉 海藻 洗去鹽炙 昆布 如上

甘遂 熟 椒目 郁李仁 各三分 桂心 一分

右為末。蜜丸桐子大。一服十五丸。日再加至二十丸。

療水病洪腫氣脹不消食方 外

香薷納釜中。以水淹之。出香薷上數寸。煮濃汁。去滓。煎令可丸。桐子大。服五丸。日三。小

便多為度。 又法

療患氣兼水身面腫垂死方 外

桑白皮 茯苓 郁李仁 各四 橘皮 二兩 海藻 三兩 赤小豆 一升

右六味以水八升。煮二升半。分三服。

五香散 方局 升降諸氣。宣利三焦。疏導壅滯。發散邪熱。治陰陽之氣鬱結不消。諸熱蘊毒。

腫痛結核中脘不快。心腹脹滿。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香 分等



南京中醫藥大學圖書館藏