

驗方新編卷之九目錄

婦人科調經門

不及期而經先行

經過期後行

一月而經再行

數月而經一行

經行或前或後

經行或多或少

逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點

一月

常三四次面色青黃

經行不止來往無時

經來不止形如魚腦足痛不能動履

經來不止形如牛膜昏迷倒地



經來不止或下血胞大如雞蛋割開內如石榴子昏

迷不知人事

經來有白蟲如鷄腸滿腹疼痛

經來成塊如葱白又如死猪血黑色頭昏目暗唇麻

經來結成一塊如皂角一條痛不可忍不思飲食

腹大如鼓經如蝦蟆子 經來如禽獸形

經來過期形如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白

帶喉中臭如魚腥惡心吐逆

經來紫色

經來淡色

經如綠水

經如黃水



經來脇內一跔作痛其色深黃

經來全白色五心煩熱小便作痛

經來疼痛小便如刀割

經來狂言如見鬼神

經來常嘔吐不思飲食

經來食物即吐

經來咳嗽

經來大小便俱出

經來腹痛

經後腹痛

經來潮熱不思飲食

經少腹大如漏胎狀

經閉不通

通治經閉

經閉腹大如孕

室女經閉遍身浮腫

室女因開甌爲熱氣所衝面目腫大經水不通

婦女瘖疾經水不調面色黃瘦咳嗽發燒或吐血或

不吐血不思飲食精神疲倦

經逆上行從口鼻出

經水從口鼻出咳嗽

經來房事相撞

血崩不止

老婦血崩

崩中漏下五色

崩久成漏連年不休

白帶白濁白淫

赤白帶下

赤白帶下脘腹疼痛

五色帶下

婦人科種子門

種子芻言

采命延生種子戒期



求嗣得孕法

種子諸方

子宮寒冷不能受孕

婦人科胎前門

保產諸方

孕婦惡食嘔吐

孕婦吞酸

孕婦頭痛

孕婦目鼻咽喉口齒唇舌諸病

孕婦口渴

孕婦咳嗽

孕婦心痛不可忍

孕婦心忪

胎上衝心

孕婦乳腫

孕婦腹癢

孕婦腰痛



孕婦小便不通

孕婦大便虛急不出

孕婦泄瀉

孕婦痢疾

孕婦瘡疾

孕婦霍亂

孕婦中暑

孕婦中濕

孕婦中風

孕婦癰疾

孕婦遍身搔癢

子懸

子煩

子癰

子腫

子滿

子淋

子鳴

孕婦無故心虛驚恐悲泣狀如遇邪



南京中医药大学图书馆版权所有

孕婦至七八九個月內忽然聲啞不語

孕婦忽然倒地

胎動不安

胎動下血不止

撲跌胎動腹痛

孕婦漏胎

小便多而動紅

誤服藥胎欲墮

臨產須知

催生諸方

臨產胡言亂語

臨產暈絕不省人事

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不開

難產

救逆產

救橫產

救側產



救碍產

一切橫生逆產

盤腸生

臨產兒尚未生有物先出形如胞衣不開

胞衣不下

子死腹中

婦人科產後門

產子氣絕不啼

產後宜擠兩乳

產後乳汁不通

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹

產後子腸掉出一截

產後腸出不收

產後子宮脫出

產後尿胞脫出



產後胎膜脫出

產後尿胞損破小便瀉流

產後癰疽突出

產後陰蟲一對

產後陰戶翻出疼痛

產後陰戶不閉或脫出

產後陰戶腫痛或手足彎屈不能伸轉

產後惡露不止

產後惡露不下

產後血崩

產後一月惡露重來血水不止倒地不省人事

產後癰塊

產後發狂

產後乍見鬼神

產後眼見黑花昏眩

產後血暈

產後中風



產後中風聲啞不語心口發紅如鏡

產後肝虛風從內生 產後不語

產後風癱

產後鼻血不止

產後口渴

產後口渴痞悶

產後舌出

產後腹脹滿悶嘔吐惡心

產後嘔水

產後呃逆

產後咳嗽

產後氣喘

產後面赤發喘欲死

產後心痛

產後腹痛

產後腹中有塊上下時動痛不可忍

產後血氣痛不可忍

產後脇痛

產後頭痛

產後汗出不止兼變症

產後發熱

產後乍寒乍熱似癰

產後瘧疾

產後傷寒

產後腰痛

產後遍身疼痛

產後身有冷處數塊日久不愈

產後浮腫

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉

產後痢疾

產後上吐下痢

產後大便不通

產後小便多及夜睡遺尿在床



產後小便不通或短少

產後熱淋澀痛

產後尿血

產後癰疽

回生丹論

婦人科雜治

血風頭痛

烏髮長髮

乳癰乳巖

婦女性妬

陰外生瘡

陰戶生瘡或癢或痛或腫

陰戶生瘡生虫身發寒熱狀似傷寒又似勞病

陰戶突出一物如蛇如菌或如鷄冠

陰戶生物如茄

陰中生核腫大不消

吊陰痛不可忍

陰戶吹響

陰戶疼痛

裹小腳法

陰戶翻出仰臥不能轉動

陰戶寒冷

陰毛生八腳虱

腳生雞眼



驗方新編卷之九

婦人科調經門

凡服調經之藥宜於行經時多服數劑下次經期即準矣若丸藥則宜常久服之乃效不及期而經先行

如德性溫和素無他疾者責其血盛且有熱也用

歸身

川芎

各七

赤芍

生地

知母

麥冬

地骨皮

各壹錢

甘草

五分

水煎空心服

如性急燥多怒多妒者責其氣血俱熱且有鬱也用

製

香附炒研歸身

川芎

白芍

條芩炒黃連

各壹錢

生草

愈方新編

卷之九

婦人科調經門



南京中医药大学图书馆版权所有

五分生地七分水煎服

如形瘦素無他疾者責其血熱也用歸身生地

芎 赤芎 黃芩 炒黃連 壹錢 生草 五分 水煎食前服

服三補丸和之

三補丸 專治血熱

黃芩 黃柏 黃連 等分 炒各 蜜丸 開

水下

如形瘦素多疾且熱者責其衝任內傷也用四物人參知

母湯 歸身 白芎 台黨 熟地 知母 麥冬 壹錢

錢川芎七分炙草五分姜棗引水煎食前服更宜常服地

黃丸



地黃丸

治女子衝任損傷及腎虛血枯血少血閉之症

用

熟地

八兩

山藥

四兩

山黃肉

四兩

白茯苓

丹皮

桂枝

芍藥

澤瀉

去毛各

蜜為丸

空心

開水

下

如曾誤服辛熱煖宮之藥者責其衝任伏火也用

神物加

黃柏知母湯

歸身

赤芍

生地

黃柏

炒

知母

水

煎

通

各壹錢

川芎

七分

生草

二分

水煎

食前服

更服

三補丸

前見

和之

如形肥多痰多鬱者責其血虛氣熱也用

歸身

川芎

生地

各七分

陳皮

法半夏

雲苓

生草

各五分

條芩

炒

香附

童便

黃連

各壹錢

姜引水

煎服



經過期後行

如德性溫和素無疾者責其氣血虛少也用八物湯

芎 白芍 茯苓 台黨 歸身 生草 生地

各等分 姜棗引水煎食後服

如性急燥多怒多妒者責其氣逆血少也照上八物湯加

香附 炒青皮 各等分 水煎服兼常服蒼沙丸以調之

蒼沙丸和中開鬱 蒼朮 米泔水浸 香附 童便浸壹日夜各叁兩 條芩 酒炒

兩鹽共為末湯浸蒸餅為丸開水下

如形瘦素無他疾者責其氣血俱不足也用十全大補湯

台黨 白朮 杜仲 茯苓 炙草 當歸 川芎 白芍 酒俱

