

明醫雜著

明醫雜著卷五

薛氏醫案

鄧

王卽齋集

吳郡薛

已註

新

都

吳中珩校

臍風

小兒初生百日内臍風方言率用南星殭蚕等風藥
多不効當作胎毒瀉陽明火邪馬牙亦是胎毒用針
挑破桑樹白汁塗之桑汁主小兒驚口及口瘡舌上
瘡神効初生小兒時時與看頻傳桑汁不然舌硬緊
漸至撮口難治

愚按曾世顯云嬰兒一七之內腹肚脹硬臍畔浮

腫口撮不開攢眉而叫名臍風或因剪臍帶少短
或因束縛不緊牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷
氣入內傳於脾絡致舌強唇青手足微搐不能吮
乳啼聲似鴉喉痰潮響急指破口泡去其毒水以
艾灸臍中亦有復生者治法多端無如灸法或以
天南星一錢生薑自然汁調灌爲妙

變蒸

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變換
五藏蒸養六腑須待變蒸多遍氣血方榮骨脉始長
愚按錢仲陽先生云小兒在母腹中乃生骨氣五

臟六腑成而未全自生之後即長骨脉五臟六腑之神智自內而長自下而上故生後三十二日一變蒸始即智意異前盖人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日自段三十二日計三百二十段爲一變亦曰一蒸骨之餘氣一自腦分入齦中作三十二齒則齒數當與變日相合然而齒有不及三十二數者由變不足其常也有或二十八日即止長二十八齒已下倣此但不過三十二之數凡一周遍乃生虛熱諸症如是十周則小蒸畢也

計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十
二日一變生腎生志六十四日再變生膀胱其發
耳與骭冷腎與膀胱俱生於水水數一故先變主
之九十六日三變生心喜一百二十八日四變生
小腸其發汗出而微驚心爲火火數二一百六十
日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目
不開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生
肺聲二百五十六日八變生大腸其發膚熱而汗
或不汗肺者金金數四二百八十八日九變生脾
智三百二十日十變生胃其發不食腹痛而吐乳

此後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脉手足受血故能持物能立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可餘治全嬰方云變蒸者長氣血變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛驚耳冷微汗脣生白泡三日可愈重者寒熱脉亂復疼啼叫不能乳食食而即吐喁五日方愈其候與傷寒相似但以唇上白泡驗之亦有受胎氣壯實不熱不驚或無證候而暗變者竊謂此症小兒所不能免不必

服藥古方以黑散子紫丸子主之非惟臟腑不能
勝受抑且反傷氣血慎之慎之嘗見一小兒至二
變發熱有痰或治以抱龍丸一粒卒至不救可以
驗矣然父母愛子之心勝稍有疾病急於求醫而
醫者不究病情率爾投劑殊不知病因多端見症
相類難以卒辨况古人稟厚方多峻厲之劑緩服
可也

潮熱

小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五臟相勝不必
用藥又多是飲食停積鬱熱由中發外見於肌表只

理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感輕
易發汗用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退
恐是出痘亦當審察勿使用藥

愚按前症若因飲食停積或腹痛吐瀉或肚腹膨
脹宜用保和丸以消導健脾若飲食既消或腹痛
不食或肚腹膨脹宜用四君子以保養胃氣若因
誤行汗下損傷元氣宜用參芪歸朮陳皮甘草以
補中氣大凡傷食脾胃必損宜固胃氣庶無變症
若寅卯辰時熱者屬肝經也巳午未時熱者屬心
經也申酉戌時熱者屬肺經也亥子丑時熱者屬

腎經也當詳其虛實而治之凡屬虛熱實熱投以
攻補之劑其病既不增減乃是病根深固而藥力
未能及耳須宜多服功力既至諸病悉退切不可
改爲別治設或藥不對症禍在反掌慎之○李閣
老子患潮熱飲食如故自申酉時甚至子丑時方
止遍身似疥大便秘結小便赤澁熱渴飲冷余以
爲脾胃實熱傳於肺與大腸先用清涼飲四劑結
熱始退又用四物湯加柴胡黃連數劑其瘡漸愈
彼欲速効另用槐角丸之類諸症益甚遂求於施
院長亦用四物湯加柴胡黃連加桃仁赤芍藥至

百劑而愈

施院長名鑑字

銀臺弟

大小便白

小兒大小便時時審看小便如米泔或澄停少頃變作泔濁此脾胃濕熱也若大便泔白色或如魚凍或帶紅或色黃黑此積滯濕熱也宜理脾消滯清中宮去濕熱節飲食若忽然變青此是變蒸也不必用藥若久不愈用補脾制肝藥一二服亦不宜多用

愚按小便如泔或大便泔白宜用肥兒丸若積滯黃黑宜用四君子加黃連木香若色青日久不復或兼泄瀉或兼腹痛當用六君子加木香芍藥若

肌體色黃小便不利髮黃脫落鼻下瘡痍嗜土少

食大便青視黃色者須用梔子茯苓湯詳見治痢要藥下

小兒病多屬肝脾二經

小兒病大率屬脾土肝木二經肝只是有餘有餘之病似重急而為治却難見效亦速脾只是不足不足之病似輕緩而為治却難見效亦遲二經為病惟脾居多用藥最要分別若肝木自旺則為急驚目直視或動搖手足搐搦風痰上壅等症此為有餘宜伐木瀉肝降火清心若脾胃虛而肝木來侮亦見驚搐動搖諸症但其勢微緩名曰慢驚宜補養脾胃不可伐

脾經誤作肝經治也

愚按急驚乃風火之症脾土受制肝經實熱者用
瀉青丸經伐其肝或導赤散以瀉其子肝經虛熱
者用六味地黃丸以滋腎水補中益氣湯以養脾
土則風木自息脾土自安矣若因乳食不調脾胃
虧損木來侮土似慢驚而見抽搐搖頭刮目咬牙
等症宜用六君子加釣藤鉤若脾胃虧損寒水反
來侮土成慢驚而見前症用前藥加薑桂如未應
更加附子多有復甦者○舉人杜克宏子發熱抽
搐口噤痰湧此肝膽經實火之症即急驚風也先

用瀉青丸一服又用六味丸二服諸症頓退乃以
小柴胡湯加芎歸山梔釣藤鉤而安却用補中益
氣湯而愈

急驚

急驚是有餘之症屬肝木心火陽邪太旺宜直瀉之
降火下痰是也五藏俱有陰陽如肝氣爲陽爲火肝
血爲陰爲水肝氣旺則肝之血衰矣火妄動則水被
煎沸不寧矣陽旺陰消風火相搏陰血走散勢所必
至也故亦宜養血急驚雖屬肝心然木火旺則肺金
受虧不能平木木來尅土斯損矣故亦宜養脾况治

驚諸藥大率祛風化痰瀉火峻厲及腦麝辛散之藥
易於消陰血損脾胃者故治有餘急驚之症先瀉降
火下痰一二服後加養血安神之藥若飲食少大便
澀或吐瀉則當兼補脾胃若脾胃原虛當於直瀉藥
中加補脾藥若屢作屢服利驚驅逐之藥便宜認作
脾虛血散治驚藥內加養血補脾藥不可用溫熱丁
香等藥恐助胃火宜參朮為藥等以補脾中氣血麥
門冬黃連以清金制木

愚按前症若肝經風熱抽搐目睵筋急痰盛等症
用四物湯以生肝血釣藤鈎以清肝火更用四君

予以補脾土若肝經血燥發熱驚搐眼瞶痰盛筋
孿用六味丸以滋腎水生肝血用四君子加芍藥
以補脾土生肺金若肺金尅肝木用六君子以實
脾土芍藥木香以平肺金若屢服利驚之藥而脾
胃虛寒者須用六君子以補脾胃加丁香木香以
培陽氣若脾土虛寒腎水反來侮土而致中寒腹
痛吐瀉少食等症者用益黃散以補脾土而瀉寒
水庶幾不致慢驚矣治當審察虛實凡症屬有餘
者病氣也不足者元氣也故有餘當認爲不足思
患預防斯少失矣

急驚變慢驚

急驚屢發屢治用直瀉藥既多則脾損陰消變爲慢驚當主以補脾養血佐以安心清肺制肝之藥

愚按前症多因吐利脾胃虛損肝木所乘或腎水反來侮土所致故似搐而不搐先用釣藤飲子如發搐少退乃用寶鑑天麻散若吐利不食急用木香異攻散實其脾土其病自已如未應用六君子加木香炮薑溫補脾土更不應急加附子以回陽蓋慢驚之症外虛熱而內真寒也無風可逐無痰可驅但溫補脾胃爲主大凡發搐因風則目青面

赤因驚則叫呼搐搦因食則噎吐氣悶肺脾虛則
生粘痰喉間作鋸聲乃心火不能生脾土脾土不
能生肺金以致肺不能主氣脾不能攝涎故涎氣
泛上而喉中作聲耳若用祛風治痰理氣之劑則
氣散陰消而促其危矣○太平王職坊子患瘡疾
恪用化痰之劑虛症悉至殊類驚風謂余曰何也
余曰小便頻數肝經陰虛也兩目連劄肝經風熱
也作嘔懶食胃氣虛弱也泄瀉後重脾氣虛弱也
用補中益氣湯六味地黃丸而痊○舉人余時正
子傷食發丹毒服發表之劑手足抽搐服抱龍丸