

# 夾痧

蘭活人書云傷寒下之太早熱氣乘虛入胃發痧下  
之太遲熱留胃中發痧胃爛亦發痧痧者乃熱毒鬱  
遏煎熬陰血血得熱而不解浮於肌肉爲痧足陽明  
胃主之痘瘡初出皮肉紅腫片片如錦紋者此夾痧  
也以辛涼之藥解之其痧漸退瘡本堅實者吉否則  
皮膚痧爛瘡易癢癢所謂皮嫩易破者是也如赤痧  
成塊其肉浮腫結硬者又名丹瘤其毒最酷瘡未成  
就此先潰爛工不能治 夾痧痘亦用荆防敗毒散  
主之痧退可治 張痘出而夾痧者痘毒隨臟而出

其毒發之勢最爲迅疾或血太過而氣不及則衛氣

疎缺不能密護脉絡而致太過之血夾毒上浮亦乘

毒出之勢而發爲癰也較前夾疹者稍爲易治如痘

起齊其內必虛癰多從內解如不解以升麻湯加歸

芍主之又有或結痂後而發者餘毒熱盛煎熬肉分

其癰必爛以消毒散快不加歸芍防風盛則用連翹

湯痘大小便秘爛處以生肌散潰爛傳之若夾毒初出色

赤如火乃毒滯不能宣發之故以四順飲發熱利之

如大便利一二次而癰或退則血附氣位急用四君

湯不能食加耆黃桑與服以防其復發如不上肉

豆蔻必止

翁用玄參升麻湯

咽喉

黃芩荆芥白芍

歸芍在初多用表散在後多用解利紅癰易退紫癰

稍難藍癰不可治矣

婁用白虎湯

袁痘中夾癰

陽明受梟炎之毒盛而然丁桂之藥纖毫莫可投也  
張半仙用黃連解毒湯以治夾癰之痘則失之太寒  
錢氏用檳榔人黃以療痘中之癰則失之太峻總不  
如犀角地黃湯以徹內陽明之鬱毒五龍化癰湯以  
消外蚊咬之血紋內外夾攻表裏調和斯能復全矣  
愚治痘裏夾癰者極多但見形就是癰不見痘樣  
者熱毒峻烈克全者十止三四兩日而癰見者速清

逐爲尚患此者必煩躁譖語渴飲不寧劉禪師用地  
龍汁和犀角水投服亦心得治癰之法者矣  
山梔子湯 治痘瘡及癰毒狀如蚊蚤所齧毒盛黑  
色者

山梔子仁

白蘚皮

赤芍藥

升麻

各壹兩

寒水石

甘草

各伍錢

右爲細末每服一錢水八分紫草薄荷各少許同  
煎至五分去滓放溫服

表氏方

紫草

紅花

犀角

木通

芍藥

生地黃

茯苓

甘草

蟬蛻

燈草金銀煎服

外加荆芥紫蘇木通荔枝殼鳳

凰脫升麻楊枝濃煎湯浴之

陽毒升麻湯

面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮喉

痛

升麻

伍錢

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

各貳錢半

右水煎服

陰毒升麻湯

治陰癰

升麻

當歸

川椒

鼈甲

雄黃

甘草

石水煎服

**夾癭**

表夾癭爲痰毒凝結而成也或結於項頸或結

於耳後或結於腋下大者如桃小者似李長者似瓜  
短者似棗身烙煩渴勢若不啗痘三四日而癭作則  
毒隨痘洩膿隨痘灌自可挽全而無害倘癭紅腫將  
膿而痘隨標焉吾恐毒膿一潰元氣囂漓痘焉能表  
暴充灌乎七八之期痘已黃蠟而癭作焉保護元氣  
消毒祛邪竟獲綏全之慶雖潰無妨治法在乎審日

期之先後視元氣之厚薄紀男女之大小範時令之  
寒暑庶幾免紊錯之愆矣瘰已紅腫而痘標焉法宜  
托裏毒盛消其毒元虛補其元木通桔梗解毒而徹  
關鎖惡實生地除梟而祛榮炎甘草清理諸邪蟬蛻  
祛風辟毒芍藥洩諸經之鬱火荆芥散陽明之風邪  
諸藥缺一不可也 痘起遂發瘰治以補托爲苓連  
之藥不可用耗燥之劑不宜投消痰解毒爲尚 痘  
標而瘰破流膿出血自致元氣虛虧大用黃耆衛元  
湯可也人參黃耆川歸紅花桔梗芍藥甘草防風煎  
服 痘兩三日而瘰毒仍作急用三消散半夏川歸

燈草煎服

痘七八日充灌而癭作宜服冲和散

人參黃耆麥門柴胡防風荆芥芍藥茯苓炒白朮枯  
梗連翹當歸瓜蒌根頻進四服自愈矣 歌曰木通  
生地併黃耆枯梗當歸芍藥俱大力蟬蛻兼甘草白  
茯苓蠶効實奇上焦加味升麻引貝母門冬不可遺  
下焦牛膝相資助緊覓山姑信用之熱多荆芥隨多  
少疼極還尋白芷醫 愚按方治證須驗時日若頭  
面盡腫而癭腫則諸痘次不能鼎峻多致損傷  
痘裏發丹內熱之極而然也不宜遽用極寒

透裏之劑若標兩三口竟以化痲湯徐徐浴之內服  
生地牛蒡子芍藥甘草木通荆芥穗其毒自消矣若  
用豬膽京墨水片塗之竟羅其害慎之頭面項頸倘  
如蛇纏硬腫火燒疼痛梟毒蟻於上宜用炒黃連紫  
草車前子梔子等藥 余治痘丹準前藥加減單用  
露桃花貳錢卽丹收痘則若腫疼須加柴胡羌活生  
地芍藥倍之有用鳳尾草獨煎湯飲豈知山蕨卽鳳  
尾草名也性極寒而沉走恐傷於痘不可輕用  
**夾瘡湯** 表痘裏夾瘡痘迎瘡見隙而盤據愈加多密  
矣痘起氣虛風癢自作宜用紫蘇荆芥湯浴之隨用

芍藥生地防風黃耆白朮蠟蠶甘草蟬蛻等藥服之  
可也若男女種患楊梅惡瘡痛不可忍而痘適標其  
間李少陽用蝸牛丹以治但香油皂子仁不可輕用  
若患肥疳瘡如松香輕粉飛丹雄黃皆不可塗也  
歌曰黃耆芍藥直蠟蠶生地防風白朮聯甘草紅花  
牛蒡子酒煎來服効難言若是楊梅瘡破爛牛黃土  
茯苓加焉痛極乳香些少助自然瘡可痘安痊 余  
歷驗小兒痘種於瘡瘍中痘雖美麗勢必臬癢若不  
按法製湯以浴痘躄聚於瘡隙奚克鼎峻尹頭陀專  
以香馬蘭搽煎湯浴火瘡瘍之痘允得鎮痘之妙但

香馬蘭有三種分別青紅白根浮上紅者甚佳採用則可治法升麻黃耆爲君芍藥生地爲臣羌活防風爲佐甘草蟬蛻爲使此準格也

**大損傷**

表痘標一兩日或致撲跌或犯金石所傷則

脾脉虧損而血氣走散痘終受其阻厄李少陽用孩骨胡桃酒以治則失之峻利况胡桃又作瀉之物用之不宜王近川用歸尾桃仁湯以治則失之狂妄痘中豈宜破敗其血者耶準依劉半塘拱元散人參黃耆當歸紅花伏鳳雛蟬蛻防風芍藥甘草以補托其內用文蛤棕灰盪於傷處以收斂其外可也若損而

不破者用蝦蟆皮貼之徐徐以手摩撫若是湯潑火  
烙者不宜敷以生冷之藥以凝滯其痘也 歌曰損

傷須覓伏鳳雛土鼈參耆蟬蛻橘紅甘草當歸合  
再入紅花防地俱 昔黃舍人次子十三歲患痘兩

朝上樓失足損傷頭額致血淋漓父母痛哭以爲痘  
中損傷必不能生矣請予視治卽將前方倍下參耆  
歸地連進四服而痘遂鼎灌身帶不寧加茯神桂心  
外單用棕灰敷之不半月而白靨脫全美但痛甚者  
少力乳香若外傷重痕濶弗克收痂用白芨白歛象  
皮末摻之自痊

痘疔

諸痘中有獨大者或黑或白其根結硬

聖散點之

凡黑陷中有微尖頂如苦楮樣者疔也無此狀者謂之黑陷非疔也

萬痘疔者熱毒畜積氣血腐壞而成也狀有數種乃疫毒之氣最爲惡候宜謹察之有肌肉微腫狀如堆粟不分顆粒者此氣滯血凝毒氣鬱結也有初出紅點漸變黑色其硬如石者此肌肉已敗氣血中虛不能載毒而出反致陷伏也有中心黑陷四畔突起戴漿者此血隨毒走氣不爲用也有中心戴漿四畔乾陷焦黑者此氣附毒出血不爲使也有頭戴白漿自破潰爛者此氣血不充皮膚敗壞也有爲水泡溶溶

易破者此火濕併行氣虛不能斂束也有爲血泡色  
紫易破者此血熱妄行不能自附於氣也有瘡頭鍼  
孔漿水自出者此衛氣已敗其液外脫也此數證者  
於五六日間候之但見一證卽不可治 薛痘疔又  
謂之賊痘或三五枚或五七枚間雜於諸痘之間其  
色紫黯作痛不寧以致諸證蜂起不能灌膿甚至不  
救乃熱毒勢甚併結也用仙方活命飲 瘡瘍 如二便  
祕澀量加大黃遍身拘急加麻黃外必用線鍼挑破  
出黑血或吮出毒血以泄其毒餘痘纔得灌膿否則  
其毒無從而解必致不起如禾應急用隔蒜灸若毒

氣盛者或不知痛者不用蒜隔就着肉灼艾灸之若  
灸後瘡頭紅腫發焮用鍼挑破出毒血灼艾尤好雖  
此法未出方書予屢用屢驗者世多用至寶丹之類  
亦不可恃 別見起發證治宜參攷

凡痘瘡起發之時但見乾燥其根焦黑者卽內服奪

命丹

見形

外用四聖散塗之

如原有瘡疹或灌瘡

未愈或瘡將較癢嫩者至痘出之時其處痘本攢聚

形色黑潰急以鍼刺破之吮去毒血外以四聖散塗

之內服加味四聖湯

見形

調無價散

倒靨

併奪命丹

主之 如瘡焦黑渾身皆是者看大便何如若大便

秘者內服承氣湯

便閉

調無價散外用水楊湯浴法

起發

大便利者內服十全大補湯

汗

陳氏木香散

為

調無價散合奪命丹外用水楊湯浴法

四聖散

菜豆

肆拾玖粒

豌豆

肆拾玖粒

珍珠

壹分

油頭髮

燒過壹分

右為細末臘脂水調先以簪子撥開黑瘡以此塗

之

二聖散

治痘疔挑破以此點之

雄黃

貳錢

紫草

叁錢

右研末用油臘脂調

敷方 痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂

膩粉

黃檗

杭粉炒

血竭

伏龍肝

各壹錢

飛丹炒捌分

髮灰

伍分

乳香

沒藥各叁分

冰片

叁釐

蜜陀僧

飛過貳錢

有臭氣加阿魏叁肆分

右爲細末綿紙篩過敷之外用膏藥貼 內服人

參敗毒散加穿山甲蟬退連翹

拔毒膏 治痘疔