

醫酉學金鍼

卷六卷七卷八



醫學金鍼序

自醫家列於方術而其學遂湮古聖人之於民也既爲調其陰陽俾無天札復爲考其經絡時其啟閉以濟運氣之窮蓋見道之機緘而爲政者之仁術也瘍師旣廢異說繇興長沙之學至本朝而始昌訂譌匯論獨集大成而長樂陳脩園昌邑黃研農尤能會其統宗炤厥風旨發聾振聵隱然有人心世道之憂狂瞽之徒性靈汨

溺橫加訾議以爲偏於扶陽良可慨歎竊以爲
陳氏善於宣洩六經以散其邪黃氏善於升降
二氣以復其本而握權制要皆取運於中央夫
中央者人身之根本也根本固而枝葉茂豈有
他術哉 韓園中丞上窺靈素下逮百家旁及
昆明千金之祕而一以長沙爲宗其來莅吾楚
也楚之民驚舞而詠歌之京朝官咸相慶暮年
而政具舉旣爲設醫藥以甦民困復取二子之

書芟其煩蕪歸於簡易並編成歌括用備遺忘
以逢時於斯道稍有窺見畀以校讎之役剗刪
既竣勉述詹言後之學者當憬然於慈惠之師
其造福在生民而流澤及萬世也藝事云乎哉
光緒四年夏至日武昌柯逢時

醫學金鍼卷六

長樂陳念祖原本

吳縣潘 蔚增輯

實證

邪氣盛則實。所謂五實者。實于心則脈盛。實于肺則皮熱。實于脾則腹脹。實于腎則前後不通。實于肝則瞤悶。

傷寒內外俱實

實阻塞隧道



傷寒汗吐下諸法。皆所以攻其實也。若防風通聖散。兩解表裏之實。方法頗純。可與仲景法互用。

○內外俱實病詩

防風通聖力回天。誰道河間立法偏。表裏實邪能兩解。細參五實得真詮。

防風通聖散

見瘟疫、

阻塞隧道

實病失治而死者。多由阻塞。有清道濁道之分。
阻塞清道者。法當救肺。吳人馬元儀以苦蕒。紫
苑。半夏。貝母。桔梗。枳殼。蘇子。杏仁。橘紅。甘草之
屬。以開之。因循不治。則天氣不入。穀氣不出。清
道不通而終矣。阻塞濁道者。法當救胃。欽人張
心在。以三承氣湯。四順清涼飲。大柴胡之屬。以
下之。因循不治。則腹滿實堅。二便不出。濁道不
通而終矣。

○阻塞清道詩

元儀救肺論超超貝苑夏夔力不饒

吳醫以輕微渣

洋之品文其短拙不特馬元儀一人

借用還魂湯

通氣道立看

死證起崇朝

○阻塞濁道詩

救胃傳來理本幽三承

氣湯

四順

清涼飲

大柴

胡湯

求陽明氣順機緘轉有腳陽春自我留

還魂湯

見厥證

承氣湯 見祕結

大柴胡湯 見隔證

四順清涼飲 通大便而不傷元氣

當歸 大黃 黃芩 甘草 各等分 水煎服

○歌曰

四順清涼首用歸。黃芩甘草大黃依。滑腸通

便扶元氣。會悟三承此庶幾。

積聚痞氣奔弛

三、實 積聚痞氣奔弛



積者五藏所生。推之不移。屬陰。聚者六府所成。推之則移。屬陽。統以平胃散。加扁蓄、大麥芽、川芎、各等分。木香、沈香、各三分之一。大黃酒浸。倍用。爲末。每服叁錢。薑湯送下。忌油膩動氣之物。及房事一月。服藥須黃昏。勿食晚飯。大小便見惡物爲度。肝積在左脇下。名肥氣。去蒼朮。加柴胡、鼈甲、青皮、莪朮。肺積在右脇下。名賁息。加白豆蔻、桑白皮、貝母。心積起臍上。至心下。大如臂。

名伏梁。去蒼朮，加肉桂、黃連、石菖蒲、莪朮、脾積。
在胃腕，腹大如盤，堅如石，名痞氣。照原方，不加
減。惟腎積發於小腹，上奔衝心而痛，名奔豚。去
蒼朮、大黃、陳皮、麥芽、扁蓄，加茯苓爲君。肉桂、當
歸、吳茱萸、附子、川練子、李根白皮爲佐。研末，煉
蜜爲丸。淡鹽湯送下。若虛弱之人，去其半而止。
或以補藥佐之。其餘熱積加芩連，寒積加薑桂，
附子、酒積加葛根，痰積加南星，半夏、水積加海

藻猪苓澤瀉血積加桃仁紅花肉積加阿魏山查果積加麝香草果

○積聚詩

積聚病形各不同黃

大黃

加平胃

散

按經

五藏

六府為聚按

攻理中

湯

妙得中央運

執中央

旁桂附麻辛大氣充

理中湯加桂枝附子麻黃細辛等藥合大氣流

行充滿則積聚不攻而自去

平胃散

蒼朮

汭浸貳錢

厚樸

薑汁炒

陳皮

炙草

各壹錢

薑棗

煎

加減已詳本論

○歌曰

平胃散用樸陳皮蒼朮炙甘四味宜除溼寬

胃驅瘴癘調和胃氣此方施

金匱奔豚湯

治奔豚往來寒熱氣上衝胸腹痛

炙草

川芎

當歸

黃芩

白芍

各貳錢

半

夏生薑

各肆錢

生葛

伍錢

李根白皮

叁錢

水



叁杯煎捌分服。

上升下降。無論邪正之氣。未有不由少陽。以少陽爲陰陽之道路也。陰陽相搏。則腹痛。方中有芍歸芍藥以和陰。生薑以通陽。又有半夏安胃。甘草益脾。分理陰陽之交爭。而腹痛可愈矣。氣升則熱。方中李根白皮以降之。氣降則寒。方中有生葛根以升之。升降得宜。而寒熱可愈矣。且黃芩一味。爲少陽專藥。觀傷

寒論大小柴胡等湯皆用此味。可知千變萬化中。按定六經之法。不逾一黍也。

○歌曰

奔狔湯用草歸芎。葛芍薑苓半夏同。甘李根皮須用白。升清降濁善開胃。

附黃坤載龍珠膏

川椒 附子 烏頭 桂枝 牡蠣 鼈甲

各伍錢、巴豆叁錢研 茯苓捌錢 用麻油黃丹熬

膏加麝香阿魏研細布攤貼病塊。奔狔已結氣塊堅鞭本屬寒積但陰邪已盛稍服附子溫下奔狔必發以邪深藥微非附子之過也不治則半年一載之間必至殞命此宜溫燥脾胃去其中焦溼寒土燥陽回力能制水然後以此膏貼之寒塊消化悉從大便而出滑白粘聯狀如凝脂濁痰後泄少腹鬆軟重用附子暖水然後乃受。

癲狂癇

癲者癡呆之狀。其人常靜。狂者躁妄不堪。其人常動。癇者忽倒無知。口角流涎。或作五畜聲。少頃卽愈。作止有間斷也。皆痰火爲病。而癇證多由於胎中受驚。久伏而發。三證虛者宜磁硃丸。實者宜滾痰丸。而風引湯加黃丹亦效。此證主痰火。故列於實證。

○癲狂癇詩