

卷
貳

第
二
本

新
增
全
圖
足
本
醫
宗
全
鑑

上
海

啟
新
書
局

發
行



御纂醫宗金鑑卷一

訂正仲景全書傷寒論註

傷寒論後漢張機所著發明內經奧旨者也並不引古經一語皆出心裁理無不該法無不備蓋古經皆有法無方自此始有法有方啟萬世之法程誠醫門之聖書但世遠殘闕多編次傳寫之誤今博集諸家註釋採其精粹正其錯謬刪其駁雜補其闕漏發其餘蘊於以行之天下則大法微言益昭諸萬世矣○辨太陽病脈證并治上篇 太陽主表為一身之外藩總六經而統榮衛凡外因百病之襲人必先於表表氣壯則衛固榮守邪由何入經曰雖有大風苛毒勿之能害是也若表氣虛則榮衛之氣不能禦外故邪得而乘之經曰虛邪不能獨傷人必因身形之虛而後客之也衛陽也榮陰也風陽邪也寒陰邪也邪之害人各從其類故中風則衛受之傷寒則榮受之衛分受邪則有汗為虛邪桂枝證也榮分受邪則無汗為實邪麻黃證也榮衛俱受邪均無汗皆為實邪大青龍證也大綱三法用之得當其邪立解用違其法變病百出緣風為百病之長故以風中衛列為上篇寒傷榮與風寒兩傷列為中下二篇其條目俱詳於本篇之下俾讀者開卷了然有所遵循也○太陽之為病脈浮頭項強痛而

惡寒註太陽膀胱經也太陽之為病謂太陽膀胱經之所為病也太陽主表

表統榮衛風邪中衛寒邪傷榮均表病也脈浮表病脈也頭項強痛惡寒表病

證也太陽經脈上額交顛入絡腦還出別下項連風府故邪客其經必令頭項

強痛也惡寒者因風寒所傷故惡之也首揭此條為太陽病之提綱凡主中下三

篇內稱太陽病者皆指此脈證而言也按榮衛二者皆胃中後天之穀氣所

生其氣之清者為榮濁者為衛衛即氣中之慄悍者也榮即血之精粹者也以

其定位之體而言則曰氣血以其流行之用而言則曰榮衛榮行脈中故屬於

陰也衛行脈外故屬於陽也然榮衛之所以流行者皆本乎腎中先天之一氣

故又皆以氣言曰榮氣衛氣也集註滑壽曰脈在肉上行主表也 方有執

曰表即皮膚榮衛麗焉故脈見尺寸俱浮知病在太陽表也項頸後也惡寒者

該風而言也風寒初襲而鬱於表不能再勝風寒之外忤故畏惡之 程應旌

曰太陽經之見證莫確於頭痛惡寒故首揭之 吳人駒曰頭為三陽之通位項

為太陽之專位有所障礙不得如常之柔和是為強痛○太陽病發熱汗出惡

風脈緩者名為中風註太陽病即首條脈浮頭項強痛而惡寒之謂也衛為

表陽風屬陽邪風邪中人則衛受之從其類也風中於衛即發熱者以風衛皆

陽其性本熱故變熱甚捷不以傷寒待其閉鬱而始熱也衛病不能固表又為陽邪所蒸故腠理疎而汗出也汗出表虛為風所忤故惡風也風性柔輒故脈緩也此承上條言太陽病又兼見此脈證者名曰中風以為中風病之提綱後凡稱中風者皆指此脈證而言也

集註方有執曰脈緩即下文陽浮而陰弱之謂言既有如首條所揭之太陽病加之發熱汗出惡風而脈緩者則其病乃是觸犯於風所致故名中風

汪琥曰中風非東垣所云中府中藏中血脈之謂蓋中字與傷字同義仲景論中不直言傷風者恐後學不察以咳嗽鼻塞聲重之傷風混同立論故以中字別之也脈緩當作浮緩看浮是太陽病脈緩是中風脈中篇緊脈亦當倣此

○太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

註太陽中風即上二條合而言之又詳舉其證以出其治也後凡稱太陽中風者皆指此脈此證也陰陽指榮衛而言非指尺寸浮沉也陽浮即越人曰三菽之浮肺之浮也肺主皮毛取之而得者即衛分之浮也六菽之浮心之浮也心主血脈取之而得者即榮分之浮也榮分之浮較之衛分之浮則無力而弱故曰陽浮而陰弱也衛為風客則衛邪強而發熱矣故曰陽浮者熱自發榮受邪蒸則榮不

固而汗出矣故曰陰弱者汗自出榮衛不和則肌表疎緩故有嗇嗇之惡寒浙
浙之惡風翕翕之發熱也然在皮膚之表非若傷寒之壯熱無汗惡寒雖近烈
火而不減惡風雖處密室而仍畏也皮毛內合於肺皮毛不固風邪侵肺則氣
壅而鼻鳴矣胸中者陽氣之本衛陽為風邪所干不能敷布則氣上逆而為乾
嘔矣故宜桂枝湯解肌固表調和榮衛也 集註程應旄曰嗇嗇惡寒者肌被
寒侵怯而斂也浙浙惡風者肌因風灑疎難禦也翕翕發熱者肌得熱蒸合欲
揚也嗇嗇浙浙翕翕字俱從皮毛上形容較之傷寒之見證自有浮沉淺深之
別

桂枝湯方 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 三兩 生薑 三兩 大棗 十二枚

以上五味㕮咀三味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須
臾歔熱稀粥一升餘以助藥力溫服令一時許偏身熱熱微似有汗者益佳
不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更
服依前法又不汗後服當小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜
周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生
冷黏滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

按桂枝湯方桂枝下有去皮二字夫桂枝氣味辛甘全在於皮若去皮是枯木矣如何有解肌發汗之功宜刪此二字後做此一方解名曰桂枝湯者君必桂枝也桂枝辛溫辛能發散溫通衛陽芍藥酸寒酸能收斂寒走榮陰桂枝君芍藥於是發汗中寓斂汗之旨芍藥臣桂枝是於和榮中有調衛之功生薑之辛佐桂枝以解表大棗之甘佐芍藥以和中甘草甘平有安內攘外之能用以調和中氣即以調和表裏且以調和諸藥以桂芍之相須薑棗之相得藉甘草之調和陽表陰裏氣衛血榮並行而不悖是剛柔相濟以相和也而精義在服後須更歎稀粥以助藥力蓋穀氣內充不但易為釀汗更使已入之邪不能少留將來之邪不得復入也又妙在溫覆令一時許熱微似有汗是授人以微汗之法也不可令如水流漓病必不除是禁人以不可過汗之意也此方為仲景羣方之冠乃解肌發汗調和榮衛之第一方也凡中風傷寒脈浮弱汗自出而表不解者皆得而主之其他但見一二證即是不必悉具故麻葛青龍發汗諸劑咸用之也若汗不出麻黃證也脈浮緊麻黃脈也固不可與桂枝湯然初起無汗已用麻黃發汗汗解後復煩脈浮數者與下後脈仍浮氣上衝者及下後下利止而身痛不休者經中皆用此以解外誠以此時表雖未解腠理已疎

邪不在皮毛而在肌肉且經汗下津液已傷故脈證雖同麻黃而主治當屬桂枝也粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒使人疑而不用又謂專走肌表不治他病不知此湯倍芍藥生薑加人參名桂枝新加湯用以治榮表虛寒肢體疼痛倍芍藥加飴糖名小建中湯用以治裏虛心悸腹中急痛再加黃耆名黃耆建中湯用以治虛損虛熱自汗盜汗因知仲景之方可通治百病也適寒溫服歡熱稀粥以助藥力欲使穀氣內充易為釀汗也溫服令一時許微似有汗不令如水流漓謂不可過汗也蓋取汗在不緩不急不多不少緩則邪必留連急則邪反不盡汗多則亡其陽汗少則病必不除若一服汗出病差謂病輕者初服一升病即解也停後服不必盡劑謂不可再服第二升恐其過也若不汗更服依前法謂初服不汗出未解再服一升依前法也又不汗後服謂病仍不解後服第三升也小促其間半日許令三服盡謂服此第三升當小促其服亦不可太緩以半日三時許為度令三服盡始適中其服之宜也若病重者初服一劑三升盡病不解再服一劑病猶不解乃更服三劑以一日一夜周十二時為度務期汗出病解而後已後凡有曰依服桂枝湯法者即此之謂也○太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯〔註〕此釋上條陽浮陰弱之義也

經曰邪氣盛則實精氣奪則虛衛為風人則發熱邪氣因之而實故為衛強是衛中之邪氣強也榮受邪蒸則汗出精氣因之而虛故為榮弱是榮中之陰氣弱也所以使發熱汗出也欲救邪風者宜桂枝湯集註方有執曰上言陽浮而陰弱此言榮弱衛強衛強即陽浮榮弱即陰弱彼此互言而互相發明者也救者解救救護之謂不曰風邪而曰邪風者以本體言也○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯註此釋上條榮衛不和之證而又就其時發熱汗出者以明其治也藏裏也無他病謂裏無他病也有時發熱有時不熱有時汗出有時不汗出其表病流連而不愈者非榮不和是衛強不與榮和也當於未熱未汗之時預用桂枝湯解肌發汗迎而奪之以過其勢則熱退汗斂而病自愈矣集註方有執曰時以暫言衛氣不和者表有邪風而不和也先其時者言於未發熱之先也程知曰陰虛諸病亦時發熱自汗若裏無他病而時熱自汗則為衛受風邪未得解散宜於將發之時先用桂枝湯乘其欲動而擊之程應旄曰桂枝為解肌之劑而有時云發汗者何也以其能助衛氣升騰使正氣得宜而汗出與麻黃湯逐邪氣使汗從外洩者不同汪琥曰及其發熱自汗之時用桂枝湯發汗則愈苟失其時則風邪入

裏病熱必深桂枝湯非所宜矣○病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不
 諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈
 宜桂枝湯一註此又釋上條榮衛所以不和之義也言病有時常自出汗者此
 為榮氣已和也榮氣和而熱仍不解者則是衛外之氣猶不諧而不與榮氣共
 和諧也所以榮氣雖和而時時自汗出病猶不解也蓋以榮行脈中衛行脈外
 衛不和則榮雖和而病不解故復發其汗以抑衛而和榮榮衛和而病自愈矣
 亦宜桂枝湯集註方有執曰此與上條同上以暫言此言常者謂無時不熱
 也上言藏藏為陰而主裏此言榮榮亦陰而主裏以暫言故其詞略以常言故
 其詞詳兩相互發義不殊也 喻昌曰此明衛受邪風榮自汗出之理凡汗出
 榮和而發熱不解是衛強不與榮和也復發其汗俾風邪從肌竅外出斯衛不
 強而與榮和矣正如中酒發狂酒去其人帖然也榮受寒邪不與衛和宜麻黃
 湯亦然 吳人駒曰上條發作有時此則無時而不自汗出但熱不解者亦屬
 榮衛不和蓋榮衛相得之為和而榮不得獨為之和也 張錫駒曰衛氣者所
 以肥腠理司開闔衛外而為固也今受邪風不能衛外故常自汗出而熱不解
 此為榮氣和而衛不和也 魏荔彤曰前以桂枝解肌者和其衛而時發熱之

熱止此以桂枝發汗者和其衛而常自汗之汗止蓋發其表而熱解矣故總結之曰榮衛和則愈○太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈註太陽病服桂枝湯外證不解者可更作服今初服不惟不解而反加煩是表邪太盛若遽與桂枝恐更生煩熱故宜先行刺法疏其在經邪熱然後却與桂枝發其肌腠風邪俾外內調和自然汗出而解矣集註方有執曰桂枝全在服法發汗切要如經若服不如發汗不如經病必不除所以反煩反者轉也言轉加熱悶也風池穴在耳後陷者中按之引於耳中手足少陽脈之會刺可入同身寸之四分風府穴在項上人髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中督脈陽維二經之會刺可入同身寸之四分張志聰曰風池風府雖非太陽穴道乃屬太陽經脈所循之部故刺之以衰太陽之病勢魏荔彤曰恐誤認此為已傳之躁煩故標出以示人言不解則太陽之證俱在但添一煩知其非傳裏之煩而仍為表未解之煩也○欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也註汗之不解而煩太陽證仍在者是表邪盛也有陽明證者是裏熱盛也然亦有欲自解而未解先煩者則又為邪正相爭作汗之兆也當其煩時解與不解固不可定但診其六脈俱浮則知邪欲還表當

汗出而解矣

集註

程知曰天地鬱蒸而雨作人身煩悶而汗作當以脈浮決

之設脈不浮則煩又為人裏之候矣

程應旄曰如診得脈浮即是邪還於表

之兆切勿妄治其煩使汗却而當解者反不解也

沈明宗曰夫自解證有從

衄解有從下血而解有從下利而解有從小便暗除而解者此即太陽戰汗之

一端或從脈辨或從證參仲景妙義散見諸篇務必合參則備○病六七日手

足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也

註病至六七日

手足陰陽三部脈皆至而浮忽然大煩口噤不能言躁擾不寧者此邪正俱實

爭勝作汗之象故曰必欲解也**集註**成無己曰手足三部脈皆至為正氣盛

邪氣雖甚必欲解也○若脈和其人大大煩目重臉內際黃者此欲解也按臉

字當是臉字臉眼弦也作臉字非**註**脈和而大煩者其解未可卜也若其人

目重臉者是臉覆下垂目欲合也為陰來濟陽之兆內際黃者為胃氣來復之

徵故曰此欲解也○問曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中

三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈陰陽為和平雖劇當愈**註**

脈偏勝則病脈和平則愈今寸口關上尺中三部脈俱見浮沉遲數大小同等

陰陽和平之象即有寒熱不解之病雖劇亦當愈也**集註**內經曰寸口人迎

言正傷寒論註太陽上篇

兩者相應若引繩大小齊等者名曰平人 程知曰大小浮沉遲數同等謂三
部九候無相失也蓋大不甚大小不甚小浮不甚浮沉不甚沉遲不甚遲數不
甚數為冲和平等之象也○病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰
也發於陽者七日愈發於陰者六日愈為陽數七陰數六故也 註 病謂中風
傷寒也有初病即發熱而惡寒者是謂中風之病發於衛陽者也有初病不發
熱而惡寒者是謂傷寒之病發於榮陰者也發於陽者七日愈發於陰者六日
愈以陽合七數陰合六數也 集註 方有執曰此推原中風傷寒之所以始必
要其所以終之意凡在太陽皆惡寒也發起也愈瘳也 程知曰此辨太陽病
有發熱有不發熱之故也風陽也衛亦陽也寒陰也榮亦陰也中風傷寒均為
表證而風入衛則邪發於陽而為熱寒入榮則邪發於陰而不即熱陽行速故
常過經而遲愈一日陰行遲故常循經而早愈一日觀此則風寒之辨了然矣
魏荔彤曰風傷衛寒傷榮既在太陽則未有不發熱者但遲速有間耳至於
惡寒則同也發於陽發於陰之義不過就風為陽衛亦陽寒為陰榮亦陰而言
殊未及於三陰也○問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病者明
日中愈日中得病者夜半愈何以言之日中得病夜半愈者以陽得陰則解

也夜半得病明日日中愈者以陰得陽則解也〔註〕凡病之起不外乎陰陽以

為病非陽勝陰即陰勝陽凡病之愈亦不外乎陰陽以為和非陽得陰解即陰

得陽解陽得陰解者謂日中得病今日夜半愈也陰得陽解者謂夜半得病明

日日中愈也〔集註〕方有執曰日中夜半以大略言餘時可做此意而推也○

太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明

使經不傳則愈〔註〕太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也謂太

陽受病其邪傳行六日三陽三陰經盡至七日已上三陽三陰之病日衰大邪

皆去此不作再經故自愈也再者再傳陽明經也謂其邪已傳經盡熱盛不衰

欲再轉屬陽明故也鍼足陽明以泄其熱使其邪不再傳則愈矣〔集註〕方有

執曰七日已上者該六日而言也 魏荔彤曰方有執謂鍼以過其邪喻昌謂

鍼以竭其邪言過言竭皆言泄之也凡鍼刺者泄其盛氣也故前言刺風池風

府亦主泄其風邪暴甚之意因刺法乃治熱之善策不欲人妄施汗下溫三法

也言足陽明自是胃之經穴必有實欲再傳之勢方可刺之 閔芝慶曰太陽

受病以次而終於厥陰為傳經盡諸經受病至七日已上自愈者為行其經盡


故也今又自太陽再傳之說若果傳徧六經厥陰再傳太陽太陽再傳陽明則

何不於厥陰未傳太陽之前預鍼太陽而必待傳陽明然後鍼陽明哉於此可知三陰從無再傳太陽之病但轉屬陽明耳○風家表解而不了了者十二日愈註風家謂太陽中風也表解謂用桂枝湯病已解也不了者不清楚也言用桂枝湯其表已解而猶不清楚者在經餘邪未盡耳十二日經盡之時餘邪盡自然餘也集註魏荔彤曰此條申明太陽中風病愈後風邪留滯之證應聽其自愈也

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

重出
衍文

桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也註夫桂枝湯本為解肌中風表虛之藥也若其人脈浮緊發熱汗不出者乃傷寒表實之病不可與也常須識此為麻黃湯證勿令誤與桂枝湯也集註程應旄曰可與不可與在毫釐疑似之間誤多失之於倉卒須常將榮衛之分別處兩兩互勘陰陽不悖虛實了然不以桂枝誤治脈浮緊汗不出之傷寒自不致以麻黃誤治脈浮緩汗自出之中風矣○若酒客病不可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故也註酒客謂好飲之人也酒客病謂過飲而病也其病之狀頭痛發熱汗出嘔吐乃溼熱薰蒸使然非風邪也若誤與桂枝湯服之



則嘔以酒客不喜甘故也〔集註〕成無己曰酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘

酒客得之則中煩而嘔○凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也〔註〕凡酒客得

桂枝湯而嘔者以辛甘之品能動熱助涌故也若其人內熱素盛服桂枝湯又

不即時嘔出則益助其熱所以其後必吐膿血也然亦有不吐膿血者則是所

傷者輕而熱不甚也〔集註〕劉宏璧曰桂枝氣味甚薄酒客不可與者舉一以

例其餘也庸工不得其解每遇熱盛之人但去桂枝與甘辛極熱之類全無顧

忌仲景豈意後人如此之愚哉即如產後不宜寒涼所以舉一白芍之味酸微

寒者以示戒今祇知除去白芍於三黃寒涼等藥反恣用無忌殊不知聖人一

語該括無窮味薄者尚不可與其味厚者可知微寒者既在宜禁而大寒者尤

所當戒世俗不能引伸觸類徒以鹵莽滅裂為事可見上古醫書非精詳玩味

烏能有得耶○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸

者桂枝加附子湯主之〔註〕太陽中風本當解肌若大發其汗如水流漓因而

遂漏不止其人必腠理大開表陽不固故惡風也液傷於內膀胱津少故小便

難也液傷於外復加風襲故四肢微急難以屈伸也宜桂枝加附子湯主之服

依桂枝湯法者是以固陽斂液中和榮衛解風邪也〔集註〕方有執曰此太陽

依桂枝湯法者是以固陽斂液中和榮衛解風邪也〔集註〕方有執曰此太陽

中風誤汗之變證小便難者以汗漏不止必亡陽亡津涎亡陽則氣不足亡津液則水道枯竭且小便者膀胱所司也膀胱本太陽經而為諸陽主氣氣不足則化不行矣 程知曰此陽氣與陰液兩亡復加外風襲入與真武證微細有別真武湯是救裏寒亡陽之失急於回陽者桂枝加附子湯是救表寒漏風之失急於溫經者

桂枝加附子湯方

於桂枝湯方內加附子一枚餘依桂枝湯法

〔集解〕

柯琴曰是方以附子加入桂枝湯中大補表陽也表陽密則漏汗自止

惡風自罷矣汗止津回則小便自利四肢自柔矣汗漏不止與大汗出同而從化變病則異服桂枝麻黃湯大汗出後而大煩渴是陽陷於裏急當救陰故用白虎加人參湯服桂枝麻黃湯發汗遂漏不止而不煩渴是亡陽於外急當救陽故用桂枝加附子湯要之發汗之劑用桂枝不當則陽陷於裏者多用麻黃不當則陽亡於外者多因桂枝湯有芍藥而無麻黃故雖汗大出而元府尚能自閉多不致亡陽於外耳○服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之 註大煩渴陽明證也洪大陽明脈也中風之邪服桂枝湯大汗出後不解大煩渴脈洪大者是邪已入陽明津液為大汗所傷胃中乾燥故也

訂正傷寒論註太陽上篇

宜於白虎加人參湯清熱生津而煩渴自除矣 **集註**張璐曰白虎湯實解內蒸之熱非治外經之熱也昔人以石膏辛涼能解利陽明風熱若不佐以麻葛之品何以走外此說似是而實非蓋陽明在經之邪縱使有大熱而不煩渴自有葛根湯桂枝加葛根湯等治法並無藉於石膏也

白虎加人參湯方見陽明篇

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之 **註**太陽病三

日發汗後熱不解若仍陣陣發熱有汗而不解者是太陽表證未罷也則當以

桂枝湯和之今蒸蒸發熱有汗而不解者乃屬陽明裏證不和也故用調胃承

氣湯 **集註**程應旆曰太陽病三日經期尚未深也何以發汗不解便屬胃也

蓋以胃燥素盛故他表證雖罷而汗與熱仍不解也第徵其熱如炊籠蒸蒸而

盛則知其汗以連綿澀澀而來即此大便已鞭之徵故曰屬胃也熱雖聚於胃

而未見潮熱讖語等證主以調胃承氣湯者於下法內從乎中治以其為日未

深故也 汪琥曰言太陽病不可拘以日數但見屬胃之證即可下也病方三

日曾經汗矣其熱自內騰達於外非表邪不解乃太陽之邪轉屬於胃病熱不

能解也

