

東
銘
寶
鑑
七

東醫寶鑑外形篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

胷

胷膈之名有義

夫人之胷者呼吸之所經飲食之所過一或失節則疾病邪氣交至於胷中乃

有

齒

之

兆

故

謂

之

胷

也

○

膈

也

背脊胷腹周回相着如幕不漏蓋膈者隔也遮膈

○膈膜在心肺之下

○膈膜在心肺之下

○膈膜在心肺之下

○膈膜在心肺之下

肺濁

氣不使

上熏於心

門

胷膈度數

胷闊

四尺五寸

缺盆

以下至

鶻筋

長九

胷膈部位

膈者心肺之

分野也

膈中者心主之宮城也

○膈膜在肺系之後其上卽咽門也

○膈膜在心下橫膈與心肺

也貫膈與肺系相並

胃脘之下卽胃之上口也謂之贲門其膈膜相貼

○心包絡在心下橫膈與心肺

之間亦漫脂相綴也門○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

○心包絡在心下橫膈與心肺

上堅斜膈膜之下與橫膜相粘黃脂漫包者心門也

臟腑經脉皆貫膈手太陰之脉上膈屬肺手陽明之

屬胃絡脾○足太陰之脉上膈挾咽其支者別上膈注心中○手少陰之脉下膈絡小腸○手太陽

之脈下膈屬小腸○足少陰之脉上膈上貫肝膈○手厥陰之脉下膈歷絡三焦○手少陽之脉下膈偏屬三焦○足少陽之脉貫膈絡肝屬膽○足厥陰之脈上貫膈布脇肋○已上十一經皆貫膈惟足

太陽循下于背故不貫膈人銅

脉法

脉陽微陰弦則胷痺而痛陽微故知在上焦陰弦故知胷痺而痛陽微故知在上焦陰弦

○小緊而數脉○心腹痛宜見沉細不宜見浮大搏

沉細宜浮大弦長鑒○心腹痛脉象顯然搏○證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然搏○

胷痞脉滑為有痰結弦伏亦痞澁則氣劣澁○心痛左手脉數熱多也永澁有死血也右手脉緊實

是痰積也。脉大必是久病也。兩手脉堅實，不大便。
可下之痛甚者，脉必伏弱。○痞病右關脉多弦弦。
而遲者必心下堅慄。○心脉微惡為痛微。

心痛與胃脘痛病因不同

心之包絡與胃口相應，徃徃

心下惡痛攝。○真心痛卽死不治。其久心痛者是心之支別絡爲風邪。冷熱所乘痛故成痺不死。發

作有時經久不得差也。○胃之上口名曰賁門。與心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼

爲心痛者誤也。夫九種心痛詳其所由皆在胃脘而實不在心也。○胃脘當心而痛脾藏連心

而痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也。門○

心病者胃中痛摶。○諸經心痛引背多屬

心痛有九種

一曰飲七日，二曰症三日，三曰風四日，四曰悸五日，五曰食六

拈散九元神聖代鍼散煎觀

拈散九元神聖代鍼散煎觀

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果六胡索靈脂并沒藥酒調三二錢一似手拈

九痛元

治九種心痛及積冷心胃痛炮附子三兩吳茱萸入葵乾薑炮巴豆去皮油各一兩狼毒

五錢右爲末蜜丸梧子大溫酒下三五丸

通靈散

治九種心痛蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍藥各五錢右剝五錢水煎入鹽少許服門

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當蓬术各五錢右赤蜜丸梧子大陳皮煎湯

下二十三指十九

蟲心痛

胃脘痛痛定便能食時作時止者是虫痛也丹心痛吐水者虫痛不吐水冷心痛○虫痛

之證青黃宜化虫九化虫散妙應九見坊門○虫痛二

陳湯小兒多有之當與虫部參考治之

症心痛

卒感惡旨尸疰神昏卒倒口噤不省宜蘇合香元丸觀備惠九微觀○與中惡同治門

風心痛

甯麻黃桂枝湯

或肝

邪乘心兩

膀胱引

寒門

或八心氣飲

方視

悸心痛

因七情

怔忡驚

悸以致心

痛宜四

七湯

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

食心痛

因食

生冷或食

物過多以

致心痛宜

香散

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

飲心痛

因食

水或食

物過多以

致心痛宜

香散

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

寒門

或八心氣飲

方視

門

扶陽助胃湯

治胃脘當

心而痛

經日寒氣客

於腸胃

則卒然痛

得熱則已

此藥主

之附

草豆蔻九溫胃湯

治胃脘當

心而痛

經日寒氣客

於腸胃

則卒然痛

得熱則已

此藥主

之附

枝四七湯

治胃脘當

心而痛

經日寒氣客

於腸胃

則卒然痛

得熱則已

此藥主

之附

枝豆蔻九溫胃湯

治胃脘當

心而痛

經日寒氣客

於腸胃

則卒然痛

得熱則已

此藥主

之附

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻益智仁白芍藥
酒炒入參甘草灸官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮

各五分右剉作一貼薑

三片棗二枚水煎服

翊

桂枝四七湯

治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白芍藥酒炒一錢半白朮芩厚朴枳殼各

七分人參紫蘇葉甘草薑各五分右剉
作一貼入薑三片棗二枚水煎服

雞舌香散

治心腹冷痛丁香百枚白芍藥酒炒二兩

良薑一兩甘草五錢右爲末每取二錢

陳米飲

神效散

治一切心脾夜遺冷便作引入背膂痛不可服之絕根木香青皮陳皮麥芽枳殼三稜

蓬术神麴白芍藥白芷肉桂玄胡索破故紙甘草

各六分薑澄茄丁香各三分右剉作一貼入薑五

片棗二枚水煎服

郤痛散

治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢半當歸肉桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分右剉作一貼入
鹽醋各少許水煎服門
各當心而痛枳實二
炒神曲炒五

草豆蔻丸

治

草豆蔻煨白术各一兩
豆蔻生薑青皮陳皮各二錢
炒鹽五

溫胃湯

治

厚朴入參甘草各二錢
白豆蔻薑黃乾薑澤鴻各三錢
寒藥多胃脘痛陳皮黃薑各七錢
散門

抽刀散

治

入薑三斤水煎服陳皮黃薑澤鴻各三錢
名益胃散門

二薑丸

治

大和治令蕙心病心冷
糊丸梧子冷碎去之取椒爲胡椒四十粒
大承氣湯附心面目赤下丸調下

熱心痛

積熱

大便攻心堅宜速入心橘皮乾湯吞下丸調下
眼去入氣湯金鈴子身熱等分爲末
加枳殼施子散芬芳散中

柴胡飲甚

煎各一錢

煎各一錢

連附六一湯

治熱

薑胃脘痛甚黃連六錢附子一錢

右剉作一貼入薑三棗二水煎熟服

門

金鈴子散

治熱厥心痛

金鈴子玄胡索各一兩右爲散末每二錢酒調下痛止與枳朮丸防覩去

莎芎散

治曾服熱藥熱物致胃脘痛久成癟

川芎各五錢黃連梔子各二錢半香附子各二錢辛木香乾姜硝各一錢

梔薑飲

治

胃熱作痛山梔仁十五枚炒焦水一盞煎入生薑汁三匙再煎熟服或入川芎

妙門錢尤

去來痛

心痛或作或止久而不愈也○心包絡爲風邪
冷熱所乘痛故成癰不死發作有時經久不得
差○神仙九氣湯方

元香
麝脾積

心痛亦有六

一曰積心痛二曰胃心痛三曰腎心痛四曰脾心痛五曰厥心痛六曰真心痛

脾心痛

者心下惡痛也○心痛甚而至於脇下如刀剗

心痛

者已連及於脾藏矣古方名爲脾痛者是

也○宜用

如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

訶子散

治心脾冷痛不可忍一服見復元通氣散

訶子炮厚朴

炒甘草莢各等分

右龜末每三錢水一盞入鹽一捻候痛時煎服

胃心痛

者腹脹而心痛胃脘當心而痛內經曰木鬱之

厥陰之勝

胃脘當心而痛上支兩脇嚙咽不通又

太過故民病

有土敗木賊之候也夫胃爲脾之府

加味枳朮丸

治清瘦食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜意氣吞酸嘔

吐脾疼等證白朮三兩枳實蒼朮猪苓麥芽炒神曲

炒半夏各一兩澤瀉赤芍芩川芎黃連東壁主

同炒白螺殼殼煅各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁
土炒青皮蘿蔔蓄子炒乾生薑各五錢陳皮去白便

香附瓜萎仁厚朴檳榔各三錢木香甘草各二錢
右爲末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子大

清米飲下

百九癟

清熱解鬱湯

治心痛卽胃脘痛一服立止山梔子炒

連炒蒼朮各七分

陳皮乾薑炒黑甘草灸各五

清鬱丸散

治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔

香附神曲黃連薑汁沙施子薑汁炒各一錢川芎

六分乾薑炒黑五分甘草灸二分右剉作一貼入

薑三片水煎服

腎心痛

心痛與背相控善瘛如從後觸其心區悶悶者腎

腎傳之心病筋脉相引心下惡痛病名曰瘛疭○腎之積名曰奔豚自膚下上衝心痛最甚五苓散

行氣香蘇散

治內傷生冷外感風寒又觸七情惄怒飲食填滯胃腹脹痛紫蘇葉陳皮蒼朮

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一

錢右剉作一貼

薑三片水煎

不拘時溫服

厥心痛

者因內外邪犯心之包絡或他藏之邪犯心之

痛極則發厥也○厥心痛者他藏病干之而痛

也邪在心則亦心痛○寒厥心痛者手足厥逆

而噦溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩躁其脉

而寒噦溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩躁其脉

洪大可與金鈴子散方觀上○乍間

乍甚成疹久不死名曰厥心痛癲

真心痛

手足青至節名曰真心痛癲○真心痛者

真痛者大寒觸犯心君或污血衝心手足青遇

節者朝發夕死○心爲諸藏之主不

可傷傷之而痛者爲真心痛手足青至節朝發夕

死夕發朝死不假復治○真心痛者因內外邪

犯心君一日即死無治法門

心腹並痛

心腹並痛

靈散

雞舌香散

坊見蟠葱散

散五積散

附桂散

厚朴湯

桂附散

厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

蘇合香丸

靈散

雞舌香散

坊見蟠葱散

散五積散

附桂散

厚朴湯

桂附散厚朴湯

桂附散厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

二炒香良散

治心腹痛

香附子良薑等分各炒爲末

入鹽少許每二錢米欽調下若同炒則

治心腹大痛危急者

桂心五靈脂良薑炒厚

桂心五靈脂良薑炒厚

桂心五靈脂良薑炒厚

桂心五靈脂良薑炒厚

桂心五靈脂良薑炒厚

二胡散

治心腹痛

玄胡索胡椒等分

下附

附桂散

厚朴湯

桂附散厚朴湯

桂附散厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

桂附散厚朴湯桂附散

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

七情作心痛

七情者喜怒憂思悲驚恐蓋喜則氣散怒則

氣上憂則氣沉思則氣結悲則氣消驚則氣

散六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜

七情心痛

七情者喜怒憂思悲驚恐蓋喜則氣散怒則

氣上憂則氣沉思則氣結悲則氣消驚則氣

散六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜

散六情之鬱能止痛也

○息城司候

則氣散所以散六情之鬱能止痛也

○息城司候

則氣散所以散六情之鬱能止痛也

○息城司候

聞父死于賊乃大悲尖尖罷便覺心痛日增不已

月餘成塊狀如覆盆大痛不堪百藥無效戴人至

學巫者雜以狂言以譖病者至是大笑不忍回面向壁數日心中結硬皆散戴人曰憂則氣結喜則

氣散又云喜勝悲內經自有此法門○宜用加味四七湯防覬分心氣飲竊覬

食積胃脘痛飲食過多以致積滯成胃脘痛先用吐法

○或平胃散加神曲麥芽山楂肉門○宜用加味二陳湯防覬加味枳术九坊見

痰飲胃脘痛胃中若有流飲清痰作痛腹中瀉漉有聲及手足寒痛或腰膝背脇抽掣作痛宜用

小胃丹控涎丹方治痰飲胃脘痛白螺螻殼火煅南星炮滑石施子炒便香附子蒼朮各一兩枳殼青皮木香半夏縮砂各五錢右爲末薑汁浸蒸餅和丸菜豆大每五

十六丸薑湯下春加川芎夏黃連冬吳茱萸○

穀九門
一名自螺

瘀血胃脘痛

心痛脉澁者有死血也

桃仁承氣湯

作時飲湯水

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

開之

作痛

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

開之

作痛

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

開之

作痛

玄胡索丸

治死血

作心痛

玄胡索

一兩半桂

心紅花

桃仁三十枚

大烏末湯

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

開之

作痛

勝金散

治瘀血

心痛桂枝

玄胡索五靈脂

當歸

各等分

右爲末

每三錢酒水各半煎服

擗

心胃痛當分虛實

按之

痛止者爲虛

二陳湯

和之

則止者爲虛

二陳湯

和之

則止者爲虛

二陳湯

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

開之

作痛

加味小建中湯

治心腹痛

皆虛寒證

白芍藥酒炒

三錢桂枝

心平日喜食

氣湯下之

熟物以致死血

善姜

留於胃口

一錢半甘草炙遠志
薑汁炒各一錢右
剉作一貼薑五片
棗二枚水煎服

參木散治虛弱人
心脾痛人參白朮乾
薑炮白豆蔻炒各一錢
右剉作一貼

薑三片水煎服入炒過
鮮粉一錢併服尤妙
如川椒大以生薑生地
黃煎湯下二十丸

梔蔓丸治氣實心痛按之
梔痛山梔仁炒焦一兩半
吳茱萸香附子各二錢半
右爲末蒸餅和丸

如川椒大以生薑生地
黃煎湯下二十丸

煮黃丸治大實心痛因怒後飲食卒痛注
闊心胃高起手不可近便閉者可下之
巴豆肉五錢白麪二兩右研匀水丸梧子大取十
二丸用桑木煮熟澆入冷桑內泥冷每一時冷漿
水下一丸一日盡用十二丸得利
卽止宜服橐蒼湯以去餘邪

橐蒼湯服煮黃丸後服此斷根橐本五錢

蒼朮一兩右剉每五錢水煎服

心胃痛治法嘔心寒物而得者於初得之時當與溫散或

心胃痛須分新久若明知身受寒氣口