

金鑑外科 十一

20

編輯幼科雜病心法要訣目錄

初生門下

目爛

生地黃湯

真金散

懸癰

如聖散

一字散

重齟

一字散

清胃散

驚口

清熱瀉脾散

保命散

吐舌

瀉心導赤湯

弄舌

瀉黃散

瀉心導赤湯

重舌

清熱飲

涼心散

木舌

川消散

瀉心導赤湯

覘乳

和中清熱飲

溫中止吐湯

平胃散

枳桔二陳湯

夜啼

釣藤飲

導赤散

蟬花散

胎黃

生地黃湯

犀角散

胎赤

清熱解毒湯

蔣氏化毒丹

赤遊風

犀角解毒飲

藍葉散

砭血法

神功散

豬肉貼法

塗法

初生無皮

換肌消毒散

當歸飲

清涼膏

驚黃散

撲粉法

變蒸

驚風門

驚風總括

驚風八候

通關急救法

通關散

急驚風

清熱鎮驚湯

安神鎮驚丸

至寶丹

牛黃丸

涼膈散

羌活散

瀉青丸

清熱化痰湯

瀉心導赤湯

涼驚丸

急驚後調理法

琥珀抱龍丸

清心滌痰湯

慢驚風

醒脾湯

緩肝理脾湯

夾熱夾痰慢驚

青州白丸子

柴芍六君子湯

慢脾風

溫中補脾湯

固真湯

理中湯

痢證門

痢證總括

陰痢

醒脾湯

固真湯

定痢丹

陽癰

龍膽湯

瀉青丸

四製抱龍丸

驚癰

大青膏

鎮驚丸

痰癰

一捻金

硃衣滾痰丸

食癰

妙聖丹

硃衣滾痰丸

清熱和胃丸

風癰

化風丹

羌活桂枝湯

牛黃丸

編輯外科心法要訣

三里發生膝下三寸初生如牛眼其色青黑左右皆同



三里發生膝下三寸初生如牛眼其色青黑左右皆同

圖發腓



腓發生膝下正中左右皆同

圖癰黃



黃癰生膝下正中左右皆同

者為順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣散

金銀花二兩 小茴香 五香流氣散 甘草各一錢 分為十劑水煎隨病上下服

圖毒蛇青



毒蛇青生膝下長二三寸結腫紫黑頭大尾細左右皆同

丹細條挿入五六分外貼巴膏餘腫數大乙紫金錠

拔疔散 見齒部身方 離宮錠 仙方活命飲 麥靈丹 俱見腫瘍門

白降丹 巴膏 太乙紫金錠

俱見腫瘍門

脛部

三里發○三里發腫牛眼形膝眼之下冷痛凝勞力傷筋兼胃熱腫色青黑紫血膿註此證生膝眼下三寸外側前廉兩筋間初腫形如牛眼拘急冷疼由勞力傷筋胃熱凝結而成漸增腫痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

腓發○腓發在小腿肚情寒煩燥積熱成焮腫痛潰膿血吉漫腫平塌清水山此證發於腓腓即小腿部也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若焮赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者吉為順或漫腫平塌紫暗痛潰清水者為逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者以桂附地黃丸補之外治法同癰疽潰瘍門

仙方活命飲 見腫瘍門 八珍湯 十全大補湯 俱見潰瘍門

桂附地黃丸 見腫瘍門

黃癰○黃癰生腿肚旁疼痛腫若鰓長肝脾濕熱微紅色順出稠膿逆敗漿註此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如鰓其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿

五香流氣散 黃連 獨活 連翹 去心 枯草仁 各一兩 藿香 五錢 丁香 二錢 木香 沉香 各一錢 方五香流氣散黃連流注結核也能膠丁木苘況癰霍草銀花羌獨翹括萆

青蛇毒○青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊癰腎與膀胱濕熱結急鐵蛇頭血出良註此證又名青蛇便生於小腿肚之下形長三寸結腫紫塊癰腎與膀胱濕熱結急鐵蛇頭血出良註此證又名青蛇注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血隨鐵孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃蘗牛膝木瓜亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鐵孔用白降

白降丹 巴膏 太乙紫金錠 俱見腫瘍門

接骨發圖

機骨發生腰骨之下足後跟相接處初
如胡桃腫似物打礮爛之狀兩足皆同



附陰疽高踈之上三寸紅腫如雞卵左右皆同

附陰疽圖



圖疽踝外疽踝內



瘡龍



穿踝疽圖



纏膝

已蒼朮消之若腿脛至晚發熱者宜服當歸拈痛湯如牛膝外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散斂之即效若繞脛而發即名瓜藤

接骨發○接骨發如核桃形腿肚之下硬脹赤色紅漫腫宜速潰遲損筋脈缺踵行註此證生於腿肚之下接膏之上脛骨與足後跟骨相接處故名接骨發屬膀胱經濕熱凝結而成初如核桃其硬如物打磕碰之狀急脹微痛色紅漫腫膿宜速潰遲則膿毒損筋筋脈既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足指着力而行也始終內外台去俱安離疽腫瘍貴早消

附陰疽○附陰疽發內踝上初如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交會濕熱凝註此證生於內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰之穴收斂遲緩調養不可不慎

內踝疽 外踝疽 ○內外踝疽濕寒成血滯氣滯阻於經三陽外側三陰裡初用宣通蒜灸靈註此二證生兩足踝近腕之處在內踝者名走緩一名鞋帶疽在外踝者名脚拐毒蓋內踝骨屬三陰經脈絡也外踝骨屬三陽經脈絡也俱由濕寒下注血滯氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防己以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者服內託黃耆湯發三陽經者服內託羌活湯若虛弱將欲作膿跳痛無時者俱服十全大補湯外敷烏

湯見股部附骨疽○內託羌活湯見髀部上馬癰○十全大補湯見潰瘍門○烏龍膏見腫瘍門

穿踝痕○穿踝疽由脾濕寒裏發串外踝骨間有頭屬陽陰悶腫潰出清水發疾纏註比登由脾經

濕寒下注血滯氣滯而成先從裏踝骨發起串及外踝致令裡外通腫以有頭為陽易破若惟悶腫無頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼有熱也宜服荊防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二踝疽若潰出清水或沒口不應癰綿日久者必成發疾難治

荆防敗毒散 見頭部腦症 ○萬靈丹 見腫瘍門

濕毒流注附金匱經○濕毒流注腿脛生頂如牛眼漫腫形紫青重膿水潰寒濕者熱在腠疑註

止諸生於肚腹行不定或發二處癰頂升於牛眼根肚輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好

肉筋爛日久不愈。以桑葉煎湯。洗之。得在勝理。而肌肉漸病也。初覺急。服散風通。即散加木。牛

上肩窩痛在牛膝夕洗按三女背膈痛在淮換拍乳散之即效老繞脛而發即名瓜脛

歌輕粉並丹藥僧末茶乳有共研成膏清注肺癆諸化腐附濕又止癢
防風通聖散 見頭部禿瘡 ○當歸拈痛湯 見股部腿遊風 ○三妙散 見腹股部腫痛

腎氣游風圖



腎氣游風其腿腰膝如雲片

腎氣遊風○腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火烘疼證由腎火蘊於內膀胱氣滯外受風此證多生於腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘇流氣飲次服檳榔丸外用豆腐研調黃藥末貼敷之甚效
紫蘇流氣飲 紫蘇 黃藥 木瓜 檳榔 香附 陳皮 川芎 厚朴 薑炒 白芷 蒼朮 米泔
等分生薑三片棗一枚水煎服 歌紫蘇流氣藥木瓜榔香附陳皮厚朴蒼朮

水浸 烏藥 荆芥 防風 甘草 獨活 枳殼 麩炒 等分生薑三片棗一枚水煎服

疔防甘獨

枳殼各二兩 木瓜五錢 木香一兩 大黃四兩 共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心白滾湯送下黃

酒送下亦可 貼檳榔枳殼木瓜研木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫痛空心水送自然痊
腫瘡○腫瘡當分內外腫外腫易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱經治宜搜風除濕熱外貼三香灰紙錢註此證生在兩脰內外

腫瘡圖



腫瘡生兩脰之裏外腫瘡

紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼灰紙膏日久瘡色紫黑貼解毒紫金膏又年久頑腫瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣錢法去風毒化腐腐貼黃蠟膏漸效初服黃膏九日久者服四生丸下元虛冷者宜虎骨丸常服甚效但腿脰在至陰之下生瘡者宜戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏

輕粉 乳香 松香 各等分

共為末香油調稠用灰紙一面以鍼密刺細孔將藥夾捲紙內先以葱湯洗淨患處將藥紙有鍼

孔一面對瘡貼之

三日一換 三香輕粉乳松香研末油調紙內藏葱湯洗患方貼藥初起腫瘡用此良

灰紙膏 黃丹 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子 炒 銀朱 枯礬 各等分 共為末量瘡大小剪油紙二張夾藥於內紙

周圍用麵糊粘住

紙上用鍼刺孔先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換新藥貼之 歌灰紙膏貼腫瘡破

黃丹輕粉兒茶沒藥雄黃錫倍銀朱礬油紙夾貼腐可脫

解毒紫金膏

明淨松香 皂礬 各一觔 共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽此藥油紙蓋住以較布繫三日一

換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效 歌解毒紫金腫瘡爛明淨松香皂礬一味研末香油調葱艾草湯洗患

外科心法

蜈蚣錢 蜈蚣 甘草 獨活 白芷 各一錢 桐油二兩將藥煎滾先以米泔水洗淨患處水和白麵作團圍在瘡之四邊勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸熱熱加酒待油溫取下已後風毒自散腐肉自脫其功甚速 歌蜈蚣錢治久腫瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活芷白麵團瘡油湯藥

黃蠟膏 血竭 赤石脂 龍骨 各三錢 共為細末香油一兩入血餘果子大一團燥枯去滓再入黃蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時捏作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻過貼之 歌黃臘血餘竭白膠石脂龍骨入油調蜈蚣錢後此膏蓋肌肉能生痛自消

黃耆丸 黃耆 川烏頭 炮去皮弦 赤小豆 葵藜 炒去刺 地龍 去土炒 川棟子 鹽水泡 茴香 炒 防風 各一兩 烏藥 五錢 右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒送下鹽湯亦可婦人用醋煎滾後溫送下 歌黃耆丸治腫瘡起川烏赤豆共葵藜

四生丸 地龍 炒 白附子 僵蠶 炒 草烏 炮去皮尖 五靈脂 各等分 右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三四十九食前茶酒任下 歌四生腫瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附僵蠶炒草烏靈脂米糊丸

虎落丸 敗龜板 酥炙 四兩 智母 黃藥 二味 熟地 各三兩 牛膝 酒蒸 白芍 酒炒 陳皮 各二兩 瑣陽 酒潤 當歸 各一兩 五虎脛骨 兩 共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入藥末內為丸如梧桐子大每服三錢空心淡鹽湯送下冬月加乾薑二兩 歌虎落丸療筋骨痠下元虛冷精血虧損板瑣陽膝虎脛知母熟地歸

鰓漏 鰓漏生在腿肚間孔如鑽眼津水綿頰類濕瘡濕熱發又湯重洗覺瘡痊此證由濕熱而成初起頗類濕瘡生於腿肚瘡痛相兼破津黃水綿綿不已其孔深如鑽眼復受寒氣侵入瘡孔以致口寒肌冷法宜艾葉老葱煎湯每日先重洗瘡口發熱覺瘡時即貼黃蠟膏收斂而愈 黃蠟膏 見瘡瘡

四彎風 四彎風生腿脚彎每月一發最纏綿形如風癬風邪龍接破瘡瘡難堪此證生在兩腿彎脚彎每月一發形如風癬屬風邪襲入腠理而成其瘡無度接破津水形如濕癬法宜太麥一升款湯先重洗次搭三妙散散瘡濕殺蟲其瘡即止緩緩取效 三妙散 見腹肚痛

風疽 風疽生脛曲四中瘡接皮損津汁膿風邪留於血脈內煩熱昏冒肌腫痛此證生脛骨及曲四之處瘡接皮損津黃汁極其粘膿由風邪留於血脈相搏而成因其根深故有疽名其則身體

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損

圖風疔 四彎風生兩腿脚彎曲四中之處紅腫皮損風疽生兩腿脛骨曲四之處紅腫皮損