

S2942

328

十一兒科吐血方 方脉吐血咳血咯血唾血 鼻衄齒衄  
舌衄肌衄 方方脈癆瘍瘻 方 却病十法 痘有十不  
入附呼吸靜功要訣 任督二脈引導秘旨 十二段錦  
清心說 玄牝衛生諸說

馮氏錦囊秘錄雜症

共三十卷行十二本  
牛部

馬氏錦囊秘錄雜症大小合叢卷十一

勇

乾元龍門

海鹽馬兆張楚瞻前纂輯 門人王崇志慎初全較

男

乾亨禮齋

吐血兒科

經曰營者水穀之精也調和於五臟運陳於六腑乃能入於脈也生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎濡潤宣通靡不由此夫吐血者是營衛氣逆也經曰歟則有血者陽脉傷也夫心者血之主肺者氣之主氣主虛

之血主濡之。榮養百骸。溉灌筋脈。蒙奮相濟。升降上下。自然順適。不失常道。若一有所偏。疾斯作矣。或外于六淫。內因七情。氣乃留而不行。血乃壅而不濡。內外抑鬱。不能流注。是以熱極湧泄。寧無妄動之虞。鬱久奔升。難禦猛行之銳。血猶水也。決諸東則東流。決諸西則西流。氣之使血。其勢相然者耶。是以氣逆而血亦逆矣。且氣有餘便是火。火乘於血。得熱妄行。流溢無拘。上奔而爲吐血也。有因飲食太飽。胃寒不能消化。故吐所食之物。氣血相衝。因傷肺胃。亦令吐血者有之。然陽明主乎多血。若爲熱鬱內逼。即令

妄行故小兒吐血屬胃者十有七八更有尚在膈而吐  
血者多由重幃煖閣火氣薰迫或過啖辛辣流於乳絡兒  
飲之後停滯不散積溫成熟熱極上崩是以或吐或衄或  
下爲尿血者有矣若久嗽氣逆面目浮腫而嗽吐血者是  
肺虛損也隨症治之

辰膠散 治小兒吐下血

阿膠

炒

蛤粉

各一錢

辰砂

水

飛

爲末用藕汁白蜜調服

又方 消瘀止血

用藕節

乾

爲末人參白蜜同煎湯調服

犀角地黃湯

治血虛火盛吐衄妄行溺血便血

犀角

鑑

生地黃

白芍藥

牡丹皮

各一錢  
五分

水煎去渣、入犀角末服之。如忿怒致血者、加山梔柴胡。  
凡稟陰氣至純者、莫過於犀角。得濁陰下降者、莫過於  
地黃。白芍酸收、丹皮清降、涼血止血之要品、寫南實北  
之神方也。因於怒者、氣必逆上、故加山梔以屈曲下行。  
肝喜疎泄、故加柴胡以達其木鬱。本用圓朱、獨名犀角、  
地黃者、所重在二味。白芍丹皮、不遇佐助耳。

當歸補血湯

治氣血虛熱、面赤煩渴、脈大而虛。

黃耆

炙一兩

當歸

酒洗

水煎、空心服之。

東垣曰、經云、脉虛血虛、又云、血虛發熱、此多得於餓飽  
勞役、症類白虎、惟脈不長實爲辨耳、誤服白虎湯必死。  
黃芪乃甘溫補氣之劑、此本血虛、何反用之爲君邪、蓋  
人並病必求於本、又曰、陽生陰長、故血虛補氣治其下

也。佐以當歸之潤，正與陰血相投。二物並行，則上下表裏無處不到，故名補血湯。

雙荷散 治卒暴吐血

藕節七錢 荷葉頭七錢

同蜜搗細，水煎去滓溫服。

天冬湯 治思慮傷心，吐血，衄血。

人參五錢 遠志去心廿錢

芍藥 天門冬去心廿錢

黃耆 藕節 草木樨

阿膠炒粉

沒藥 當歸

生地黃各一兩

甘草炙五錢

每服四錢，姜水煎溫服。

方脉吐血，咳血，咯血，唾血，合參。

經曰：陽明厥逆，嘔咳身熱，善驚，衄血。又曰：大怒則形氣

絕而血菀於上。又曰脾移熱於肝。則爲驚劙。胞移熱於膀胱。則瘡而尿血。又曰結陰者。便血一升。再結二升。三結三升。夫血者。生化於脾。總統於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌溉一身。目得之而能視。耳得之而能聽。手得之而能攝。掌得之而能握。足得之而能步。臟得之而能液。瞞得之而能氣。出入升降濡潤宣通。辨不出此也。飲食日滋。故能陽生陰長。取汁變化而赤爲血。注之於脉。充則實。少則滯。生旺則諸經恃此長養。衰竭則百脉由此空虛。血盛則形盛。血弱則形衰。神靜則陰生。形役則陽亢。故血者難成。

而易虧。失調則變生於反掌。火載則上行。挾濕則下行。爲病種種。妄行於上。則吐衄。衰潤於中。則虛勞。枯槁於外。則消瘦。忘反於下。則便紅移熱。膀胱則溺血。滲透腸間。爲腸風。陰虛陽搏。則爲崩中。濕蒸熱瘀。則爲滯下。熱極腐化。則爲臘血。火極似水。血多紫黑。熱勝於陰。則爲瘡瘍。濕滯於血。則爲癰疹。凝滯於皮膚。則爲冷瘻。畜之在上。則爲忘畜。之在下。則爲狂跌撲損傷。則瘀血內聚。血行清道。出於鼻。血行濁道。出於口。咳血。衄血。出於肺。衄血。出於肝。吐血。出於胃。痰涎。而出於脾。咯血。出於心。唾血。出於腎。耳血。曰衄。

音鼻血曰衄膚血曰血汗曰鼻俱出曰腦竅九竅俱出曰大動便血清者屬營虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬火黑者火極血與泄物並下者屬有積或絡脈傷也尿血因房勞過度陰虛火動營血妄行血色黑黯面色枯白尺脉沉遲者此下元虛冷所謂陽虛陰必走也有嘔吐紫變血者原病式云此非冷凝由熱甚銷爍以爲觸觸熱甚則水化制之故赤兼黑而紫也有汗血者由大喜傷心喜則氣散血隨氣行也下血先見血後見便爲近血自大腸來先有便後見血此遠血自肺胃來腸胃本無血由氣虛陽薄

故血滲入而下出也。東垣曰：除傷寒家，衄血外，凡雜病見  
血，多責其熱。血上行爲逆，其治難；下行爲順，其治易。故血  
上行或驅或嘔，或吐，忽變而下行，爲惡痢者，吉兆也。丹溪  
曰：鼻出血皆是陽盛陰衰，有升無降，血隨氣上，越出上  
竅，法當補陰抑陽。氣降則血自歸經矣。有陽氣本虛，復爲  
寒涼傷之，以致禦殺之氣色脉並見沉而不浮，尺小於寸。  
右弱於左，色淡而血黯者，用生脈散加肉桂一錢，熟附子  
一錢，甘草五分，繼以理中八味，相須間服，喘嗽瘀血皆爲  
平復。故三因方云：理中湯能止傷胃吐血，以其方最理中。

腕○分別陰陽○安○定氣血○凡患人累身受寒氣口食冷物邪  
入血分○血得冷而變○不歸經絡而妄行者○其血必黑黯○其  
色必白而夭○其脈必微遲○其身必清涼不用姜桂而用芩  
之劑殆矣

凡用藥者○要認血來本原不可妄治○以致變亂○夫治血當  
明○血出何經不可槩曰吐血衄血多是火載血上錯經妄  
行○越出上竅○遇用寒涼○夫火者無形之氣也○非水可比○安  
能稱載○蓋血隨氣行○氣和則血循經氣逆則血亂○氣有餘  
即是火也○實由氣逆而血妄行○兼於火化○因此爲甚經日

怒則氣逆。甚則嘔血。暴癥內逆。肝肺相搏。血溢鼻口是也。  
又東垣曰。血妄行上。出於鼻口者皆氣逆也。兄血得寒。則  
凝得熱。則行見黑。則止。迹此觀之。治血若不兼之調氣而  
純以寒涼。是施則血不歸經。且爲寒所凝滯。雖暫止而復  
來也。且脾統諸血。寒涼傷脾。脾虛尤不能約束諸血。其變  
症可勝言哉。然調氣更莫如導火。火歸而氣自順矣。

吐血者。營氣溢入濁道。留聚膈間。滿則吐。血名曰內衄。然  
先哲皆以爲熱。其因於寒者。理亦有之。何則。寒邪屬陰。榮  
血亦屬陰。風傷衛。寒傷榮。各從其類。人果身受寒邪。日食

寒物邪入血分鬱遏內熱無從發洩血乃沸騰在上則從口而出在下則從便而出若此者實病機之所有焉得爲盡無也但其血色之黑與吐血因熱極而反兼水化者相似茲則宜於脉證間求之脉微遲而身清涼者寒也洪數而身煩熱者熱也寒則溫之熱則清之治法大不同矣若吐血發渴者名爲血渴宜四物湯或十全大補湯

凡內傷暴吐血不止或勞力過度其血妄行出如湧泉口鼻皆流須臾不救急用人參十兩或二兩爲細末入飛羅麪一錢新汲水調如稀糊不拘時啜服或用獨參湯亦可

古方純用補氣不入血藥何也。蓋陽統乎陰血隨乎氣有形之血不能速生無形之氣所當急固令無形生出有形也。若有真陰失守虛陽泛上亦大吐血又須八味地黃湯固其真陰以引火歸原正不宜用人參及火既引之而歸矣人參又所不禁陰陽不可不辨而先後之分神而明之有乎其人况人參雖謂補陽乃陽中之陰藥若與白朮黃耆同用峻補後天元氣之陽與附子鹿茸同用大補先天元氣之陽與當歸地黃同用則補陽中之陰率領羣陰之藥上至陽中之陰分所佐一異功用便殊矣。

凡失血之後必大發熱名曰血虛發熱古方立當歸補血湯用黃耆一兩當歸二錢名曰補血而以黃耆爲君陽旺能生陰血也如丹溪於產後發熱用參耆歸芎黑姜以佐之或問曰乾姜辛熱何以用之蓋姜味辛能引血藥入氣分而生新血况炒黑則止而不走若不明此理見其大熱六脈洪大而誤用發散之劑或以其象白虎湯症而誤用白虎立見危殆慎之哉

曹氏云吐血須煎乾姜甘草作湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者若服生地黃藕汁竹茹去生便遠七齋

直指云血遇熱則宣流故止血多用涼藥然有氣虛挾寒  
陰陽不相爲守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走耳  
外必有虛冷之狀法當溫中中溫則血自歸經絡可用理  
中湯加南木香或乾姜甘草湯其效甚著又有飲食傷胃  
或胃虛不能轉化其氣逆上亦能吐利木香理中湯甘草  
乾姜湯最宜出血諸證每以胃藥收功切不可投以苦寒  
之劑故曰實火之血順氣爲先虛火之血養正爲先氣壯  
自能攝血也

褚氏遺書云喉有竅咳血殺人腸有竅便血殺人便血猶

可治咳血不易醫。喚不容物。毫髮必咳。血既滲入。愈滲愈  
咳。愈咳愈滲。飲溲溺者百不一死。言之太過服寒涼者百不一  
生。的確血雖陰類。運之者其陽和乎。觀陽和二字。審氏深  
達陰陽之妙者矣。時珍曰。小便性溫不寒。飲之入胃隨脾。

之氣上歸於肺。下通水道而入膀胱。乃其舊路。故能治肺  
病。引火下行。其味鹹而走血。故治血病。但當乘熱卽飲。則  
真氣尚存。其行自速。冷則惟有鹹寒之性而已。若煉成秋  
石。則真元之氣漸失。不及重便遠矣。

海藏云。胸中聚集之發火。腹裏積久之太陰。上下隔絕。脉