

未1

648.

8

外科真经
下



十二經補瀉溫涼藥品大畧

手少陰心經

補 龍眼當歸柏仁霜熟地黃茯神棗仁遠志

瀉 黃連木通連召生地黃竹葉麥冬犀牛角

溫 桂心乳香元胡索

涼 丹參辰砂紫草茸

手厥陰心包絡經

補 兎絲子玉桂

瀉 大黃山梔炭

溫 川芎 川姜炭

涼 牡丹皮 牛黃

手太陽小腸經

補 巴戟天 益智仁

瀉 車前木 通赤茯苓 海金沙 防已

溫 小茴香 天台烏

涼 滑石 赤小豆

足厥陰肝經

補 當歸 川芎 阿膠 續斷 棗皮 首烏 棗仁 荔枝



瀉 羚羊角胆卓青黛黃芩青蒿草薤蒼赤芍

溫 玉桂吳萸香附木香砂壳

涼 白芍木賊生地黃槐花地榆秦皮薄荷

足少陽膽經

補 當歸棗仁龍骨

瀉 胆草青黛青蒿

溫 棗仁半夏

涼 黃芩竹茹

足太陰脾經



補 黃耆人參白朮山藥茯苓米仁芡實蓮子棗子

瀉 石斛白芍山查麥芽只實萊服子六曲竹茹大黃

溫 砂仁白叩玉蔻陳皮半夏丁香木香泡川姜

涼 連召梔炭石羔

足陽明胃經

補 黃耆人參白朮山藥米仁芡實蓮子糯米

瀉 大黃只實朴硝川朴射干

溫 砂仁白叩川姜丁香玉桂藿香

涼 石羔知母竹葉麥冬干葛



南京中醫藥大學圖書館版權所有

手太陰肺經

補 黃耆人參沙參北五味阿膠百合桑白皮

瀉 亭歷貝母瓜蠟黃芩杏仁枇杷葉

溫 泡姜砂仁

涼 天冬麥冬元參桔梗牛子

手陽明大腸經

補 玉薤訶子粟殼蓮子米仁芡實

瀉 大黃朴硝白頭翁煨榔只實黃蓮苦參丑牛

溫 泡姜吳萸玉桂當歸



源 黃芩 槐花 地榆 萊豆

足少陰腎經

補 人參 白朮 附子 鹿茸 兎絲 枸杞 巴戟 肉蓯蓉 杜仲 熟地

瀉 黃栢 知母 元參 防已 車前 丹皮 澤瀉

溫 玉桂 泡姜 故脂 沉香 胡巴 蛇床子 丁香 韭子

涼 泉地皮 淮牛膝 生地黃

足太陽膀胱經

補 故脂 益智 玉桂 北沙苑

瀉 猪苓 澤瀉 車前 木通 滑石 瞿麥 扁蓄



溫 小茴香 橘核 沉香 荔枝核

涼 黃柏 川練子

手少陽三焦經

補 黃耆 人參 白朮 當歸 附子 枸杞 兔絲 故脂

瀉 生地 黃梔 炭黃芩 胆草 石羔 青黛 大黃 朴硝 丹皮

溫 泡姜 玉桂

涼 連翹 竹葉 黃栢 知母





南京中医药大学图书馆版权所有

吳先生醫按

耳癰

一儒者年近三旬素有耳病每年常發發必腫潰今自耳根下連頸項上至頭角目前耳後莫不腫痛諸醫之治無非祛風瀉火至一月後稠膿鮮血自耳流出每二三日必出酒鍾許然膿血雖出腫痛如故延余診治察其腫痛似屬有餘察其形氣已大不足診其六脉舉之弦急按之緩弱此非寔熱之症乃肝腎不足所死用味地味地黃湯二三劑元氣稍振繼以一陰煎加牛子伏苓宅瀉七厘服之連進三四十劑外



用太極膏搗敷治兩月而後愈

時毒

一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈加沉重延余診治按其六脉浮數有力其邪在表尙未解散用荆防敗毒散加元參公英牛子二服勢減大半再服一劑而痊

瘰癧

一婦人年逾三十瘰癧潰爛久而不愈肢體衰瘦五心煩熱延余診治先以八珍湯加柴胡全蝎夏枯香附貝母連進四五十服形氣漸轉後以必效散一服瘡口遂合惟氣血未能



復元繼以益氣養營湯三十餘服而愈

一婦人孀居子幼未立憂思勞鬱頂間結核經水不調寒熱如瘧形體衰瘦延余診治脉得弦數自是勞傷氣血肝火妄動而成先用逍遙散加香付丹皮貝母服之寒熱退盡次用益氣養榮湯服至月餘經水漸調外用降丹核上點破候孔稍大換用水蠅散點入蓋膏至十日後其核自脫肉換人參養營湯加香附木香三十餘服外搽生肌散而愈

一室女年十七固擇配未遂延至二旬頂間結核數枚堅硬如石經水斷絕寒熱如瘧求治於余脉得細數面容憔悴余

曰此心病也非藥可療彼父悟之卽爲擇嫁三月後復請診
之先用逍遙散加香附青皮梔皮梔炭貝母十餘劑寒熱漸
止次以人參養營湯加丹皮紅花十餘劑通其血脈後用益
氣養營湯服至半載精神頓復經水亦調惟核未全消外用
降丹點破徐用冰獅散起脫再生肌玉紅膏塗之內服補
脾開鬱藥調理一載始得全愈

乳癖

一婦人憂思過度左乳結核如桃似痛非痛咳嗽生痰身發
朝熱求治於余診其六脉微數無力此真氣雖弱而邪火尙

未有餘先用逍遙散加香付貝母公英十餘服咳嗽漸止潮熱間作又以八珍湯加香付公英丹皮柴胡遠志十餘服身熱去其七八又以益氣養營湯加青皮木香服之外用香付餅熨之半載全消

一婦人久鬱右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘延余診治余曰此乳岩之基也乃七情所傷肝經血氣枯槁之症宜補氣血解鬱結藥治之用益氣養營湯百餘劑血氣漸復外用木香餅炙之年餘而消此等症候若用剋伐之劑傷其氣血是速其危也



腸癰

一少婦產後月餘腹中漸痛腫脹如蠱內醫認爲蠱病治之
月餘沉重昏憤求治於余診其六脉細數有力視其腹皮
緊急光亮自是腸癰之症先備淨桶一隻用滾水置內葢之內
用薏苡湯加酒軍二錢徐徐灌服待腹中响痛提起患者坐
桶上熱氣薰蒸其膿下如湧泉患者卽甦更服八珍湯加丹
皮北五味調理月餘而安

附骨症

一男子先腿痛後四肢皆痛遊赤不定至夜益甚醫用除濕

敗毒之劑治之不應延余診治察其六脉舉之則滑按之則澹此濕痰濁血之爲患也用二陳湯加羌活蒼朮桃仁紅花川膝草烏治之而愈凡濕痰苑血流注關節作痛必用辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和方能奏效

一男子年卅餘素多勞碌忽患瘧跳酸痛數月後大股漸腫醫以活命飲二劑未及奏效而腫益甚因慌張亂投或清火或解毒遂致嘔惡發熱飲食不進求治於余余用參耆內托散加泡姜服之而嘔止食進其腫軟熟知其膿透用針刺之出膿不多復用十全大補湯服之遂得大潰潰者五六處腿

肉盡去只剩皮骨足筋短縮但可豎膝仰臥毫不能動動則
痛極自分必成廢物此後內服十全大補湯八十餘劑外用
浮海散蓋膏然後腿肉漸生筋舒如故復成一精壯男子此
余得救本之功也

一男子房後受寒大腿無形作痛至夜尤甚不能動履醫以
散寒除濕消痰止痛藥治之疼痛益增求治於余診其六脉
細澀無力此氣血不足外寒侵襲之症用大防風湯二劑疼
痛頓減又四劑其疾全安

鶴膝風