

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴如經署

備急千金要方卷第九

診谿毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲名短狐。谿毒亦名射工。其蟲無目而利耳能聽。在山源谿水中。聞人聲。便以口中毒射人。故謂射工也。其蟲小毒輕者。及相逐者。射著人影者。皆不即作瘡。先病寒熱。身不喜冷。體強筋急。頭痛目疼。張口欠歛。呼吸悶亂。朝旦少蘇醒。晡夕輒復寒熱。或似傷寒發。石散動。亦如中尸。便不能語。病候如此。自非其土地人。不常數行山水中。不知其證。便謂是傷寒發。石散動。作治乖僻。毒盛發瘡。復疑是瘰癧。乃至吐下去血。復恐疑蠱毒。是以致禍耳。今說其狀類。以明其證。與傷寒別也。方在第二十五卷中。

二十五卷備急蛇毒第
二今改編二十七卷

此方瘧母下法。

灸瘧法

凡灸瘧者。必先問其病之所先發者。先灸之。從頭項發者。於未發前。預灸大椎尖頭。漸灸過時止。從腰脊發者。灸腎輸百壯。從手臂發者。灸三間。

瘧灸上星及大椎至發時。令滿百壯。灸艾炷如黍米粒。俗人不解取穴。務大炷也。覺小異。即灸百會七壯。若後更發。又七壯。極難愈者。不過三灸。以足踏地。以線圍足一匝。中折。從大椎向百會灸線頭三七壯。炷如小豆。

又灸風池二穴三壯。

一切瘧。無問遠近。正仰卧。以線量兩乳間。中屈。從乳向下灸度頭。隨年壯。男左女右。瘡瘧。上星主之。穴在鼻中央直髮際一寸。陷容豆是也。灸七壯。先取諛諛。後取天牖。風池。

瘧日西而發者。臨泣主之。穴在目眥上。入髮際五分。陷者。灸七壯。

瘧。實則腰背痛。虛則顛衄。飛揚主之。穴在外踝上七寸。灸七壯。

瘧多汗。腰痛不能仰。目如脫。項如拔。崑崙主之。穴在足外踝後。跟骨上陷中。灸三壯。五臟一切諸瘧。灸尺澤七壯。穴在肘中約上。動脈是也。

針瘡法

諸瘡而脈不見者。刺十指間出血。血去必已。先視身之赤如小豆者。盡取之。

瘡。刺足少陰血出愈。

肝瘡。刺足厥陰見血。

心瘡。刺手少陰。

脾瘡。刺足太陰。

肺瘡。刺手太陰陽明。

腎瘡。刺足少陰太陽。

胃瘡。刺足太陰陽明。橫脈出血。

米別錄治寒熱利大腸時珍甘草清肺熱恆山驅瘧痰或吐或不吐而肺瘧痰聚胸

中來去不定心寒發熱善驚如有所見亦除

五方肝心脾腎肺瘧吐法

胃瘧內積

藜蘆丸 五臟并有瘧候六腑則無獨胃腑有之胃腑瘧者令人旦病也善飢

而不能食食而支滿腹大此湯主之

藜蘆

皂莢

恆山

牛膝各一兩

巴豆枚二十

右五味先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜丸如小豆大旦服一九正發時一

丸一日勿飽食肘後無恆山牛膝

胃瘧內積旦病善飢不能食食而支滿腹大邪入陽明之腑其人本有寒濕鬱熱蒸

將成蠱證藜蘆丸藜蘆皂莢涌痰濕牛膝逐血氣前治勞瘧瘵截法巴豆破寒積仍用恆山

驅瘧痰蜜丸甘緩或吐或不吐而胃瘧旦病善飢不能食而支滿腹大亦除

此方胃瘧吐下法

瘧母內積

龜甲煎丸 病瘕一日發當以十五日愈說不瘕當盡片角也不愈當云作白

曰此病結為癥瘕名曰瘕母急當治之

成死鼈十二斤治如食法要畧作鼈甲三兩

半夏

人參

大戟各八銖

瞿麥

阿膠

紫葳一作紫宛

牡丹皮

石韋

乾薑

大黃

厚朴

桂心

海藻要畧作赤消

葶藶

羌蛭各二銖

蜂窠

桃仁

芍藥

烏羽燒一兩烏扇

黃芩各十銖

蠱蟲

蟲蟲各三十銖要畧作鼠婦

柴胡一兩半

右二十四味末之取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗以酒漬灰去灰取酒煮鼈

盡爛泯泯如漆絞去滓下諸葯煎為丸如梧子大末食服七丸日三

仲景方無大戟

海藻

瘕母內積病結癥瘕邪入少陽陽明之腑鼈甲煎丸用大柴胡湯加味柴胡半夏芍

藥生薑黃芩大黃瀉膽熱加桂心厚朴乾薑溫經冷葶藶烏羽海藻大戟瞿麥石韋

泄痰濕丹皮紫葳桃仁通瘀濁阿膠滋血液死鼈搜肝邪蠱蟲蟲蟲羌蛭蜂窠破堅

積酒漬溫行而瘕母結為癥瘕亦愈

方 治心熱為瘧不止。或止後不歇。乍來乍去。令人煩心。甚欲飲清水。反寒多。不甚熱者。

甘草 一兩

蜀漆 三兩

恆山 四兩

石膏 五兩

鼈甲 四兩

香豉 一升

梔子

烏梅 各三枚

淡竹葉 升二

右九味。咀。以水九升。煮取三升。分三服。

心瘧。內熱。乍來乍去。令人煩心。欲飲清水。反寒多。不甚熱。

熱盛於內。寒格於外。

如上法減味。竹

葉石膏。梔子。香豉。清心熱。烏梅。鼈甲。搜肝邪。恆山。蜀漆。驅痰瘧。或吐。或不吐。而心瘧。

乍來乍去。煩心。欲飲清水。反寒多。不甚熱。亦除。

脾瘧內熱

恆山丸

治脾熱為瘧。或渴。或不渴。熱氣內傷。不泄。令人病寒。腹中痛。腸中鳴。

汗出。

恆山 三兩

甘草 半兩

知母

鼈甲 各一兩

右四味末之。蜜丸如梧子。未發前。酒服十丸。臨發時。一服。正發時。一服。

脾瘧內熱。或渴。不渴。熱氣內傷。不泄。

土鬱不發。木氣不伸。

病寒。腹痛。腸鳴。汗出。邪入太陰之臟。

脾瘧或渴不渴熱氣不泄腹痛腸鳴汗出亦除

腎瘧內熱

恆山湯

治腎熱發為瘧令人淒淒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不

定手足寒

恆山 三兩

烏梅 三七枚

香豉 八合

竹葉 切一升

葱白 一握

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服至發令盡

腎瘧內熱腰脊痛宛轉大便難

腎為二便之關

目眴眴然身掉不定手足寒

陽盛格陰

邪入少陰

之臟恆山湯竹葉葱白合香豉通腎熱

仲景少陰病白通湯用葱白成無己腎惡燥急食辛以潤之葱白辛溫以通陽氣也烏

梅搜肝邪恆山驅瘧痰或吐或不吐而腎瘧腰脊痛大便難目眴身掉手足寒亦除

肺瘧內熱

恆山湯

治肺熱痰聚胸中來去不定轉而為瘧其狀令人心寒寒甚則發熱

熱間則善驚如有所見者

恆山 三兩

秫米 二百二十粒

甘草 半兩

右三味㕮咀以水七升煮取三升分三服至發時令三服

肺瘧內熱痰聚胸中來去不定心寒發熱善驚如有所見邪入太陰之臟恆山湯秫

桂心

人參

知母各半

桃仁八十枚

右十六味為末。蜜丸。空心煎細茶下。三十九日。二服。老少孩童。量力通用。無所忌。

勞瘧。內瘵。寒熱久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少。邪入厥陰之經。如上法加味。烏梅丸。升麻。柴胡。前胡。桂心。豆豉。散寒熱。知母。百合。地骨皮。玄參。清燥火。烏梅。鱉甲。搜肝。邪。蜀漆。恆山。驅瘧痰。加桃仁。攻勞瘵。從蓉。補腎精。人參。益胃氣。蜜丸。甘。緩。或吐或不吐。而勞瘵寒熱久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少。亦除。

二方勞瘵吐法。

幹南按。勞瘵治法。兩方皆用恆山。蜀漆。而方後并不言吐。大約勞瘵久深。有烏梅。鱉甲。直入肝臟。且蜜丸。甘。緩。停留胃腑。或吐。或不吐。自在意中。即吐亦必微耳。

勞瘵內痺

方 治勞瘵。積時不斷。衆治無效。

生長大牛膝一握。切。以水六升。煮取二升。分再服。第一服。取未發前食頃。第二服。取臨發時。

勞瘵內痺。積時不斷。衆治無效。不可無截法。生長大牛膝一味。逐血氣。走經絡。直入

勝勝導積熱邪氣轉出太陽之表通法即截法未發臨發一再服功專力厚用奏殊功。

此方勞瘧截法。

肝瘧內熱

烏梅丸 治肝熱為瘧令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉狀如死者或久熱勞微動如瘧積年不瘥。

烏梅肉

蜀漆

鼈甲

姜蕤

知母

若參各一兩

恆山半兩

石膏二兩

甘草

細辛各十銖

香豉一合

右十一味末之蜜丸如梧子酒服十九日再飲服亦得。

肝瘧內熱顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉如死內風厥逆或久熱勞如瘧邪入厥陰之臟如上

法減味烏梅丸專用豆豉

別錄治傷寒寒熱瘧氣

散寒熱石膏知母甘草姜蕤合苦參清勞熱

烏梅鼈甲搜肝邪恆山蜀漆驅瘧痰佐用細辛開喘悶蜜丸酒服和濟或吐或不吐而肝瘧色蒼氣喘戰掉及久勞熱如瘧亦除。

心瘧內熱

大五補湯 治時行後變成瘴瘧。

桂心三十枚

遠志

桔梗

芎藭各二兩

茯苓

乾地黄

芍藥

人參

白朮

當歸

黃耆

甘草各三兩

竹葉五兩

大棗二十枚

生枸杞根

生薑各一斤

半夏

麥門冬各一升

右十八味㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次納諸藥煎取六升分六服。

一日一夜令盡。

瘴瘧時行後變病內飲邪入三陰心肺脾腎之經變上法大五補湯桂心芍藥甘草生

薑大棗和營衛竹葉桔梗半夏茯苓泄瀉飲芎藭當歸通肝血遠志安心神地黄枸

杞麥冬滋腎水黃耆人參白朮益脾陽妙先煮竹葉枸杞先清後補入陰出陽曾無

誤補助邪之患而時行後變成瘴瘧亦除。

此方瘴瘧補法。

勞瘧內燥

蜀漆

麥門冬

知母

白薇

地骨皮

升麻各三銖

甘草

鼈甲

烏梅肉

姜蕤各一兩

恆山一兩半

石膏二兩

豉一合

右十三味為末。蜜和丸。如梧子大。飲服十丸。日再服之。稍稍加至二三十丸。

此神驗。無不瘥也。加光明砂一兩。

勞瘧翼源。勞瘧候。凡瘧積久不瘥。則表裏俱虛。客邪未散。真氣不復。故疾雖暫間。小勞便發。內燥。并積勞寒熱似瘧。邪入厥陰

之經。蜀漆丸。升麻。白薇。豆豉別錄。豆豉治傷寒寒熱瘧氣。散寒熱。石膏。知母。甘草。麥冬。姜蕤。地骨

皮。清火燥。烏梅。鼈甲。搜肝邪。蜀漆。恆山。驅瘧痰。方後加光明砂。補真氣。蜜丸。甘。緩。或

吐。或不吐。而勞瘧。并積勞寒熱似瘧。亦除。

勞瘧內瘕

烏梅丸 治寒熱勞瘧。久不瘥。形體羸瘦。痰結胸堂。食飲減少。或因行遠。久經

勞役。患之積年不瘥。服之神效。

烏梅肉

豆豉各一

升麻

地骨皮

柴胡

鼈甲

恆山

前胡各一兩

肉蓯蓉

玄參

百合

蜀漆

方 治瘧無問新久者。

小便半一升

蜜二七

右二味。煮三沸頓服。每發日平旦時服。勿食重者漸退。不過三服瘥。

又方

鼠尾草

車前子

各一虎口

右二味。咀咀。以水五升。煮取二升。未發前服盡。鼠尾草治痢逐濕。

又方

馬鞭草汁五合。酒三合。分三服。馬鞭草入肝散血。

又方

服翹搖汁。

又方

擣葭蓉根。燒為灰。和水服一合。量人大小強弱用之。葭蓉即天仙子。治邪瘧殺蟲。

又方

瓜蒂二七枚。擣。水漬一宿。服之。

又方

水服桃花末。方寸匕。

又方

常以七月上寅日採麻花酒服末方寸匕麻花治諸風惡血

又方

故鞋底去兩頭燒作灰井華水服之

瘡瘻內癖

鯪鯉湯 治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘻

鯪鯉甲枚十四 鼈甲

烏賊骨各一兩 恆山 三兩

附子一枚

右五味咬咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜之勿絕吐也兼以塗身斷食過時乃食飲之

瘡瘻其病重於傷暑之瘻 內癖乍寒乍熱乍有乍無邪入厥陰之經鯪鯉湯鯪鯉

烏賊骨入通經脈鼈甲入搜肝邪附子直攻堅癖酒漬升發陽氣雖吐勿絕兼以塗身與前溫瘻內燥方下同法經年瘻內冷方藥同意皆千金之秘

此方瘡瘻吐法

瘡瘻內飲

恆山三兩為末。以雞子白和。并手丸如梧子大。置銅器中。于湯中煮。令熟。殺腥氣。則止。以竹葉飲服二十九。欲吐。但吐至發。令得三服。時早可斷食。時晚不可斷食。可作葉汁煮糜。少食之。

溫瘧。經年不瘥。內熱。熱入少陰之經。即前溫瘧內燥。竹葉石膏秫米恆山法。去石膏。用竹葉涼心。經去秫米煮稀糜。滋胃氣。仍用恆山驅瘧。易湯為丸。雞子白亦利清心之用。雖置銅器。不露高寒。欲吐。取吐。而瘧亦無不解矣。

此方經年瘧吐法。

梔子湯。主瘧經年不瘥者。兩劑瘥。一月以來一劑瘥。

梔子枚十四

恆山三兩

車前葉二七枚 秫米粒十四

右四味。㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。未發一服。發時一服。發後一服。以吐利四五行為瘥。不止。冷飯止之。

溫瘧。經年不瘥。內熱。熱入少陰之經。對少梔子湯。即前溫瘧內燥。竹葉石膏秫米恆山法。去竹葉。易車前葉。利小腸。去石膏。易梔子。清心熱。仍用秫米。滋胃氣。恆山驅瘧。痰或吐。或利。而瘧更無不解矣。

此方經年瘧吐利法。

經年瘧內冷。