

眼科大全

民國三年仲夏
海陵書局題

七

服五分空心米湯送下。重其病者大小用之。忌一切生冷油麵炙煨等物。

治時症地黃煎此藥性平不寒不燥以日本藥主地黃
煎地黃
川芎
杏仁
赤茯苓

半斤
天麻
地骨皮
當歸身
枳殼
甘草
大黑豆
汁
和藥末
煉蜜

右為細末煖蜜為丸如龍眼大空心清酒化下

魚肝油
右為細末五兩一與雞肝一具淨洗去脂膜

竹安、武備、振華、夜香、草豆蔻、皮打石、用木注水、生薑、鹽口老藥、土作片、空心胆區、治食之肝、脾。

五丁如飛其速已莫守羣
三集更肝胆二經清氣風

度母於摩竭宮中見其親下調皮脫胎衆口內有象牙齒或牙齒頭落腔爛下卻生唇

凡每兩勻作十份，其大小而限，用白蜜湯之下。

是方曰白濁和紅補脾腎。忌食血熱之物。

五內帶熱。片。是有氣上升。為左木香。氣自早。和諸藥。燒。更。

史君子用白者西凡赤皮用色白者紅者不可用以米泔水浸凡木少許打雷无每一歲

用一分男用雄勿犯鐵器洗去毒候血水化半熟煎藥食量不過三四服見效苦弱保加木賊燒灰

雜貨珍珠各一錢男婦老幼

青黛 天麻 夜明砂 五五脂 川芎 麝香 川黃連 三蛇 龍膽草 蛇退 三蛇 防風

右為細末。猪胆汁浸，燒成丸。如麻子大。每服十九。薄荷湯送下。晝化。

寶鑑灸法目脂眼法

小兒雀目。夜不見物。交手大拇指甲。長一寸。內脾橫紋。頭白肉際。又一柱。如小麥大。

小兒疳眼。各各二天。各一壯。往如小麥大。在手大指次指兩骨間陷中者是。

升麻乾葛湯治暴發而目紅腫及局文熱和爭河隴云升麻
桔梗各五羌活各五川芎各五防風各五乾葛各五

白芷各二錢 陳皮 甘草 芎 右剉劑 姜一片 葱白一段 白水二鍾煎至一鍾去滓

熱服取汗為度

車前子散 治小兒疳積積熱上攻眼中生翳生翳血滯神多眵 蜜炙花 羌活 車前子 炒 粉草 炒 白藜疾 黃芩 炒 單決明 附

花龍魚各五分石為末。每服二錢。食後飯湯送下。

養肝丸治小兒肝血不足眼目昏花或生翳膜及視無力
防風
當歸身酒洗
白芍藥酒洗
川芎酒洗
羌活酒洗
獨活酒洗
桑寄生去鹽
秦艽酒洗
前子酒洗
熟地酒洗

翻姜乾仁去鹹水油除濕地骨蒸霜另入餘為細末煉蜜為丸或一錢或五分一丸重嬰孩大小每服一

丸滾白湯不拘時服。若治大人乃作小丸。每服三錢滾湯送下。

通頂散
治小兒驚風熱極骨蒸閉目不川
用威靈仙酒洗日干炙赤日
薄荷各五錢
甘草各三錢
右為細末煎服

吹鼻中即効。如要嚏噴。加腳踏花一錢。只用朴硝吹鼻亦奇。

驚子如日諸五緯皆屬木之性也經曰風淫所勝平以辛涼世何以熱藥治風邪乎

乾癸補腎丸

所罕聞。謹請勿正。邪背中存。上舉下陷。或傾或煩。氣所使動。人所不能。筋脈振惕。緊急難伸。之實。

調治免致傷深

此症謂目病。六氣不和。或因風邪所襲。胞筋如攪。遂不得人轉。而自轉。淚下。下之不能上。上之不能下。或左或右。修易無時。蓋轉動搏擊不定。筋脈振揚。緩急無常。故其牽拽而為害。甚則氣定睛偏。而珠歪。如神珠將反之狀。甚則翻轉。而為瞳神反背云。宜服釣睛散子。

釣藤飲子
釣藤分五 休黃分五 甘草各三分 天麻
刺。白水二鍾。煎至八分。不拘時服。
川芎
防風
人參七
全蝎以去毒一服
蠶蚕此一分
右剉

雙目暗通症

雙目睛通。庸醫誤識。此幼時所傷。非壯年所得。欲看東而反顧其西。彼有出而反顧其入。為醫助幣轉幼因風熱所逼。患即醫之。庶無終夫至長求醫。徒勞心力。

此症謂幼時目睛偏斜而視亦不正。至長不能愈矣。患非一端。有脆嫩之時。目病風熱。攻損腦筋。急縮者。有因驚風。天吊。帶熱筋絡。失於散治。風熱遂致凝結。經絡而定者。有因小兒眠於牀下。卑處側視。既久。遂致筋脈滯定而偏者。凡有此症。急宜乘其日近。氣未定治之。若至久。筋絡血氣已定。不復愈矣。宜服牛黃丸。

牛黃丸 治小兒驚風 因失候 藥打 兩差 頭面 顛倒 者 此丸 牛黃 珍珠 天竺黃 琥珀 青黛 雄黃 等

分白附子 炮地龍 路手 麝香 沙金箔 鹽加蘇合油 香油 以上前九味各另研極細共為一處再用甘草一兩水一碗煎汁減半入蘇香二油各少許一處拌勻和為丸金箔為衣量其大小薄荷湯化下乳母及小

耐小兒目閉不開。睛目直視。目仰視。目睛動。目斜。諸症驗方。

目閉不開 足大過經為目上翳足陽明之經為目下翳翳則筋數目不開宜服助陽湯治如湯見二卷○又小
次如三日不開用生地黃散服凡小兒不洗淨時後
汁必致沒清於日時中連服亦痢至其不處宜通

人參湯治同感 人參 麥門冬 北當歸 白米 防風 白芍藥 獨活 黃芪 各一錢 官桂

七枚 右剉剉白水二鍾煮至八分去滓食遠服

生地黃散 乾地黃 赤芍藥 川芎 甘草 當歸身 天花粉 右為細末蜜其大小燈心湯調搽入口

內

明目直視使神志不覺 治目直視者視物而目睛不轉動者也若目睛動者非直視也得寒直視者邪氣壅盛目其正氣

已弱又受風邪上目睛赤腫流淚不止此目直視也治之不能視物者此目直視也治之不能視物者此目直視也

直視者此目直視也治之不能視物者此目直視也治之不能視物者此目直視也治之不能視物者此目直視也

目直視治之不能視物者此目直視也 治之不能視物者此目直視也治之不能視物者此目直視也

山枕仁 防風 大黃 右共為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸煎竹葉湯化下或沙糖

湯化下亦可右治大人每服二三錢量服

肝主風少陽膽則其睛也少陽之經行于兩脇風熱相干故不能安卧此方名曰瀉青瀉肝膽也龍膽草味

苦而厚故入厥陰而瀉肝少陽火實者頭角必痛故佐以川芎少陽火鬱者必生煩燥故佐以梔子肝者將

軍之官風淫火熾勢不容以易治故又用熱大黃用歸身者培養肝血而不使其為風熱所燥也俱用川羌

活防風者二物皆升散之品此火鬱發之木鬱達之意乃上下分消其風熱皆所以瀉之也

和太師平黃丸治大小男婦 平肝中風必通利肝精神昏迷不省人事牙關緊閉目睛直視石熱火熾

黃蛇蛇黃文煨 辰砂 礞石 石綠 石斛 輕粉 細牛黃 粉霜 麝香 金箔 銀

見錄

卷四

下二

金箔 銀

金箔 銀

金箔 銀

傅氏眼科審視瑤函總目

卷之五

瞻視昏渺症

明目地黄丸

鹿二仙膏

三仁五子丸

地黃丸

洞見碧霄

又方

晴黃視渺症

葛花解毒飲

乾濕昏花症

四物五子丸

坐起生花症

加減豎景丸

雲霧粘睛症

豬苓散

止痛散

又方

摩頂膏

治眼花見物法

螢星滿目症

滋陰降火湯

加味坎離丸

神光自現症

補水寧神湯

黑夜睛明症

加減八味丸

視正反斜症

補陽湯

連藥益陰丸

視定反動症

釣膝散

升陽瀉陰湯

視物顛倒症

羚羊角散

視一為二症

補肝散

視赤如白症

復明湯

瞳神散大症

慈活退翳丸

瀉肝湯

調氣湯

清痰飲

瞻神縮小症

清腎抑陽丸

能遠怯近症

地芝丸

六味地黃丸

能近怯遠症

定志丸

補腎磁石丸

神水將枯症

滋腎丸

補腎丸

聚開障症

生熟地黃丸

調中益氣湯

東花障症

羚羊角散

圓翳障症

空青丸

羚羊角散

水晶障翳症

七寶丸

劍脊翳症

七寶湯

魚鱗障症

羚羊角散

暴盲症

加味逍遙散

柴胡參朮湯

青盲症

鎮肝明目羊肝丸

復明丸

高風障症

人參補胃湯

補中益氣湯

青風障症

羚羊角湯

羚羊角散

綠風障症

半夏羚羊角散

烏風障症

白附子湯

涼膈丸

僂月障症

補肝散

墜翳丸

如銀障症

石決明散

還睛丸

非神如側症

生犀角丸

還睛丸

定氣散血散

轉光丸

又方

熊胆丸

還明散

本事方

獨參湯

傳氏眼科醫視瑤函卷之五

務陵傳仁字允科纂輯

廣陵林長生聲實較補

運氣原證

增張文鳳建

男傳維藩國棟

大梁周靖公亮節教梓

公

公

按內經原氣所來風燥火侵或水復金弱木侮火勝民病目昏大要有四一曰風熱經曰少陰司天之政風熱

各布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復之作民病瞤瞤此各布風熱目昏也二曰熱經云少陰在泉熱淫

所勝病目瞤治以鹹寒此熱勝目昏也三曰風經云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視眊眊此風勝

目昏也四曰燥經云陽明司天燥淫所勝目昏瞢治以苦熱是也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

視瞳眴眴有多端血少神勞與損元若是人年過五十要明須是見仙丹曾經病目後眴眴各尋緣

瞻視眴眴症

參者四物湯等劑助氣血運行而明也
血少神勞與損元若是人年過五十要明須是見仙丹曾經病目後眴眴各尋緣
目昏經云腎是少陰之脉始則目昏左腎陰虛右腎陽虛○則河間曰目眩不明然也然玄府者陰內之玄府也

此症謂目內外無症候。但自視昏渺。瞳睛不清。更有神勞。有血少。有元氣弱。有元精虧。而昏渺者。若人年五十以外而昏者。雖治不復光明。其時猶月之過望。天真日夜自然目光漸衰。不如一元還返之初。雖妙難回。故曰不復食矣。此章專言平人之昏視。非若因病昏渺之比。各有緣故。須當分別。凡目病外障而昏者。由障遮之。故發成內障而昏者。細視瞳內必有氣色。若有障治愈復而昏渺者。因障遮久。滯滯其氣。故光隱耗。當培其本。而光自發。有因目病漸發。漸生。損損經絡。血液濕少。故光華虧耗而昏。有因目病失治其內。寒熱過傷。及開導錯治。泡髮失當。而損傷其血氣。耗其精華而昏者。以上皆宜培養根本。棄其初時而治之。久則氣脉定。雖治不愈。若目因痛而昏者。此因氣滯火壅。絡不和暢。而光濕。譬之烟不得透徹。故大光不明。如目暴痛。愈後尚昏者。血未充足。氣味和暢也。宜慎養以免後患。若目病久愈而昏渺不醒者。必因六慾七情。五味四氣。瞻視哭泣等故。有傷目中氣血。精液脉絡也。宜早調治。若人未五十。目又無痛。赤肉障之病。及斷長精元之因。而昏渺無精彩者。其一人。壽凡人年在精強。而多傷其元真。或苦思勞形。縱味久患。頭風素多哭泣。婦女經患損血。而目內外別無症候。但覺昏花。月復月而年復年。漸漸昏渺者。非青盲即內障也。宜服

明目地黄丸

治腎虛目暗不明

熟地黃 四兩 生地黃 酒洗 山藥 澤瀉 山茱萸 酒洗 牡丹皮 酒洗 茯苓 茯神 乳突 當歸 身 酒洗 五味子 二兩 右為細末 煉蜜為丸 如桐子大 每服三錢 空心淡鹽湯送下 忌蘿蔔

精生氣。氣生神。故腎元一虛。則陽光獨治。陽九獨治。則壯火食氣。無以生神。今人目暗不明。王水曰。壯水之主。以制陽光。故用生熟地黃。山茱。五味。當歸。丹皮。澤瀉。味厚之屬。以滋陰養腎。滋陰則火自降。養腎則精自生。用山藥者。所以益脾。而培萬物之母。茯神者。所以養神。而生明照之精。柴胡者。所以升陽。而致神明之氣。於精明之窠也。孫思邈曰。中年之後。有目疾者。宜補不宜瀉。可謂開萬世之秘矣。

鹿二仙膏此膏最滋陰補腎壯陽益氣少氣目鹿角片龜板斤枸杞子各人參兩右附鹿角碎龜板

打破長流水浸三日。刮去垢。入砂鍋。用河水漫火。魚眼湯。煮三晝夜。不可斷火。當添深水。不可添冷水。至三日。取出。曬乾。碾為末。另用河水。將末并枸杞。人參。又煮一晝夜。濾去渣。再慢火熬成膏。初服一錢五分。漸加至三錢。空心無灰酒下。精氣神。人身之三寶也。經曰。精生氣。氣生神。是以精損。則無以生氣。以致瘦削。少氣。氣少。則無以生。以致目昏不明。鹿得天地陽氣之靈。金善通任脉。足於精者。故能多滋。而壽。龜得天地之陰氣。最厚。善通任脉。足於氣者。故能休息。而壽。其角與板。又二物聚精氣神之最勝者。取而為膏。以補之。所謂補以類也。且二物氣血之屬。非草木藥石之可比。况又得造化之玄微。其類有情。以血而補氣血之法也。人參為陽。補氣中之陰。枸杞為陰。清神中之火。是膏也。補陰補陽。無偏治之失。入氣入血。有和平之美。由是晴日生。而氣日旺。氣日旺。而神日昌。庶幾想龜鹿之年矣。故曰二仙。

三仁五子丸治肝腎不足。體弱。眼昏。柏子仁。肉蓯蓉。酒浸。草薢。酒浸。以仁。酸棗仁。酒浸。炒。枸杞子。酒浸。炒。免絲。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

地黃丸一名補花丸。治用力勞心。肝虛。風熱。及眼赤。眼痛。生翳。膜。肝腎以虛。熱。其上面。而月。滿。久。視。

暗黃視砂症

風輪好似黃金色。視亦昏朦清不得。黃熱入睛瞳。清氣每遭濁氣遏。壯年不肯輕疑。老至竟屬視昏。此症專言風輪黃亮如金之色。而視亦昏渺。為濕熱重而濁氣黃蒸之氣。被其擾亂。故瞻黃色。如酒色食熱燥腥膩之人。每有此病。與視瞻昏渺不同也。宜服

萬花解毒飲

此藥清火熱解毒。凡眼目之病。皆宜服之。

黃連

黑元參

當歸

龍胆草

茵陳

細甘草

菊花

熟地黃

茯苓

山梔仁

連翹

魚肝子

右列劑

白水二錢

煎至八分

去滓

食遠服

乾濕昏花症

乾就濕濕不爽。渺渺無殊不自在。奈因水少精液衰。其待枯乾光損壞。

此症謂目日覺乾濕不爽。利而視昏花也。因勞瞻竭視。過度多思。就酒恣飲。人。不忌房事。致傷神水。目必有此症。如細絨赤脉。及不潤澤等病。皆合服養光。久則得效。略潤開則明。可見水少之故。若不識成。保養。其則傷神水。而枯濕之病生焉。惟急宜陰養水。略帶神火。以培其本。本立則清純之氣和。而化生之水潤。若誤認為大症。而用開烙鑄。洩之治。則有細小緊縮之患。宜服

四物五子丸

治心腎不足。眼目昏花。

熟地黃

當歸

地膚子

白芍

兔絲子

川芎

覆盆子

枸杞

車前子

黃牛膝

治腰膝痛。

黃牛膝

羊脂

鯉魚膽

白蜜

胡黃連

青皮

川黃連

熊膽

各二

右將

諸藥末

與鹽並膽汁

和勻

入磁瓶內

以細紙封頂

年固

坐飯

飯後

待飯熟

為度

用新淨綿濾過

每以麝香

取如麻子大

點於目

每日二三

次

又方

治人至夜則目

淚好睡

取眼目一

枚

燒為末

水調

頻注目中

久則不

睜

取目以

蠟燭

暗時不使人知

坐起虛花症

此症內外別無他症。但其人動作少過。坐起少頻。或久坐。或久立。久眠。久相便。覺頭眩目花。昏運也。乃元氣怯弱。陰精虧損。致水少液枯。脈絡衰疲之咎。惟陰弱陽盛。水不勝火。每有此患。宜服

加減
注景丸
治腎氣虛弱
或肉障久服
能安魂定魄
補血氣
滋陰
壯陽
五
味子
各三
當歸
酒洗
熟地

黃三
川椒去目 諸寶子此乾麝香者 兔絲子水淘淨酒煮
可同各一兩 焙乾半斤
右為細末，蜜水煮糊為丸，如桐子。每服三十九。

空心溫湯送下煎湯亦可

止痛散
治兩頰角
內障也
得之於
知飽勞
役收斂
根二
柴胡一
兩炙甘草
生地黃
各四兩
黃芩二
兩一兩炒

石為粗末每服三錢水一銖半姜三片煎去滓臨卧熱服若小便不利加茯苓澤瀉各五錢

摩頂清治眼目
 懸視生黑花或如水滴空青
 青瑤五錢
 槐子
 白附子炮
 木香西
 牛膝二
 鵝脂四
 旱蓮草五
 汁一升
 丹

右蒸經末先以早蓮葉汁牛酥煎脂入銀器或銅器銀中熬至三五沸再下諸藥末煎

一半即傳入磁器內盛之照卦用舊鐵釘二斤重二三兩雜集於頂上厚二三十通令入製其中次脯匙貫

天竺第...

實爲新種

雲霧移睛。瘵虛者。眼自視目外。有物舒張。或如蠅蛇飛伏。或如旗旆飄揚。有如粉黛。有帶青黃。皆屬腎肝內障。難當。具藥耗損。精汁有傷。自宜謹慎。思慮預防。

此症謂人自見目外。有如蛇蛇。其物色或青黑粉白。微黃者。在於眼外。空中飛揚。或亂仰視則上。俯視則下也。乃玄府有傷。絡間精液耗過。營清純之氣。而為內障之患。其源皆屬肝腎有病。白者。因火肺金。清純之氣不足。黃者。脾胃清純之氣。有傷蓋腫神。乃先天之元陽所生。稟賦五臟之精華。因其內損。故有此狀。虛弱不足之人。及經產去血太多。或悲泣太過。深思積念之婦女。每有此病。小兒疳疔。及病後。及瘵傷寒。久致目痛。火閉。無傷清純之氣。亦有此患。幼而無知。至長始曉。氣絡已定。治亦不愈。宜服清散。治實弱不能清。肝則生虛熱。生肝。傍肝木枯。體氣不足。故行動舉止。則瞳內神水滿。木枯。木運。治有實弱。如神。清散。如神。先服此散。清其肝腎之邪。大服此散。仁九。黑花。白清。安。木。諸。木。運。扁。蒼。木。水。黑。狗。骨。火。黃。滑。石。過。瓶。仁。一。車。前。子。五。錢。右。為。細。末。每。服。三。錢。空。心。青。散。

湯頭下

蕤仁丸 治眼見花黑。地膚子 白茯苓 細辛 人參 石決明 地骨皮 白木 各五錢。另研。熟地黃 楮實子 空青 防風 青羊膽 鯉魚腦 右為細末。研勻。以鹽汁同蜜煉。

搜和為丸。如桐子大。每服二三錢。食後米飲送下。

摩頂膏 治眼見花黃。白附子 地膚子 龍腦 青藍 一兩 明珠砂 二錢 牛酥 二兩 鵝脂 兩 右將前藥末。

同酥脂。以慢火熬成膏。每用少許。不拘時。頂上摩之。

羚羊鬼活湯 治肝腎虛。黃芪 一兩 桑白皮 羊角 木羌活 黃芩 山萸肉 車前子 附子 各五錢。或作。黃芪 一兩 桑白皮 羊角 木羌活 黃芩 山萸肉 車前子 附子 各五錢。或作。

參 奇箱子 決明子 澤瀉 秦朮 去 柴胡 一兩 右為末。每服五錢。水二鐘。煎至八分。去滓。不拘時。

溫服。

治眼花見物法 有患心。見物皆如獅子形。伊川教之。若見其形。即以手向前捕之。見其無物。久久。症病。

去遂。

之所生也故神方則魂魄意志是故強子黑睛法於陰白睛法於陽也故陰陽令精而神明也
目者心之使也心者神之舍也故神精氣內不精幸然見非實也精神恍惚不精故曰夜也帶子
疑其然子每之東木曾不或去之則後子唯精是求也勞神乎何其異也吐伯曰不然也心有所喜神
有所悲喜然相成則精氣氣弱則神弱乃使是故開者入其甚者為成心者問云精明者所以視萬
物則黑白皆長極以長極以白法黑顯則精氣
神光暗則精氣而耗定矣宜分虛實治之可也

神光自現症

神光人自見起初如閃電陰精消純陽陽光欲飛愛惟見一片茫何用望長怨

此症謂目外自見神光出現每如電光閃掣甚則如火燄霞明蓋時發時止與瞻視有色之定者不同乃陰

精虧損情氣沸幹玄府太傷故陽飛越而光欲散內光之重者非比營星疾火之輕也宜服

補水寧神湯

補腎水則火不妄動 生地 各二 白芍藥 當歸 麥門冬 各一 茯神 各一 五味子 三十 甘
草 六分 右剉剉白水二鐘煎至八分去滓空心溫服

腎水虧虛真陰不足故用熟地黃乃天一生水之劑大補真陰生地黃有滋陰退熱之效麥門冬有清心降

火之功補血滋陰須熟地黃白芍神光蕩漾真夜不安此神思間無形之火妄動故也必用茯神與五味子

養精安神定志能飲元精之氣不走散生甘草降神中之火八味共建厥功庶幾腎水上升心火下降而神

自寧光亦可定矣

黑夜睛明症

黑暗之間倏忽見物其道精華禍患將出此陽光欲墜之機而水火背違之疾若不關心定應有失

按此症人體天地之陰陽晝明夜晦理之自然今黑暗間開目倏忽有見者此背於陰陽也必水火不交精

華閣格乖亂不和之甚而陽光飛越神膏不能攝養陰虛而陽光無制矣反曰精華聚盛而不為慮往往罹

害道誤非小也宜服