

東醫寶鑑

十七

東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

○諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

半死小腸三日死腸兩頭見者可連續之先以鍼縷如法連續之斷腸便取鷄冠血塗其際勿令氣

泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍稍飲之二十餘日乃喫糜粥

百日後乃可進飯病○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不

得多飲粥則血溢殺人也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發

甚者即死○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心即死

不治證

難十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二七

醫全斷不可治。○小腹下傷內者。○證候繁多者。○脉不實重者。○老人左股壓碎者。○傷破陰子者。○血出盡者。○肩內耳後傷透於內者。皆不必用藥。○凡金瘡傷天窓欲眉角腦後臂裏跳脉髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六府俞皆死處。又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸聲口急唾出兩手妄舉皆不治。聖手

金瘡脉候

金瘡出血太多其脉虛細者生數實者死。○金瘡出血

不止脉來大者七日死。滑細者生。○金瘡出血虛細則宜實大則傾。○傷雖淺命脉虛促可慮。傷至重命脉和緩永無慮也。○血出甚者脉不要洪大只要平正重實。○

腸肚傷治法

可治。○腸出在外若腸全斷難醫不斷者

白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之。腸子則以清油熬活放入肚內乃縫。肚皮不可縫外重皮留皮開用藥糝待生肉。○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散。○脚湯與服

用手擘去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澁

金瘡先宜調血

大凡金瘡及折傷墜內損者必有瘀血停積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血為主

散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可用

止血生肌合瘡藥

在傷處以帛扎定血立止

血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單血竭末付之尤妙

荷葉貼之一日一次以藥水湯洗

下子蚕蛾燒灰付之聖

勢火煨為末酒調服昔有一人自割其勢瘡久不

箭鏃及金刃中骨脉不出

白欬半夏等分為末每取一錢淡薑湯調服日三至

二十日自出

水塗其上又蠅蛆取汁頻塗又鼠腦塗之又好磁

石着其上
自出聖

救急方

金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納

未醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿
體氣貫膏膈悶絕者亦甦門○傷重暈絕不省人
熱尿多灌即甦
童尿尤好

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芩當歸川芎白芷
續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各

等分右為末每三錢溫
酒調服日三立驗

花藥石散

治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬咬踢
或至死者急於傷處糝藥其血化為黃水

再服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶
欲死服此藥則化為黃水或吐或下泄出花藥

石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾
安四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取

出研細每取一大匙童
尿入酒煎熱調服

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀

錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再服一服以下惡血為度

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕大黃

作一貼酒煎雞鳴時服次三日下瘀血即愈治折傷亦妙

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅滯欲死大黃

熱酒調下

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡另研三錢柴胡連翹

當歸梢各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作一貼酒

水相半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲少研水薑根甘草各

一錢桃仁十箇為泥紅花五分
右剉作一貼酒水相半煎服

金傷散

採草一切金瘡重午日早朝使四人各出四方

同搗極爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實藥以桑
皮蔕之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填
固至九月九日午時取出陰乾百
日搗羅為末如遇傷糝之神效

單方

凡二十種

新汲水

人金瘡及損傷腸出入以新汲
泉水噴之令身禁腸自入也

石灰

療金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末覆之
止痛止血神效○又石灰和雞子白火煅為末付

瘡立
差

葛根

療金瘡止痛為末付之
又濃煎取汁服之

桑白皮

安金瘡可以縫金瘡取生皮作線縫破腸出者唐
載割腹用此法便愈○神仙方箭藥妙

不可言藥為末乾糝之佳

金瘡止痛藥柴灰付之佳
蜈蚣 箭鏃在咽喉胃膈不出 蜈蚣 搗取汁滴上三五

出并鐵自

蟻 傷處待極痒便撼動拔之立出 後以生肌膏貼

之。出箭鏃方蟻 蟻 全者麝香少許

旋 葛 根 即 搗 汁 滴 瘡 中 滓 封 瘡 上 妙 幹 取

象牙 主 箭鏃 及 鐵 入 肉 不 出 為 末 和

蝙蝠 主 金 瘡 出 血 內 漏 取 二 枚 燒 為 末 每 一 錢 和

黑 虱 主 箭 頭 入 肉 不 出 取 頭 上 黑 虱

葱 治 金 瘡 因 驚 出 血 不 止 取 葱 莖 葉 煨 取 汁 付 之 愈

蘇

小麥

主腸出，不入，小麥五升，水九升，煮取四升，去滓，令極冷，使人含，巽瘡上，又巽其背，腸漸自入，勿

見令衆人

石榴花

治金瘡，血流不止，石榴花和石灰搗為末，糝之，血便斷，乾。

壁錢汁

主金瘡，血不止，取汁點瘡上，良，乾。

鼠腦肝

治箭鏃及鐵刀在咽喉，脊膈諸隱處，不出，取生鼠腦及肝搗付之，即出，乾。

紫檀香

治金瘡，急刮紫檀末付之，止痛，至妙，乾。

血竭

療金瘡，止血，生肌，最妙，刮屑付之，但性急，不可多用，乾。

琥珀

止血，生肌，合金瘡，作末付之，中弩箭，悶絕，琥珀末一錢，童尿調服，妙，乾。

蛇含草

主金瘡，搗付之，佳，蛇含膏連已斷之，指，乾，又云。

青蒿 止痛生肌 長沙止血

熟艾 或搗金瘡 湯或熏烟 亦好 易合

小蘗 主金瘡 血不止

藍葉汁 金瘡 血不止

車脂 鐵入肉 不出 取車軋脂 攤紙上

擗撲墮落壓倒傷 凡墮壓死者 急安好處 以袖掩其口

之若初覺氣絕 急擎開口 以熱小 便灌之 利去痰

人如僧打坐 令一人將其頭髮 控放低 以半夏末

或皂角末 吹入鼻內 如活 却以薑汁 香油打勻 灌之

筋骨皮肉 皆出血 不止 或跌撲傷 損須用蘇木 老

古今圖書集成醫部全錄

五

血黃連降火白朮和中以童便煎服妙傷在上宜
飲韭汁。凡打壓傷或從高墮落皆驚動四

肢五藏必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥
和童便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻

心之患矣。凡傷損專主血論肝主血不問何
經所傷惡血必歸於肝流於脇鬱於腹而作脹痛

實者下之宜通導散桃仁承氣湯散寒調之奪命散
上虛者復元活血湯。凡

出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯
調蚌霜散服之。又

香散雙烏散尋痛元陣王丹補損當歸散。諸
合香元治打撲墮落挾驚悸氣血錯亂昏迷不省

急取三五丸溫酒童便調灌即甦。方觀氣門
上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風

慎之

通導散治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此
下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃

仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右
剉作一貼水煎空心服。一名大成人成湯。林

當歸鬚散

治打撲損傷致氣凝血結育腹脇痛當歸尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一

錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右剉作一貼酒水相半煎服

蚌霜散

治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服

乳香定痛散

治諸傷損疼痛白芷當歸生甘草牡丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等

分右為末每二錢溫酒童便各半調勻服之

乳香散

治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香沒藥甘草各等分右為末每二錢

溫酒調下

雙烏散

治諸傷百損久後時常疼痛者及新被傷作痛亦宜川烏草烏略炮各三錢當歸白芍藥

蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但草

烏生用恐太猛所以畧炮

尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火熨沒藥火熨五靈脂各三錢生麝香

少許右為末酒糊丸如指頭大朱砂為衣每一丸薄荷湯薑汁磨化服

陣王丹

治諸折傷止血定痛大黃一兩石炭六兩右同炒紫色為度去火毒為末敷傷處妙

門八

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛呼號服此藥不復大痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心川

椒當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右為末每二錢溫酒調服效如神

打撲傷消腫滅癰

九關毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯

汗外用杏仁搗爛入白麴少許新汲水調付瘡上腫即消○治傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼

上青黑不○散大黃為末生薑汁調付患處即消名將軍膏○散被毆癰痕亦治跌撲麻油清酒各

一枕同煎數沸服之服了家陰令燒熱地上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令燒熱地上一夜痛

次日驗審了無一毫傷痕。打撲傷凡膚青腫
茄子種通黃極大者切作片瓦上焙乾為末臨卧
酒調二錢服一
夜消盡無痕。

脉候及不治證

凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者生
小弱者死。打撲傷損去血過多脉

當虛細若得急疾大數者死。凡折傷外損筋
骨者可治內損藏府裏膜及破陰子耳後者並不

治。致命處一觀其脉虛促危矣。如傷藏府

單方

凡十種

蒲黃

治撲損瘀血在內煩悶蒲
黃末三錢熱酒調下。

白楊樹皮

治撲損瘀血痛不可忍
取對皮酒漬服之。

生龜

治撲損厚塗傷處立效。飲之

蟾蜍

主打撲跌折血在脇下堅滿痛
取汁和酒服又研付傷處。

鼠屎 治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末猪脂調急裏之不可過半日愈

荷葉 治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末童便調服

利下惡

胡桃 壓撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便差

麻根 主打撲落傷或煮服之非時則取乾麻煮汁飲

稻稈灰 治墮落撲損痛楚洗痛處立差

芥子 撲損瘀血作痛芥子和生薑研微煖塗貼患處即效

葱白 治打撲傷損痛不可忍取葱白入塘火煨乘熱擘開其中

痛定之痛立止且無癰痕

人尿 主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即甦

烏雞

摧折氣悶欲死烏雞一集合毛杵一千下和苦

酒一升得所以新不搗病處取藥塗布上雞神效

烏鴉羽

治墮落損傷瘀血脹心面青氣短尿

犬膽

治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服瘀血

亦奇效

酒糟

主打撲墮落損傷瘀血腫痛

水蛭

主墮撲落傷折傷內有瘀血調服當下瘀血

骨折筋斷傷

凡脚手各有六出白四折骨每手有三處

互相鎖或出白則是挫出鎖骨之內若出內則須

入外方入窠臼只用手拽斷難入窠十有八九成

法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用

手法整頓。○搗骨歸窠用竹一片。○凡骨碎者須用麻藥歸

則愈後曲直一得。○凡骨碎者須用麻藥歸

與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不傷破

肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍且以藥水

一日一洗莫令臭穢。○凡骨碎者用接骨藥火

上化開糊骨上然後夾定。○凡骨碎者用接骨藥火

骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散。○洗藥降聖丹接

骨散自然銅散接骨紫金丹。○淋洗用蔓荊散。○

草烏散

即麻藥也。凡骨節出白用此麻之然後用手

歸川芎川烏各一兩二錢半草烏苗香坐挈草各

二錢半木香一錢並無瑕製右為末諸骨節出

白窠者每服二錢好紅酒調下。○麻倒不識痛處然

後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸原

用夾夾定然後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥

麻後或鉗出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與