

小便出血

陰腫

陰痒

陰挺下脫

陰瘡

交接輒血出痛

胎前惡阻痰逆

胎動不安

胎漏下血

胎氣上逼

妊娠心腹痛

妊娠腰背痛

妊娠小腹痛

妊娠心腹脹滿

妊娠數墮胎

胎不長

墮胎血下不止

未足月欲產

過期不產

妊娠欬嗽

妊娠吐血衄血

丁頰

胎前產後

本草綱目

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

婦人經水

本草綱目

赤水玄珠婦人門第二十二卷目錄

妊娠煩躁口乾

風癰子癰

妊娠瘕瘕

妊娠鬼胎

妊娠不語

傷寒熱病防損胎

妊娠傷寒

妊娠時氣

過時熱病

熱病胎死腹中

妊娠瘡疾

妊娠泄瀉

下痢黃水

大小便不通

小便不通
難胎

子淋

妊娠遺尿

妊娠尿血

胎水腫滿

腹內鍾鳴

孕癰

臍躁悲傷

滑胎方治

十產論

產難方論

交骨不開產門不開

下死胎方

產難生死脉訣

胞衣不出

產後血暈

產後顛狂

狂言譫語

產後不語

赤水玄珠婦人門第二十一卷

新安生生子孫一奎著輯

小便出血

良方曰心主於血通行經絡循環臟腑得寒則凝澀得熱則妄行失其常道則溢滲於脬則小便出血也

薛氏曰前症肝經血熱者加味逍遙散怒氣血傷者同治調送血餘灰妙若肝經風熱用前散送子芩丸氣血俱虛者八珍散送血餘灰膏梁積熱者清胃散加槐花甘草風熱傷胃者四君子加防風枳殼胃虛不能攝血者補中益氣鬱結傷脾不能捫血者濟生歸脾湯

一婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰加芩連

之類又飲食少思虛症蜂起肝脈弦而數脾脈弦而緩
此因肝經風熱為沉陰之劑脾傷不能統血發生諸臟
而然也用補中益氣六味地黃丸而痊

蒲黃鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往來口乾

作渴

蒲黃

炒

鹿茸

炙

當歸

生地

葵子

炒

續斷

酒炒各等分

為末每服二錢酒調日三服

髮灰散

起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急痛小

便不通又治肺疽心衄內崩吐血舌上出血俱妙

本草

云能療瘀血通關膈利水道破癥瘕癰腫狐疝
刺痛疰雜瘡療脬轉通大小便止咳嗽鼻衄

右每服二錢米醋湯調下

生地黃散 血熱尿血

生地 二錢 黃芩 炒五錢

阿膠 炒

側柏葉 炒各一錢

右水煎食前服

當歸散 血分熱尿血

川歸 羚羊角屑 赤芍 各五分

刺薊葉 一錢 生地 一錢

右水煎服

又方 治血分有熱 生地黃搗汁 每用一小盞 日三服

又方 治血分熱 尿血 用炒蒲黃末 每以二錢 溫酒下

鹿角膠散 鹿角膠炒為末 二兩 作二服 長流水調妙

陰腫

良方曰 陰腫 因胞絡素虛 風邪客之 乘于陰部 血氣相搏

故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治

又云一婦陰中腫悶小便澁滯兩脇作腫內熱晡熱月經不調時或寒熱此因肝經鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肺血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散 治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲

當歸

炒各一兩

秦艽

二兩

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散

治陰腫堅痛

白礬

錢五

甘草

分五

大黃

兩一

右爲末水調如粳大綿裹內陰中一日兩換以愈爲

度

陰痒

良方曰陰痒爲三虫在腸胃之間因臟虛而蝕經則陰中
痒甚則陰中痛也

生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎湯服之
而愈子曾治一宦婦年廿一疹出未彌月而犯房事熱
因下陷陰中痒甚每一發神魂颺然兩手抓壁口中咬
物鮮血淋漓尻脫肉破而不遑顧七日肌肉如削諸洗

插方歷試無功作虫治尤劇欲懸梁求死予爲籌之乃
虛熱陷入至陰當從陰引陽以黃芪六錢甘草二錢防
風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此引金伐
木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆瀉肝湯逍遙散以主
其內外以桃仁研膏和雄黃末或鷄肝內陰中以制其
虫

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中悶痒
小便赤澁此鬱怒傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈
復因怒患處并小腹脹痛用小柴胡加芎歸山梔芍藥
痛止用山梔入逍遙散而痊又因勞役患處腫脹小便

仍瀝用補中益氣加山梔茯苓丹皮而廖

一方 新苑葉烏綿裏內陰中一日三易

大黃散 治陰痒

大黃微炒

黃芩

黃芪炙各五兩

赤芍

玄參

蛇床子 山茱萸

爲末酒調服二錢

又方 杏仁燒灰乘熱綿裏納陰中曰二易之

又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃葱水洗

二三次杏仁燒灰油調塗加麝香尤妙

又方 鯽魚胆際之妙

陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或因絕絡傷損或因子臟虛冷或

因分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣爲主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便澀滯龍胆瀉肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結益肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜朮末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調

理而愈後因勞役或怒氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈

一方 治陰挺下脫

當歸

黃芩

各二兩 牡蠣二兩半

蝟皮

一兩 炙

赤芍

兩半

右爲末每以二錢食前溫酒

調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進用前方

治其內仍以

大黃

山茱萸

石羔

牡蠣

乳香

爲細末水調揣熟捏作条子如中指大陰乾插

入玉戶其痛即止

陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其外症陰

中突出如蛇如菌如鷄冠或生重溫瘁或潰爛出水或
腫悶墜痛其內症體倦內熱經候不調或飲食無味晡
熱發熱或胸脇不利小便痞脹或赤白帶下小水淋瀝
其治法腫痛者四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者歸
脾湯加柴胡山梔丹皮淋瀝者龍胆瀉肝湯加白朮丹
皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中益氣湯
加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤瀉怒而益甚或發熱或寒熱
此肝經濕熱所致用芎歸炒梔柴胡苓朮丹皮澤瀉炒
芍車前炒連甘草數劑漸愈乃去黃連澤瀉又數劑全
愈

一婦臍腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬尿瘡他處並無
熱痒而痛大小便瀉出黃汁食減身面微腫衆作惡瘡
治反劇愈痛急令洗去乃用馬齒莧四兩青黛一兩同
搗爛敷瘡上卽時痒止痛定而熱亦退仍服八政散日
三服分散客熱每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新
濕藥又安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自
此二十日全安 緣此婦嗜酒貪啗魚蟹發風之物而
中下焦蓄風熱之毒氣當作腸癰內痔等疾后當禁酒
及發毒之物

一方 治玉戶生瘡 杏仁燒存性 雄黃 明凡各五錢

麝香一錢二分 右爲末敷之

又方 飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輒血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方 療交接血出 伏龍肝 桂心

等分

爲末每服一錢酒調下

胎前惡阻及痰逆不食

惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩好食醃酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水不能支持古謂之子病由胃氣怯弱中脘

停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少思胎氣不安爲必用之藥須倍加白朮然半夏白朮陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒須用參蘇飲

生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前人亦有用濟生竹茹湯者予歷歷見爲火症者多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿藥待之俟胃氣和當自瘳矣

茯苓半夏湯 妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止