

孫真人著

婦女

經水不通 石榴根一把要向東者靈乾水二碗濃煎一
碗空心熱服二次 或薏苡根一兩前服

或白芥子末一錢黃酒冲食前熱服數次

又鼠糞燒灰黃酒下一錢 又方多服飴

糖並可治乾血癆 或蕎麵大胭脂煅爲丸每服

錢三或韭菜汁入童便炖服不宜多服

經閉驗胎有無法 川芎一二錢陳艾三四分
空心煎服一題有胎則腹內微動
無胎則不動

乾血氣痛 絲瓜一根燒存性末空心溫酒調
服

經從口鼻逆行 荚菜汁一入童便半盞燙熱服
或好墨磨濃汁一盞飲

經行不止 紅鷄冠花晒乾末水煎酒引每服
二錢忌葷腥三日 或陳蓮蓬壳燒存性
末開水每調服二

婦人血黃：黃茄子竹刀切片陰乾爲末每二錢黃酒溫服

婦人血崩

蓼薺

一個燒存性研末酒調服

或老母猪屎晒乾酒服三錢

或舊蒲席

燒灰酒服三錢

或棉花子

炒一兩

柏葉三錢

共末每服三錢

又諸藥不效者

杏仁

黃連

燒存性研末

每三錢空心酒燉服

或扁豆花焙乾末每空心服一錢炒米煮湯入

鹽少許調下 或破羅底一個

燒灰

一順手

桿末

來回不可

開黃酒冲服

或陳粽燒存性

爲末空心淡酒冲服三錢

或鍋底煤三

錢熱酒冲服

或陳蓮蓬壳燒灰存性研

末

五棉花子燒存性末

三錢米酒冲服

又

蓋墻頭之舊缸片搗碎如豆大砂鍋內炒

熱加醋淬入取醋飲之

經血俱崩

黑驢屎燒存性末麵丸桐子大每

崩中漏下青黃赤白者俱難生育好墨一錢水服日二次
白淫糯米半升花椒兩共末醋糊丸桐子大
每四十九食前醋湯調服

白帶千年石灰五錢白茯苓兩共未麵糊丸桐子大每服一錢米湯或開水下

又方孕婦亦可用馬齒莧汁三鐘鷄子清二個
調溫酒服

赤白帶下舊玷燒灰白帶用白色赤帶用赤色日二錢黃

酒溫服 或扁豆爲末米飲下

交媾非時血出不由 雄鷄血塗之 或青白

布同髮煅灰用棉花拌灰塞入陰戶俟止

去之

陰吹

陰中出氣有聲

猪油

四兩

亂髮

一升

麻

五分

柴胡

錢半煎

服

陰毛蟲痒

白果打碎擦之

陰中生虱

板榔嚼汁擦並以少許煎水洗

陰中癩痒

桃葉鳥飼帛裹內入陰中一日換三

陰腫 菊花搗煎水薰洗

陰腫生瘡 柏杞根煎水多洗

陰挺陰中突出一物如蛇形
或如菌或如鷄冠狀 猪油調藜蘆末敷

內或白果嚼敷 或芝麻嚼敷

陰茹陰中生物如茄亦名陰茹 茄樹根燒灰爲末香油搽

或烏頭燒枯 研末醋煎薰洗 或水仙花燒加

紅糖搗極爛敷治陰挺尤效如神 或大蒜煎水多

洗 或槐白皮煎洗

並治年者
崩腫

奇效良方 卷三

四十一

翻花陰戶大甲魚

一個重一斤者

去腸雜連頭整個水

煮極爛將汁用舊綢蘸滴患處使其滲入

將骨連頭頸煅灰研末夜間拭淨摻之將

內作羹食之三日即痊

內外吹乳

舊蔡扇俗呼芭蕉扇

去筋燒灰

風爐多年者

尤妙熱黃酒沖服

年久無子

二月丁亥日收杏花桃花

須陰乾

爲末另擇戊子日和井水煎服一茶匙日

三服三日後必孕

扭斷長紅棗二斤秤準後去核用好燒酒數
約寸

斤拌過放砂鍋內隔水燉半日俟冰涼後
再以好燒酒二十斤泡二十日取出隨量
飲其病若失而孕

孕婦無故心虛驚恐悲泣並治

臟燥

凡婦人平時悲傷好哭自己不知其生甘
故顛狂罵人如有鬼神附之者是

生甘

草兩小麥升紅棗十個水六碗煮三碗分

三次服

婦人乳忽縮入急用兩手緊緊抓住取公鷄

一隻約重十兩開外連毛破開去腸雜如真麝香錢入

鷄肚內覆肚臍上愈

乳吹時時吹氣有聲硃筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等字於本婦所戴簪上本命所屬戴之字不寫戴之卽愈初起時用之最妙

久年赤白帶下

貫眾

一個去皮毛

好陳醋泡透漫

火燒熱爲末空心米湯下每二錢

五色帶下 年久古磚一塊燒極紅以油煎麵

并七個破壞再用黃瓜根仔灰脚

蟲出治三五次愈

化妬奇方 取本婦月經布包蝦蟆一個離茅
廁前一尺遠密埋之地上卽不妬

並治男子
女癆黃疸

治陰吹奇效方 猪板油

八兩

亂頭髮

如鷄蛋大
三團以肥

皂水洗淨同熬至變化分兩次服卽愈

婦女陰戶疼痛

此愛寒也

葱頭加乳香搗敷

或

熱炒鹽青布包熨之

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似癆病

芝麻嚼爛敷 或大蒜煎湯頻洗 或硫
黃末香油調搽

婦人血枯 白鵝血甜酒兌服 有血積宜飲

白鵝血

赤白帶下 鷄冠花爲末每二錢酒下白者用白
赤者用赤

或墨魚骨爲末服

乳內吹 路路通一介如俯鷄娘狀者煅存性加冰片少許黃

酒送

胎前心痛 鹽一撮燒紅酒服

胎前腹痛 大紅棗十四個燒焦末童便化服

胎前腰痛 大黑豆一碗酒三碗同煎每早空

心隨量飲

傷胎結血心腹痛 每日服童便二三杯

治胎咳嗽 川貝去心炒砂糖爲丸如芡實

大口中含化一丸

胎前瘡疾 夜明砂三錢空心茶和服或研末

空心黃酒燉溫調服亦可

胎前病疾中荷葉蒂個燒存性爲末黃酒沖服
胎前產後下痢敗龜板米醋靈末開水下數服
孕婦舌血不止雄鷄冠血滴之，

胎上中心蘿蔔煎湯飲或弓弦繫腰上

或葡萄一兩煎湯服

孕婦患淋冬葵子一升水三斗煮至二升分

數次服

並治生產
因悶及倒
生口噤

並治胎動

胎漏受胎後漏下黃黃芪仁需米一煎水服

孕中有癰 慧苡仁煮汁緩緩飲之

胎壓尿閉 令孕婦睡下將腿弔起卽通

妊娠傷寒

艾葉如鷄子大團一酒三升煮一升

炖服取汗

胎墜

未足月胎墜其狀似欲小產或見紅帶壳鷄蛋

三個如無野鷄蛋一可

苧麻根四兩同煮熱食蛋

孕婦腹痒

鐵箭頭袋舊用針線亦可

安臥席下勿令

婦知及他人知

並治產後
膿瘍

孕婦遍身癩痒 樟腦調酒擦

兒鳴腹中 黃連甘草各一錢 水煎服 或多年
空屋下鼠穴中土一塊口含之 或令孕
婦作男子拜狀 或以豆撒地令孕婦檢
之卽止

孕婦風寒不省人事

狀似

中風熟艾

兩

米醋炒極熱

以絹包熨臍下良久卽甦

胎動不安 絲瓜二根煎水服

如無用

藤亦可

或用