

眼科大全

民國三年仲夏
海陵書齋題

五

此症目赤痛而頭面浮腫及內燥赤也狀若大頭傷寒夏月多有此患有濕熱風熱濕熱多泪而皮爛風熱多服補而損寒若天治則血滯於內雖得腫消而目必有變病矣宜服普濟消毒飲

普濟消毒飲

此方治一切無名腫毒疔瘡癰疽發背乳岩流注瘰癧等症凡患此症者不論新久一服即愈此方乃天師傳授日不能開上喘咽惟以下之五上此藥然亦心黃連 黃芩 梔子 白芷 升麻 甘草 桔梗 板藍根 玄參

紫胡 桔梗 甘草 升麻 梔子 白芷 升麻 甘草 桔梗 板藍根 玄參 右為末半用沸湯調時時服之半用煉蜜為丸噙化之

右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱為君橘紅味苦平玄參紫胡苦寒解利積毒生甘草甘寒瀉火人參甘溫補氣為臣連翹梔子味辛平板藍根味苦寒清熱升麻味苦辛微寒行少陽陽明二經氣不得伸桔梗味苦辛溫為舟楫不令下行

或加防風蘇薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水二鍾煎至一鍾去滓溫熱食後時時服之如大便硬加酒製大黃一錢或二錢以利之腫勢甚重絕刻之候接時行疫疾雖由熱毒傳染其氣實之人下之可愈氣虛者概下之鮮不危殆故東垣先生製為此方以救氣虛者其意深矣

佳痛解毒丸 明砂 沒藥 川芎 荆芥穗 朴硝 白芷 石膏 家菊花 一席香 右為末木糊為丸如桐子大每服錢半不拘時溫湯下

怕熱羞明症

怕熱羞明症實虛兩境施目及赤赤腫能滑氣行是火熾東脾燥心肝脾肺之但分邪實治病亦不難驅不疼不赤腫軍為四家虛

此症謂目於明亮之處而痛淚淚不能開也凡病目者十之七八實有此患病源在心肝脾三經總而言

之不通一火燥血熱病在陽分是以見明亮而惡泪濕痛也蓋已之精光既竭則陽光不能散矣是以陰黑之所則清矣。若有虛實之辨。蓋有熱乃有餘之病。虛明乃不足之症。若目不赤痛而畏明者乃血分不足。膽汁少而絡弱故不能運精華以散陽光也。且服明目細辛湯。

明目細辛湯 兩目發赤微痛蓋明畏日怯風寒畏火眼淚成粒 川芎 桑本 當歸身 白茯苓 各五

紅花 細辛 各二生地黃 黃芩 荆子 防風 羌活 荆芥 穗 各一 川花椒 杜麻黃 桃仁 各法 破 右

到劑水二鐘煎至八分去滓臨睡溫服 按此足太陽經 按此足少陰經也

歸身湯 一名連翹散子治目中赤火惡目與 連翹 紅花 當歸 人參 甘草 蔓荊子 生地 各五

升麻 黃芩 酒黃芩 防風 羌活 各七 柴胡 二 右到劑白水二鐘煎至八分食遠溫服 按此足三陽少

吹雲膏 治視力傳因無力極難開明性覺多眵目十淚下及迎風流淚 防風 青皮 連翹 各四 生地黃

五 細辛 各一 紫胡 各一 當歸 各一 黃連 各一 杜麻 各一 升麻 各一 荆芥 穗 各一 右到劑除連翹外用淨

水二碗先煎諸藥去半碗連翹煎至一大碗去滓入銀湯內文武火熬至滴入水成珠加熟蜜少許熬勻

點之 按此足三陽少

沐明蓋陰丸 規二

臉硬睛癢症

臉熱睛癢似擦沙血瘀脾腹隱肝下睛赤頭痛臉堅硬泪濕昏蒙在堂他

此症不論有障無障但兩臉堅硬而睛癢者尤急乃風熱在肝肝虛血少不能濡潤於目無水以滋

火反乘虛而入會成燥濕或頭如縛血滯於膜白睛因火熱而痛輕則臉生椒皮重則腫脹如梧葉四

暗等症治法數藥翻轉開道若堅硬不能翻或頭痛腦脹不退此頭風故成毒之症也宜服二木散

二木散

治前頭暗

蜈蚣

足去頭

龍胆草

酒洗

黃連

酒洗

枸杞子

酒洗

白朮

酒洗

地骨皮

酒洗

白朮

酒洗

牡丹皮

酒洗

各等

右為細末

每服一錢

食後

煎茶湯調下

煖腫膏

膩粉

黃蠟

代諸石

各五

細余末

黃柏

麻油

各一

右為末

極細入銅鈎內

油煎同煎膏

堂製於硬腫處

寒熱

凡患寒熱者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

寒熱

凡患寒熱者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

赤痢如邪症

凡患赤痢者由風邪外客於其理

故內者於微時

血氣不足

陰陽更替

而所作也

時則發時

則止

此在真陰真陽

相制而發

寒不

能

收

攝

舒

不

不

不

不

不

不

不

玄明粉

病如針刺屬心經火燄珠灰熾甚行戒酒已年休躁怒色數掃新列生流火輕微惟一點熱然有處似蟻行
防微杜漸宜君火泄破炎熾自自明

此症謂目睛必如鍼刺也。病在心經火實有餘之症。若肺熱然一二處如鍼刺痛。目雖不赤。亦是心經流火別具。病在何處部分。以見病將犯其經矣。按此症多有體虛目勞。兼染熱濁之病。榮氣不上湖於目。而如鍼刺之刺者。宜從其榮。若降火則急矣。宜服加減八正散。

也而

一燈燈心

經曰膀胱不利為癃理宜入正散以通之滑可治澀滑石車前子滑也瀉可去實大黃甘草梔子皆瀉也通

可去積聚通經氣不通也若虛弱革則大黃不宜用也加生地黄桑白皮苦竹葉以清療之

頭痛 是也。頭上痛者，足太陽經也。如病久不止，則令人喪目。以三陽受邪皆然。腰痛者，足少陰經也。如病久不止，則令人口乾。手足心熱者，足太陰經也。攢竹通谷，呼為小洪骨。腰脊痛者，足厥陰經也。如病久不止，則令人癱瘓。

之致然也先以茶餅散吐之時於厚川芎湯
荷亭涼清上之藥叔和云寸脈急而頭痛是也

大小雷頭風症

雷頭風。來之。痛。急。症。類。傷。寒。頭。如。斧。劈。目。甚。鎖。身。猶。火。炎。大。便。不。通。小。便。赤。澀。痛。不。可。禁。獨。亦。難。測。最。難。已。甚。應。知。暴。出。有。意。速。料。勿。延。時。刻。瀉。火。為。先。用。防。胃。液。通。損。清。純。終。當。一。失。

此症不論偏正。但頭頭痛。挾痰而來。痛之極而不可忍。身熱目痛。便閉結者。曰大雷頭風。若頭痛大便先潤。後燥。小便先清後澀。曰小雷頭風。大者害遠。小者稍遲。雖有大小之說。而治則一。若失之機。禍變不測。目必損。眼則微凸。重則結毒。且草為之救。以免禍成。其服清震湯。

清震湯

東治發熱惡寒口渴頭痛

升麻

赤芍藥

甘草

制朴穗

葛根

蘇薄荷

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

加味調中益氣湯

治血虛氣弱

黃芩

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

蔓荊子

黃芩

蒼朮

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

將軍定痛丸

治諸痛症

黃芩

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

大黃

治諸痛症

黃芩

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

藥枕方

治諸痛症

黃芩

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

芍藥

治諸痛症

黃芩

升麻

細辛

廣皮

廣木

杏仁

甘草

黃芩

青荷葉

蒼朮

木甘水

沒一宿

今覺藥透氣入頭

不枕即蓋之

使藥氣不散

枕之日久漸低

再入前藥

仍要滿實

漆黑豆

三五日後

藥氣微

則換之

枕旬日

或一月

耳中雷鳴

是藥祛風之驗也

左右偏頭風症

左右偏頭風。發則各不同。左發則左壞。右發右則壞。人多不為慮。致使失光明。

此症左邊頭痛。右不痛者。曰左邊風。右邊頭痛。左不痛者。曰右偏風。世人往往不以為慮。久則左發損左目。

右發損右目。有損左反攻右。右損反攻左。而兩目俱損者。若外有赤痛泪澀等病。則外症生。若內有昏眊眩

暈等症。則內症生。凡頭風痛左害左。右害右。此當病易知者。若左攻右。右攻左。痛從內起。止於腦。則攻害

也。痛從腦起，止於內則攻害也。連若痛從中間，發及肩後角，左工星中發者，兩目俱壞，亦各因其人之弱，犯感受，左右偏微起，連不同，連連輕重不等，氣之害人尤慘，宜識其治法，其法。

羌活湯治太陽經頭痛 杏仁去皮 羌活去根 川羌活去根 防風去根 白茯苓去根 甘草去根 白芷去根 麻黃去根

半夏去根 廣陳皮去根 桂枝去根 右剉剉，白水煎服，內熱加酒製黃芩，海狗葉，生薑三斤煎服。

柴胡湯治少陽經頭痛 川芎去根 白茯苓去根 柴胡去根 蘇薄荷去根 細辛去根 製半夏去根 黃芩去根 炙甘草去根 陳皮去根 薑

制子去根 右剉剉，生薑三片，白水二鍾，煎至八分，食後服。

蒼朮湯治太陰經頭痛 蒼朮去根 白芍藥去根 枳殼去根 白茯苓去根 白芷去根 廣陳皮去根 川芎去根 炙半夏去根 升麻去根

炙甘草去根 右剉剉，生薑三片，白水二鍾，煎至八分，食後服。

細辛湯治少陰經頭痛 細辛去根 廣陳皮去根 川芎去根 製半夏去根 獨活去根 白茯苓去根 白芷去根 炙甘草去根 各等分

右剉剉，生薑三片，白水二鍾，煎至八分，食後服。

吳茱萸湯治厥陰經頭痛 吳茱萸去根 川芎去根 炙甘草去根 人參去根 白茯苓去根 白芷去根 廣陳皮去根 各等分

右剉剉，生薑三片，白水二鍾，煎至八分，食後服。

眉骨痛治眉骨痛 有眼目痛，肝有肝虛，而痛，眼見光明，則眉骨痛，宜服生地黃丸，有眉骨痛，目不能開，則

愈。生風是也。大抵肝火有風，則風而治之。

陰邪風症

陰邪頭痛，多而熱時來，元虛成內障，火管外生災。此症專言額角板痛，及眉骨骨之病也。發則在陽明，少

陽用事之時，元虛稍弱者，則為內症。若火火疫者，則為外症。宜服加味柴胡湯。

加味柴胡湯 柴胡 酒芍 制芥穗 製半夏 甘草 川芎 香白芷 蘇薄荷 防風 前胡 各等分

右剉生薑三片。白水二鍾煎至八分食後服。

生熟地黃湯 治目不光明。眉骨痛甚。此係肝虛。法當養血。涼血。益血。而風熱除。

殺地骨皮 天門冬 人參 柴胡 川黃連 右剉。白水二鍾煎至八分。食後服。

上清散 治因風頭痛。眉骨痛。乳香。沒藥。各一錢。腦子。五分。赤芍藥。川芎。薄荷。芒硝。荆芥穗。麝香。各五分。右為細末。每用一字。口噙水。鼻內搐之。甚效。

驅風上清散 治風熱上攻。酒黃。各一。白芷。根。羌活。防風。紫胡。續斷。一川芎。一。桃。荆芥。甘草。五。右為細末。每服四錢。白水二鍾煎至八分。食後服。

陽和風病 枕痛是陽和寒時病。最苦。年來不愈。致使眼生花。

此症專言腦後枕骨痛之病也。多發於太陰用事之月。發則有虛聲耳鳴之患矣。久而不治。內障成耳。宜服防風羌活湯。

防風羌活湯 治肩臂痛。而風寒在表。防風。川羌活。半。夏。黃芩。酒。南星。北細辛。白朮。甘草。各一。右剉。白水二鍾煎至八分。去滓。服。

子扣搜風丸 治風熱上攻。眼赤。并。鼻。塞。頭。痛。眩。人參。茯苓。天南星。蘇。海。荷。各。五。黃。各。五。右。為。細。末。水。蜜。為。丸。和。桐。乾。生。薑。寒。水。石。蛤。粉。大。黃。生。白。礬。各。一。黑。牽。牛。滑。石。各。一。右。為。細。末。水。蜜。為。丸。和。桐。子。大。每。服。二。三。錢。重。其。體。之。虛。實。每。用。生。姜。湯。送。下。日。進。三。服。

磁石丸 治已上頭風。磁石。地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

磁石 地。龍。乾。姜。切。五。味。子。杜。丹。皮。玄。參。各。一。附。子。二。右。為。細。末。煉。蜜。為。丸。

目赤 戴氏云云赤眼有數種流毒赤者熱壅赤者有時眼赤者虛壅肝經所致蓋肝主血通於目赤血病也

聚與瀝暗症

無端蔡血。惟暗。喪目亡明。是禍端。變症風生。休小視。急將開導。用鍼砭。

此症為目病最毒。舉世無知。若人偏執已見。不用間砭者。其目必壞。初起不過紅赤。次後紫脹。及白睛腫起。甚脹形如虬筋。蓋其病血貫睛中。滯塞不通。在脾則煙脹如枯椒瘡之患。在珠則輪湧起。或脂黃膜。痕癢成窟。此皆白陷。鵝眼凝睛等症。夫治必有青黃膜出。癰凸之禍。凡見白珠亦紫。脾腫。虬筋紫脹。敷點不退。必有瘀滯在內。可翻胞內視之。若眼胞已發。泛浮椒瘡粟瘡者。皆用導之法。不然變症生矣。且服養珠散。

安珠散 治眼患血熱
睛色不散

槐花 生地黃 白芷 炒梔子 荊芥 龍膽草 黃芩酒炒 赤芍藥 甘草 當

歸尾子

右為末。每服三錢。白水二鍾。煎至八分。去滓。熱服。春加大黃瀉肝。夏加黃連瀉心。秋加桑白皮。

病婦

宣明丸
治眼內疾如膏點赤
腫痛火熱壅上

赤芍藥 當歸尾 黃連 大黃 生地黄 薄荷葉 黃芩 川芎 各等分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三錢食後米飲送下。

血氣虧損症

血骨腫痛最奇世之患者亦云稀神骨脫汗傷俱損急急等時亦是

此症謂視腫神不見黑空但見一點鮮紅甚則於濁病為甚危一二日尚可救蓋腎之真一有傷眼中精汁耗竭元陽正氣皆耗故此一點之神光不見而血之紅色來乘腎部十患九不治者今人但見瘀血滯拂便為血滯腫神不知血滯腫神乃清陽純和之氣已損其精華血多乘於腎部命亦不久豈若火入血分凝滯

有形之急者比乎宜服隆血明目飲

隆血明目飲

細辛

人參

各一

赤芍藥

五味子

十川

羌活

牛膝

酒洗

石決明

生地黃

山藥

知母

白茯苓

研去

當歸尾

防風

各八

右剉

白

水

二鍾

煎至

八分

去滓

溫服

厚朴石散

摩治

右妙

空青

龍腦

石膽

各八

右研

極細

粉

每日

早晨

夜後

點眼

落紅散

治血

虛神

穿山

甲

砂

各八

人退

三錢

煅精

草

蟬退

各八

右

各一

造吸筒

造吸筒

或用

好銅

打成

滿斗

相似

筒上

留一

竅

用猪

脂

薄皮

貼筒

上如

臨用

時以

筒口

安病

目上

點

吸氣

一口

次

有

其

氣

漸

漸

除

矣

色似

胭脂

症

白珠

火滯

血難

通

色似

胭脂

抹紅

清肺

制金

頻散

血

吳教

久滯

在輪

中

此症

白睛

不論

上下

左右

但見

一片

或一

點紅

血

嚴似

脂

脂者

是此

曰血

熱

之內

滯而

成患

當有

因救

起者

皆應

來不

清之

故須

以清

肺散

血之

劑外

貼藥

遂之

退赤

散

桑白

皮

甘草

牡丹

皮

黃芩

天花

粉

桔梗

赤芍

藥

歸尾

瓜

蔓

細末

每服

二錢

麥

門

冬

去心

煎

調下

赤絲

此症

起自

白睛

縱橫

赤脈

遠在

風輪

紅來

粗細

各有

重輕

燥熱

濕熱

澀急

羞明

痛癢

只是

昏瞶

勿視

天行

赤熱

勿視

赤熱

久不

而治

變症

蜂生

量其

虛實

治以

安血

此是

諸氣

輪有

絲脈

赤

常時

如是

者或

因目

病初

起失

養致

血滯

於絡

而赤

者其

病生

在氣

輪

白珠

有絲

脈

赤

常時

如是

者或

因目

病初

起失

養致

血滯

於絡

而赤

者其

病生

在氣

輪

白珠

有絲

脈

赤

常時

如是

者或

因目

病初

起失

養致

脈緩積或拂妄驚細不等但久而不愈非諸赤熱比之若只赤乳它味濕聚不與或有微汗濕熱者經因犯
傳以者重若目多赤外兼以枯澀而緊痛消渴而爛腹者看從何部分來或穿連某位即別其所患在何經
絡或傳或變自病含病等症分其生剋乘制然後因症分經以治之凡見絲脈亂紫內服外點點時細縮不
點即脈若激動病必急珠雖不紫胞雖不腫亦有滯在絡中幽深之所故未脹出耳項揭開上胞深處有之
其內必有不平之色因其滯而甘其變重者略導之不可太過過則傷其真血水虧者濕管約之宜至氣宣
服貼並行

退熱散 赤芍藥 黃連 木通 生地黃 炒桃仁 黃柏 鹽水 黃芩 酒 當歸尾 丹皮 甘草梢 各等分

右為末 每服五錢 白水二鐘 煎至八分 去滓 熱服

點眼藥仁膏 治風熱眼痛 點仁 去膜去皮 心膜油 好酥 一象 右將純仁與酥和勻 研攤碗內 用艾一小

圓 燒烟出 將碗覆烟上 熏待艾烟 即止 重研勻 每以麻子大 點眼兩皆 頭目二度

白痛 白眼痛有赤果等症 或痛甚而痛從外者 以者宜溫之 散之有不紅腫而濕痛者 火

白濕症

不腫不赤 爽快不得 沙濕昏朦 名曰白濕 氣分伏隱 脾肺濕熱

此症南人俗呼白眼 其病不腫不赤 只是濕痛 乃氣分隱伏之火 脾肺絡濕熱 秋天多患此 俗稱柳花赤白

者非也 桑白皮湯 桑白皮 一錢 澤瀉 黑豆 麥冬 甘草 二分 麥門冬 法黃芩 旋覆花 路一 菊花 五 地骨皮

桔梗 白茯苓 七 右剉劑 白水二鐘 煎至八分 去滓 溫服

白珠俱青症

邪攻精液神膏走色。眼青藍。無白珠。急訪明醫。果妙手。先救在蓋揭之。還。

此症乃目之白睛。受風火。眼青藍。也。病症元急。急無給本白。被邪邪。蓋逼走入珠中。青汁遊出。入於氣輪之內。故色眼青藍。雖神必有大小之患。失治者。眼神揭而終身疾矣。宜服還陰救苦湯。

還陰救苦湯。觀二。

天麻湯。天麻。家菊花。川芎。當歸身。羌活。白芍藥。甘草。右剉劑。白水二鐘。煎至八分。去。

滓。食後熱服。

傷寒瘧後。白珠青者。加柴胡。麥門冬。法黃芩。天花粉。毒氣所攻。白珠青者。加黃芩。牛蒡子。炒連翹。黃連。

目瘰。此有因風。因火。因血。虛而瘰者。大約以肝火為主。其有。

瘰如蟲行症。

瘰如蟲行。病屬肝心。無病而瘰。始末皆有。瘰而瘰。其病愈深。當時小瘰。入當辨明。輕重進退。宜審其因。

此症非謂常時小瘰之輕。如蟲行之瘰。不可不察。須念目上有無邪症。決其病之進退。至於有障無障。有。

瘰之患。病源非一。有風邪之瘰。有火瘰。有血瘰。有行。瘰好通陽而瘰。大抵有病之目。久不治而作瘰者。

瘰一番。則病重一番。若瘰治用藥。使而瘰作者。病必去速。若瘰難常。時時瘰作。目覺低陷者。命亦不之矣。

有瘰瘰而目脫者。此則近矣。須多者。血虛火炎。大抵瘰瘰者。瘰瘰虛。雖火來虛而入。非其本病也。宜服驅風。

一字散。

驅風一字散。治目瘰。川芎。川芎。刺芥穗各。羌活。防風。各二兩。右剉細末。每服二錢。食後。蘇薄荷。

湯調下。

人參。羌活湯。治肝熱。赤茯苓。人參。羌活。獨活。地黃。川芎。柴胡。枳殼。細甘草。煎。

前胡 天麻 右剉剉白二鍾可至八分去滓熱服甚苦如防風制之

廣天黃明湯治兩目赤腫熱痛眼目腫痛人眼赤腫痛 防風 川芎 龍胆草 各一分

右剉剉如麻豆許大內甘草木剉口作一挺先以水一大碗半煎龍膽草一味乾一斗去八餘三味煎至小

半碗去滓用清汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用五七次洗畢含眼須臾淚亦減矣

腫脹 按腫脹有風熱上攻等症人各症或風火或濕或白睛

腫脹如極症

腫脹如極目最疼淚多怕熱與羞明若后頭眩與眼痛水火為殃禍不難勿視時中准奏此管教變症似風生

此症謂目赤痛胞脹如極也足肝火有餘脾土受克腎水不能生故火邪炎來虛而為多火像之病其珠必

痛目胞腫硬若風火客熱而作痛者多熱淚而珠痛尤在稍緩風熱外感者治若木火內攻則后退還重

則乘虛乘目血滯睛中而症變不測宜開導散則敷治而退重則必清開導若敷治不速退而復還則導

不消消而復痛連於頭眩腫食高而脾熱此風熱成毒也宜服此

散熱消毒飲子 牛黃子 羌活 黃連 黃芩 蘇薄荷 防風 連翹 各等 右剉剉白二鍾煎至八

分去滓食後服 金解毒 治風熱上攻 黃連 二龍膽草 大黃 黃柏 各等 山梔仁 各一 乳香 各二 煨砂 各二 燈心 各二

青竹葉 各一 大麥 二十粒 右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢火煎不令大沸候汁出

汁外下火放冷用絹絞取汁於無風處浸一時辰去滓於器內用慢火熬令減半入白蜜半斤同攪勻

融和以助挑之有絲則止或冷再以夾絹袋蘸過用磁盒盛每取一茶匙許研龍腦一字極細入膏同研

一二午過合勻取少許點之

氣輸自平。水輸尚明。惟風輸而涌起。或赤或白。以縱橫肝氣。屬風。血液之清。並使風輸。致氣損及瞳神。此症目病。氣輸自平。惟風輸高。起而涌也。或有從風輸左邊突起。亦有右邊突起者。乃肝氣。濁風。將血液而肝血。滯。火鬱風輪。肝胆火。脹起。或上或下。或在左右。各隨火之所致。從上脹者。多成此症。旋經共起。而黑輪俱凸。起。頂。共。不可醫者。類也。宜服瀉肝散。

瀉肝散 升麻 木賊草 鹽麝 五靈脂 陳皮 家菊花 黃芩 赤白芍 大黃 蘇薄荷

防風 梔子仁 甘草 玄明粉 右為細末。每服二錢。食後白滾湯調下。為劑亦可煎服。胸脹者。

枳殼厚朴。

救睛丸 專治內障 當歸身 蒼朮 水荊芥穗 蟬退 玄明草 決明 沙川等 蘇薄荷 甘草 谷精

枳殼 木賊草 右為末。煉蜜為丸。如彈子大。每服一丸。食後茶清化下。

珠珀出眶症

珠珀出眶。疼痛難當。既難兩脫。枉見仙方。虛乃氣血之不足。實則暴火之為殃。若然半出。尤可復康。脈絡既動。終是無光。

此症專言烏睛。暴然突出眶外。其與鵝眼症。因滯而慢慢脹出者不同。有具元將散。情畢收復。致脈絡俱損。癢極指撻而出者。其人不久必死。有醉酒起甚。以及嘔吐極。而突出者。有因患病熱甚。致關格亢極。而脹出者。有因怒甚。吼叫而奔出者。皆因水裏液少。精血虧損。故脈絡素脆。邪氣感極。火無從出。而氣濕固之不及。故湧脹而出。有因打撲而出。此亦偶然之禍。凡出難離兩眼。而脈絡未斷者。乘熱納入。雖入脈絡將動。終是無光。若難突而猶含者。易入。光不損。雖難脫脈。絡絡俱斷而出者。不能救矣。宜服救睛丸。救睛丸 枸杞子 蒼朮 山梔仁 赤芍 蘇薄荷 右為細末。酒糊為丸。如桐子大。每服三錢。井花

涼水送下或令茶清亦可少平之人可服年老之人可服後方。

立退凡一

硃砂

人參

天門冬

石菖蒲

遠志

麥冬

心去煩知子

各一白茯苓

為細末

煉蜜為丸

如桐子大

每服一錢五分

茶清送下

或沸湯亦可

水淋法

治淋病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

外障

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

以下之

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

定州之

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

之類治法

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

黃臘上衝症

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

黃臘上衝症

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

黃臘上衝症

治眼病

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

此症於

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

生醫等

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

焦刺絡

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

通將

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

防風

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

工應

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

工應

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

服藥

為不食草... 右為細末入膏... 和以公水... 煮成膏... 出為度

赤腫下疳

此症初起甚微... 次則甚大... 大則病急... 其患有障色者... 亦從白輪而下也... 而黑珠上邊... 從白際起障一片

仍有赤絲... 牽絆眼大... 熱赤甚... 泪混珠... 頭痛者... 病急而有變... 絲細少... 已微赤... 珠不疼... 頭不痛者... 緩而不變... 亦有珠雖不痛... 頭不痛者... 如無他症... 或只色赤而無障障... 障上仍有細絲牽絆... 或於障邊下... 仍起星數點... 此星是亦說脂之微病也... 此等皆是火在內滯之患... 其相向輕... 治亦當善... 蓋無形之火... 潛入膏肉... 故作是症... 非比有形血氣之重也... 若障上有絲... 及星生於絲稍... 皆有退避之病... 為接得絲脈中生氣... 故易生而難退... 雖然退避亦善... 退為上... 至於其善... 不得已而開導之... 大抵白珠上平邊有赤脈生起... 垂下黑珠者... 不論多寡... 但有淚珠乳赤... 便是凶症... 縱有絲少微赤... 或細鹿連斷... 或貫瞳神... 或指薄翳厚... 皆是惡症... 便是可治... 亦當耐久... 此症是源氣在眼... 此隱之火... 深潛格... 故有此脈之赤... 四圍雖無熱血... 其深處亦有滯積... 故滯滯而火赤甚... 一旦屬動... 則患逆發... 亦其矣... 內見淚滑... 外有此病... 輕者消散... 重者開導... 此一定之法也... 宜服皂角丸

皂角丸

治內外一切障膜... 此藥能開眼除翳... 十六般內障... 同生熱地... 黃九用之神效

川山甲

炒蟬退

白木

玄精石

胆殺精草

當歸

治

茯苓

木賊草

赤芍藥

龍連

連翹

刺胃皮

龍膽草

菊花

格西人參

真川芎

治

猪蹄爪

三十枚

右為細末

一半入猪牙皂角

二條

燒灰和勻

煉蜜為丸

如桐子大

每服三十丸

空心吞仁

湯送下

一半入仙靈脾

一兩為末和勻

洗眼金雞膏

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

治遠年近月翳膜

珍珠砂

乳香

明砂

當歸

尾

右為細末

後入研藥

拌勻

再研煉蜜為丸

如皂角子

每

服

服