

安九十一

痘疹

古今醫統大全卷之九十一目錄

痘疹洩秘

病機

痘疹二證表裏不同

痘夾疹

發熱透解散多痘疹必輕

痘本於胎毒

痘發於心經

出痘辯吉凶

痘疹不用服藥例

痘瘡合用服藥例

驚搐

嘔吐

泄瀉

喘渴

脹秘

白塌



寧集



黑陷

痒

痛

痘疔

斑疹

斑爛

声啞水唅

寒戰咬牙

面目發腫

晝夜啼哭

不乳不食

痘瘡入目

不灌漿

不結痂

不脫痂

癍痕凸凹

痘後癰癤

痘後餘熱

靨候

蠟紅白黑四色辯

形證輕重

順逆險三候大要

順逆險按期候法

治法

鮮執稀痘

始終調理

鮮表

攻裏

內托

養胃

痘瘡當看輕重緩急

首尾十二日證治條例

痘瘡治例

預防豆疹

痘瘡護眼法

首尾不可汗下辯

痘瘡禁忌

不可治證例

藥方

痘藥正品

發熱三朝門劑

參蘇飲

惺惺散

升麻湯

敗毒散

消毒飲

三豆飲子

托裏散

紅綿散

生油劑

三酥餅

抱龍丸

辰砂六一散

犀角地黄湯

紫草膏

藿香正氣散

導赤散

茵陳汁

牛旁子散

稀豆散

麻黃湯

五積散

五苓散

羌活散

奪命散

出痘三朝門劑

保元湯

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

小承氣湯

化毒湯

胡妄酒

稀痘酒

活血散

無僧散

無比散

人參白朮散

豆蔻餅

木香散

異攻散

珍珠膏

四順飲

秦皮湯

痰藜散

通神散

蟬菊散

甘桔湯

如聖湯

黃柏膏

黃芩散

牛參散

葡萄酒

保嬰丹

傳春散

玄參葉麻湯

葛根湯

化斑散

人參竹葉湯

六味人參麥門冬散

犀角散

玳瑁湯

理中湯

胃安散

通關散

救生散

滑石散

決毒丹

龍腦膏

牛黃散

南金散

硃砂膏

紅粉丹

紫金散

乳香猪血膏

脫殼散

宣毒膏

清涼飲子

大連翹飲

百祥丸

猪髓膏

敗毒散

荊防敗毒散

甘露飲

搽牙散

單胎散

安胎飲

審導法

避邪丹

古今醫統大全卷之九十一

新安東臯徐春甫編集

太倉改齋支秉中校正

痘疹淺秘

病機

痘疹二證表裏不同

痘之與疹雖皆中於胎毒其原雖同其證則異厚孕成之初先有
臟而後有腑臟乃積受之地腑乃傳送之所臟屬陰為裏故其受
毒為最深而痘所以久熱而難出腑屬陽為表故其受毒淺而疹
所以暴熱而易生

痘瘡出於臟故在肌肉血脉之間必先出紅斑而後漸起如痘故名曰痘

疹子出於腑故在皮膚之下而出皮膚之上其形如麻一出而沒俗名曰麻

痘自裏而出於臟故重疹自表而出於腑故輕

痘證早晨身微熱午後大熱眼睛黃色兩脇下吸吸然動甚則發驚搐此屬心臟病稍有失治或裏虛則甚陷入而不能救

疹證早晨微熱午後亦大熱眼白珠赤色而不黃手足冷而吐逆此屬肺臟病隨熱發散則易生易沒而愈為不難

甫按痘難疹易之說此則自其世俗常情而言之其有所感入深

胃氣原弱又或因瀉痢而出之不快或發之未透而隨現隨隱又
之邪氣漸入於胃必瀉不已而復發加之喘促為必死矣若此者
亦不可以易易言之耳所以疹證又何可以輕視之耶凡覓出疹
畧見虛弱當先補養脾胃欲出不出急宜托裏發表以助之首尾
俱不可瀉一如痘證同也○支氏曰疹證之發多在天行癘氣傳
染之時沿門比屋相傳輕重相等發熱之間或咳嗽噴嚏鼻流清
涕眼胞浮腫面腫腮赤或覓淚汪汪或惡心嘔噦即是疹候便宜
用解毒發散之藥依時令輕重催發出外不使停留於中自無後
患然其所發但以六時即收為度乃陽生陰成陰生陽成造化自
然之妙如午後出者子後收之類若一出即收者失之太速或一

出之後連延三四日不收者此毒太甚外發未盡內有餘邪所致
須與化斑解毒湯如玄參石膏之屬○又有疹既收回餘毒未
盡三日之外又復發出至五六次不已者此因發熱之時不避風
寒邪氣鬱於肌肉之間留連不散雖得前解發之劑終不舒暢若
出疹之際有雜證亦當隨證而治之○凡疹證發熱之時或嘔吐
或自利或滯下者皆火邪內迫毒氣所行之地而隨病也吐者竹
茹石膏湯自利者升麻澤瀉湯滯下者黃芩芍藥湯加黃連枳殼
實者少加大黃微下之虛者通加人參以佐之

痘夾疹

痘瘡之發常觸於天行時氣疹之發多由於時氣風寒本非尋常

並發者或有齊發並出此謂之兩感感氣臟腑擊動表裏交征皆為不順之候如痘稀疎可用升麻湯解之疹散豆出隨證調治若痘太盛其疹雖解氣血重傷至於收斂脫落終難痊安惟以保養脾胃調和氣血庶幾能濟

發熱久解散多痘疹必輕

凡小兒感時行發熱當用解毒發表之劑為第一法若能於發熱之初用力則痘疹自稀或稠亦勢輕也何則不知此義失於解散或一熱即出此痘多危蓋邪毒在中未嘗敗縱是正氣充完亦終為之累世謂服藥預先防之則終身不出斯亦理之所必無也蓋痘毒為人身所必有謂之所感有淺深所發有遲早固勢然也

於其感發之際解散毒邪痘疹自輕而得吉如傷寒證治失於其
時則有胃爛發斑春溫證治失於其時則有溫毒發斑由此而知
發熱之初若早為解散不致熱鬱於內而成痘疹有美若謂預防
用藥終身不出豈其理乎

凡小兒發熱如瘧狀熱作有時者為潮熱○發熱倍能飲食唇紅

面赤大小便秘脇下有汗者為風熱○發熱面赤鼻流清涕手足

煩燥左額青筋自汗惡寒者為傷風熱○發熱而手足微冷面色

青慘耳鼻冷腮寒無汗左額有青紋者是陽無熱○發熱眼胞微

腫右額有青筋頭熱肚熱皆滿惡食而腹脹者是食積熱○發熱

眉心青紋手心有汗時發驚惕者是驚風熱○發熱多渴飲腹

上有青筋或脹或瀉者為**瘧**。發熱唇下汗出唇中間起白

泡耳陰皆冷者為**少陰**。變蒸之中偶有時行寒疫者則耳與

陰反熱此為**陽氣**。發熱目閉面色赤者為**胎毒**。惟痘疹發

熱隨天氣而蒸出如冬月應寒而反溫謂之冬溫有隨春氣暄煖

而蒸出有因他病發熱不已而蒸出者此皆外熱而感動其中熱

為痘疹也夫痘疹正作之時其發熱也與傷寒相似蒸蒸壯熱咳

嗽痰涎唾涕鼻吸或作寒作熱或心痛頭痛或腹痛惡心或無五

臟之證明其熱自內而出也面赤唇紅煩悶噴嚏呵欠惟耳與尻

及手足指冷此欲發痘疹也蓋耳尻為腎之外候原腎不受火邪

而無痘毒故發熱不干腎之經也耳雖不熱亦有紅脉見于耳後

方為痘疹如不渴不瀉不煩亂二便如常此為吉證不須用藥

痘本於胎毒

錢氏曰小兒痘疹蓋由受胎之感血穢液毒十月有生之後必感

外邪而發一次故謂之百歲瘡又謂之天瘡其狀如豆故曰痘瘡

魏氏曰痘之為證根於精血之初成於淫火之後男女交媾無欲

不行無火不動欲因火生火因欲熾精施血就何莫而非火之所

為三五妙合精血成形亦必集火以鎔冶也文氏曰受胎之初假

父精母血交媾而成形不無慾火熾於其中至於兒在母胎十月

藉其氣血以長養為母者多不能節房欲戒厚味日積月累感於

胞胎及兒臟腑謂之胎毒降生之後必感運氣勝復之邪衝搏原

淫火謂先

在胎母之

節我謂胎

及有生乳

之不節我

後天毒觸

內外因外

內外因三

吉函在于

從深不守

是乃受真

測遲早受

黑難云在