

卷七

谷道痛痒

脱肛

痔

蓄血

大小便不通

溺血

小便數

小便不禁

小便黃赤

金匱啟鑰

第七冊

濂江黃朝坊妙心輯著

谷道痛癢論

澠江黃朝坊妙山輯著

人身之痛癢或謂寔則痛虛則癢乃以痛癢而驗其虛寔也谷道痛癢一証方書缺如未見有懸其名者卽準繩列其名亦未詳其病源孰虛孰寔未有定其何証何藥而所傳者不過外方噫古人或以谷道乃卑汚之地不足掛人齒頰故置而不論與夫谷道正大腸之候乃手太陽經之所屬十二經之一耳胡可屏棄而不論乎設逢斯疾不亦心無所本莫知適從其將何法以調之所謂癢必由風風之所

由生多自熱。基如肺金燥。燥則熱。熱生風。臟病未有不傳於腑者。故
谷道而癢。此亦本經之正邪也。治宜清肺。飲合消風散。如或心火太
甚。金必受其尅。金既受尅。何能制木。則木因之而強燥。且肝主風。燥
益生風。木無所畏。而反侮金。而風得以淫於大腸。故谷道癢。此証以
火言之。謂之賊邪。以風言之。謂之微邪。欲除二邪。莫若加味道遙散。
加赤苓。防丰。荆芥之類。主之。若濕甚。生虫。土主濕。濕盛則泛溢。金性
本寒。濕最易侵。況母子一氣。不難相通。故脾濕未有不移於大腸。濕
甚。則肛門腫而痛。濕生虫。虫蝕則癢。而且痛。此從後來之虛邪。宜升
陽除濕。防丰湯。加檳榔。赤苓。川練川椒。蕪荑。以殺其虫。然谷道最遠。

黃散併納蠅螂丸。又方用杏仁搗作膏敷之。或梓桃葉貼坐。及木鼈
于泡洗之。或另用少許塗患處。皆治谷道痛癢。及生虫之要方也。至
幼時爲人異好風乘而入。故生虫奇癢者。另有治方列後。但醫者審
知此証切勿以真情作笑柄。令病者汗顏。此亦存忠厚之一道也。

証治歌

病生谷道是何因。因濕因風不可蒙。肺熱生風從腑出。治宜清肺飲
合消風散。肺金受燥難平木。此証多緣心火烘。加味逍遙散。何藥奏
防丰荆芥赤苓同。肛門腫痛因脾濕。癢必虫生谷道中。升陽除濕防

風湯加赤芍

武夷

檳榔川

椒川練並驅虫蟻螂丸

好向肛門納先用

烟薰艾與雄

黃散

貼坐可蒸桃葉熟塗膏須取杏仁紅或將木鼈煎

湯洗患處塗之治亦工更有奇方須慎用莫將隱事笑頑童

脈

診蠱蝕陰脫者皆虛邪之候其脈小者生洪大者亦可治緊急者死

方

蟻螂丸 治肛門癢或出膿血有虫傍生孔竅內

蟻螂

七個去翅足炙為末

新牛糞五

肥羊肉

一百炒

右共搗膏為丸如蓮子大炙令熟以新綿裹納下部各道中半日

雄黃散 治谷道因濕熱生虫欲成痔瘻

雄黃

右研細用艾綿包裹燒烟薰之。

清肺飲

治痰濕氣逆而咳嗽

杏仁

去皮尖

貝母

茯苓

桔梗

甘草

五味

橘紅

右加薑煎食遠服

杏仁膏

治谷道赤腫或痛或癢

杏仁

右搗作膏敷之。或炒黃以綿蘸谷道中。卽效。

桃葉方 治下部虫齧。

桃葉 一斛

右蒸令極熟。納小口器中。以下部坐之。虫立死。

木鼈方

木鼈子

四五枚去壳取肉

右研細。安新瓦器中。或木盆。以沸湯泡洗。或用少許塗患處。立效。

治谷道奇癢方 治幼時爲人嬰。奸風乘而生虫者。

蛇床子 苦楝皮 甘草

石等分研末練蜜和成條如指大導入肛門
加味逍遙散

見寒熱
料來

升陽除濕防丰湯

見感
冒

消風散

見咳嗽



此篇之末將准理以明經大舉人耳問疑六也請錄止

難經云。虛寔出焉。出者爲虛。入者爲寔。肛門之脫。非虛而何哉。况肺與大腸爲表裏。肛門爲大腸之候。肺氣寔則溫。溫則內氣充足。而有所蓄。故肛門收藏而不露。肺虛則寒。寒則內氣虧餒。故肛門滑而不收。然所謂寔者。乃元氣充足而寔。非邪熱之寔也。然亦有邪熱之寔者。但非一端耳。或因濕熱下墜。或血中伏熱而迫出者。又有兼痔漏而脫者。至所謂虛者。亦非一轍。有血虛不能潤攝。有氣虛不能收固。又有氣血兩虛而脫者。至於久瀉久痢。小兒老弱。產後努力。及酒色損傷脾腎。閤門不固。或因過服寒涼。下多亡陰。皆屬虛寒之一候也。

治法因濕熱勝肛門腫而濕潤宜升陽除濕湯若血中有熱肛門紅腫而痛或陰分尤甚宜四物湯加条芩槐花或涼血清腸散兼痔而痛者四物湯加槐花黃連升麻血虛而脫者四物湯加白朮茯苓或用小營煎氣虛而脫者宜四君子湯或人參理中湯氣虛下陷而脫者補中益氣湯至於五味故紙升麻白芍文蛤烏梅之類血虛氣虛俱可隨宜加用夫氣虛即陽虛也附子炮薑亦不畏其辛熱若氣血兼虛者十全大補湯上加之葯隨其所合而加之久瀉不止而滑脫者可用胃關煎或理中湯或九氣丹附子烏梅北味文蛤之類亦所相需平素酒色縱傷脾腎下元虧損關門因之不固所謂年老之人

味丸。或大補元煎。如陰中之陽虛。則益火以消陰翳。八味丸。或右歸丸。北味烏梅文蛤之類。均可隨宜加用。產婦用力太過而脫。宜六物煎。或十全大補湯。均可加升麻以升舉之。小兒無不由於脾肺氣虛。或先天稟受不足者。均可如氣虛藥用。先天虧者。亦如老人治法。外治之法。亦不可缺。寒者以香附荊芥等分煎湯洗之。熱者以文蛤朴硝煎湯洗之。可用木賊燒灰。不令烟盡。入射香少許。大便秘了。貼少許。或以文蛤末攤紙上貼肛。緩緩揉入。或用荊芥龍腦薄荷卜硝煎湯洗。或用陳壁土石榴皮加明礬少許煎湯洗。又方皂角槌碎煎湯洗。

或用葱湯洗軟以芭蕉葉托上驚頭燒灰塗古人外治陽証蟠龍散陰証伏龍肝散如此擇其合宜用之方以治外審其虛寔服葯以治內內外兼調何患肛門不收哉他若因虫蝕癢此爲虫蝕腸頭以補中益氣湯加使君子武荑川椒卽令虫下而瘡自平亦不可不知也。

証治歌

出虛入寔兩分衢。病脫肛門虛弱軀。然亦有虛兼有熱。古人治法載方書。肛門腫痛多緣濕。湯用升陽濕可除。四物湯加槐花條芩清血熱。清腸涼血散亦相如。痛兼毒者仍四物。湯升麻與槐花黃連加葯。

人參

理中湯

氣可扶。下陷陰虛無別計。補中

益氣

湯勿緩須臾。升麻

五味同文蛤。白芍還偕故紙烏梅。

氣血兩虛宜用此。隨時斟酌戒拘

壅。氣虛卽屬陽虛証。

炮薑附子

雖辛何畏乎

大補十全

湯

療氣血同

前加藥反三陽。脫因久瀉胃關

煎

好。或用理中湯不拘。九氣丹兮皆

要藥。文蛤烏梅

北

味附子

治無殊。倘因酒色傷脾腎。陰裏陰虛腎氣

枯。大補元煎丸六味皆堪壯水挽桑榆。陰中更有陽虛証。益火消陰

理不誣。丸用右歸兼八味。烏梅文蛤保無虞。十全

大補湯

六物

煎

加

升麻。藥產難能醫莫舍。諸若是小兒虧稟受。氣虛宜補勿踟躕。有寒

洗用荆

芥香

附

水熱必朴硝五味

子

俱或用薄荷荆芥並硝龍腦

洗堪娛或槌皂角煎湯浸或煮

石榴

明礬

壁土濡或泡蔥湯宜洗

軟芭蕉

葉

托上貴恬愉或燒木賊微添射

香

此葯須從

大

便後敷或

貼肛門研五味

子

或燒龍腦任調糊總之外治宜分別審慎陰陽兩

証區陰証伏龍肝散妙。蟠龍陽証治非迂。癢緣虫蝕中宜補

中益氣

湯史

君子

川

椒

武

莢養可祛。管見備陳隨擇用。莫將鄙論誚繁蕪。

脈

微細遲緩按之微有力。乃濕熱之所致。或浮緩沉微皆無氣力。四虛

兩虧之候。若浮大不附骨。左尺微弱。陰中之陰竭。浮遲沉細無力。右

(方)

涼血清腸散

荊芥

防風

升麻

各一

當歸

芍藥

生地黄

各一

黃芩

黃連

香附

川芎

甘草

各五

六物煎

治產婦用力太過而脫並治痘疹血氣不充隨証加減用

之神效並治男婦氣血俱虛等証

甘草

炙

當歸

地黄

川芎

三四分

芍藥

俱隨宜加減

人參

或有或無隨虛實用之氣不虛者不必用

右明凡水煎服如痘症發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以疏表或加防丰佐之如見点後豆不起發或起而不灌或灌而漿薄均宜單用此湯或加糯米人乳好酒肉桂川芎以助營氣如氣虛癢塌不起加川山甲炒用如紅紫血熱不起宜加紫草或犀角如脾氣稍滯者加陳皮山查如胃氣虛寒多嘔者加炮薑或丁香如腹痛兼滯加木香陳皮表虛氣陷不起或多汗者加黃芪氣血俱虛未起未灌而先癢者加肉桂白芷如元氣太虛寒戰咬牙瀉泄宜去芍藥加附子黃芪乾薑肉桂