

救急選方

坤

救急選方下卷

疔瘡急證門

程山齡曰療疔之法貴在乎早初起卽療者十

全十活稍遲者十全五六失療者十全一二

內服莫妙於菊花甘草湯

外料
十山

甘菊花

四兩

甘草

四錢

水煎頓服搗再煎服

消疔簡便方

大

疔瘡及諸惡毒初起但未成膿

者服之神效

白礬

研三錢

葱白

七莖



右同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一杯送下服畢用厚被蓋之再進葱白湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其病如脫此雖味澁難服其效甚妙

萬靈奪命丹

全大

療一切疔毒入腹煩悶惡心并

癰疽發背惡瘡

朱砂

水飛

蟾酥

人乳泡

輕粉

膽礬

各五錢

銅綠

血竭

各一兩

雄黃

枯礬

各二兩

共為細末麪糊丸棗

實大每服一丸令病人先將葱白三寸嚼爛

吐在手心將丸包在葱內熱湯吞下出汗

疔毒已篤者二服卽愈

丹方彙編

土蜂房

具一

蛇蛻

條一

黃泥固濟燒存性為末每空心

好酒服下錢少刻大痛痛止其瘡已化為黃

水

追疔奪命湯

急救仙方

能內消腫毒

羌活

獨治

防風

青皮

黃連

芍藥

細辛

甘草

蟬退

僵蚕

澤蘭

金線重樓

右等分水煎加少酒服以衣被蓋覆汗出為

救急選方
度病退減後再加太黃利一兩次以去餘毒

黃連解毒湯正宗療疔毒入心內熱口乾煩悶恍

惚脉實者黃連黃芩黃栢山梔

連翹甘草牛旁子各等分燈心二十

根水煎服

救命仙方外科纂要療疔毒走黃打滾欲死者一服

見効牡蠣山梔銀花木通連翹

牛房子乳香沒藥角刺瓜蒌仁

大黃地骨皮各八分右水酒煎便秘者

加扑消

即正宗疥毒後生湯
花粉代瓜蒌仁耳

大乙紫金丹

正解諸毒療諸瘡真能起死回生

方出飲食
中毒門

疥瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗

絲綿濾淨銀窩內煎三四沸服之病者須臾

腸鳴行利一二次甦醒方妙

瘡瘍經
驗全書

托裏護心散發瘡諸疔疽發背曾經汗下毒氣

攻心迷悶嘔而痛二三服而安乳香明淨

菜豆粉四兩

右細末每服三錢甘薑湯調

下
此方原出
于精要

此方原出于精要

金瘡癰撲門

傷重昏憤者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可

下急用花蕊石散內化之

方出卒失血門

恐因瀉而

亡陰也凡瘀血在內大小便不通用太黃朴

硝血凝而不下者急用木香肉桂末三二錢

以熱酒調灌服血下乃生若口噤手撒遺尿

痰盛唇青體冷者虛極之壞症也急投太劑

參附湯多有得生者

正體類要

參蘇飲

類要

療出血過多瘀血入肺面黑喘促

人參一兩

蘇木二兩

右水煎服

鷄鳴散

因三

療從高墜下及木石所壓凡是傷損

瘀血凝積氣絕欲死

大黃一兩

杏仁二七箇

右研細酒一盞煎至六分盞換去滓鷄鳴時

服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言

取藥不及急擘口開以熱小便灌之

療亂打血攻心

醫法指南

大黃

當歸

蘇木

紅花

各三分

酒水各半煎服

案斯方勝於大成湯

凡被打損血悶搶心氣絕不能言可擘開口尿

中令下咽卽醒又隨車落馬及車碾木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升

千金

跌撲傷損去血過多脉微欲死獨參湯加童便

接住元氣再處木法傷損及金瘡去血過多

與產婦同脉來和緩者生急疾訖者死互虛

細不互數實

證治大還

摧壓跌打從高墜下及竹木所磕落馬撲車氣沉重取藥不及擘開口以熱尿灌之用半夏

末吹鼻以艾灸臍再將患人盤尻坐住將髮提起使氣從上升則可活矣顧體集

又方危證簡便皂莢末急吹入鼻亦可如活却以生

薑汁和香油打勻灌之

療人被人打死或踢死危證簡便急取百會穴艾灸

三壯立甦

撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛救急易方用乾荷葉

五斤燒令烟盡空腹以童便溫下盞調下三

錢

傷經、砍斷血管、血出如湧、泉者是

醫學集成

銅末付

之、又用葱一斤炒乘熱熨之

自刻者乃迅速之變、須救在早、遲則額冷氣絕

必難救矣、氣從口鼻通出

生薑

五片

人參

二錢

白米

一合

煎湯灌之、接補元氣、急用

縫合法

正宗

自行被擗、穿斷舌心、血出不止、以米醋用鷄翎

刷所斷處、其血即止、仍用真蒲黃杏仁去皮

尖礪砂少許、研為細末、煉蜜調藥、稀稠得所

噤化而安

得効方

順血散

本朝經驗

療一切金瘡撲損及產後血暈

當歸

芎藭

芍藥

蒲黃

澤瀉

枳殼

人參

大黃

沈香

茯苓

各一錢

接骨木

五錢

甘草

三分

右剉細

每服二錢

入麻布袋用沸湯擺服之

五金所傷並竹木刺流血不止上身被傷急以

銀丁錠燒紅烙傷處如下身急以鉄丁塊燒

紅烙傷處其血立止此急救良方也

傷醫大全

可法良規云凡傷損之症若誤飲凉水瘀血凝滯氣道不通或血上逆多致不救若入於心卽死急飲童便熱酒以和之若患重而瘀血不易散者更和以辛溫之劑睡臥要上身墊高不時喚醒勿令熟睡則血庶不上逆故患重之人多為逆血填塞胸間或閉塞氣道咽喉口鼻不得出入而死

瘍醫大全

知日集不祥出人而

人全

重之以多為血氣

富家者與之令

不長積得與味以

則亦為積重則

欲康而不可為

中志自歎矣

破傷風門

大豆紫湯

千金

療破傷風入四體角弓反張口噤

不能言或產婦墮胎凡得此者太重不過五

劑

大豆

五升

清酒

斗

右二味以鐵鐺猛

火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一

升日夜數服服盡更合小汗則愈

破傷風瘡口作白痂無血者殺人最急療之

葉氏

方右以雄鼠糞直者是研細熱酒調半錢服

鎮風散

正

宗療破傷風諸藥不効事在危急者用

之必應

鏢膠

挫斷微焙

杭粉

焙黃即官粉

皂礬

炒紅色各一兩

朱砂

三錢別研

為細末每服

二錢無灰熱酒調下外灸傷處七壯知痛為

吉如一切猪羊癩風發時昏倒不省人事者

每服三錢二服即愈不發

玉真散

木事

療風自諸瘡口入為破傷風項強牙

關緊欲死防風天南星右為末每服

三錢童子小便一太盞煎至七分熱服

三因名防

打傷至死但心頭微溫以童子小便調下