

五卷
六

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註少陽全篇目錄

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

黃連湯

大柴胡湯

柴胡加芒消湯



五

五

五

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病証并治全篇

少陽主春其氣半出地外半在地中人身之氣亦如之故
主半表半裏也半表者謂在外之太陽也半裏者謂在內
之太陰也邪入其間陰陽相移寒熱交作邪正相持進退
互拒此際汗吐下三法俱在所禁故立小柴胡湯和解法
加減施治然小柴胡加減法中又有口不渴身有微熱者
加桂枝以取汗及下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔
頭汗出往來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又有柴胡

證具而反下之心下滿而鞭痛者此爲結胸也大陷胸湯
主之及柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱
鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫
以丸藥下之微利胸脇滿而嘔目瞀潮熱者小柴胡加芩
消湯下之等法是仲景亦有汗下之法惟在臨證詳察因
病施治不可執一也

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

註

少陽者膽經也其脈起於目銳眦從耳後入耳中挾咽出

頤頰中邪傷其經故口苦咽乾目眩也口苦者熱蒸膽氣

上溢也咽乾者熱耗其津液也目眩者熱薰眼發黑也此

揭中風傷寒邪傳少陽之總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者卽具此證之謂也

集註

林瀾曰論中言少陽病胸脇痛耳聾往來寒熱心煩喜嘔胸脇痞鞭半表半裏之證詳矣此何以曰口苦咽乾目眩也大抵病於經絡者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病則又必有此證也

沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾仲景另出手眼以補口苦咽乾目眩之裏證乃括少陽風傷衛寒傷榮風寒兩傷而言也吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主之若從火化

火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也

魏荔彤曰膽府與少陽經爲表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界爲言又曰經中所謂不必悉具者指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指爲少陽病成者

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

註 少陽卽首條口苦咽乾目眩之謂也中風謂此少陽病是

從中風之邪傳來也少陽之脈起目銳眥從耳後入耳中
其支者會缺盆下胸中循脇表邪值其經故目赤耳聾胸
中滿而煩也然此乃少陽半表半裏之胸滿而煩非太陽
證具之邪陷胸滿而煩者比故不可吐下若吐下則虛其
中神志虛怯則悸而驚也此揭中風邪傳少陽之大綱也

集

注程知曰少陽惟安和解若吐之則虛其陽而悸下之則虛

其陰而驚

汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行吐下之法成
註謂吐則傷氣氣虛者悸下則吐血血虛者驚不知驚悸
皆主於心誤吐且下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也

沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其邪已下胸循
脇吐之徒傷胸中之氣使邪內併逼迫神明則悸而驚也
魏荔彤曰此條論仲景不出方小柴胡條中有心煩心下
悸之證想可無事他求也汗吐下三法既不可行則當和
解之小柴胡爲少陽對證之藥斯用之空決耳

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語
此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註不曰少陽傷寒而曰傷寒畧言之也謂此少陽病是從傷

寒之邪傳來也脈弦細少陽之脈也上條不言脈此言脈
者補言之也頭痛發熱無汗傷寒之證也又兼見口苦咽

乾目眩少陽之證故曰屬少陽也蓋少陽之病已屬半裏
故不可發汗若發汗則益傷其津而助其熱必發譫語既
發譫語則是轉屬胃矣若其人津液素充豈能自和則或
可愈否則津乾熱結胃不能和不但譫語且更煩而悸矣
此揭傷寒邪傳少陽之大綱也

集注

王肯堂曰凡頭痛發熱俱為在表惟此頭痛發熱為少陽
者何也以其脈弦細故知邪入少陽之界也

喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉其
旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宜於發汗者尚不可汗則傷
風之不可汗更不待言矣傷風之胸滿而煩似可吐下者

尚不可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣喉弦細者邪欲入裏其在胃之津液已為熱耗重復發汗而驅其津液外出安得不譫語乎

汪琥曰誤發其汗譫語者奪其津液而胃乾故言亂也此少陽之邪已轉屬胃胃和則愈者言當用藥以下胃中之熱而使之和平也胃不和不但譫語更加煩擾松樗此言胃熱上犯於心故藏神不自寧也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或必下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

註

此承上三條互詳其證以明其治也傷寒中風三四日見
口苦咽乾目眩之證與弦細之脈知邪已傳少陽矣若兼
見耳聾目赤胸滿而煩者則知是從中風傳來也若兼見
頭痛發熱無汗者則知是從傷寒傳來也今五六日更見
往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔則知是中
風傷寒兼見俱有之證也少陽之邪進可傳太陰之裏退
可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外并於表半
表不解則作寒內并於裏半裏不和則作熱或表或裏無
常故往來寒熱不定也少陽之脈下胸循脇邪湊其經故
胸脇苦滿也少陽邪近乎陰故默默也少陽木邪病則妨

土故不欲飲食也邪在胸脇火無從泄上逼於心故心煩也邪欲入裏裏氣外拒故嘔嘔則木氣舒故喜之也此皆柴胡應有之證也其餘諸證時或有之總宜以小柴胡湯主之各隨見證以加減治之可耳然既分中風傷寒之辨而不分其治者何也蓋以太陽有營衛之分故風寒之辨宜嚴及傳陽明少陽則無營衛之分且其邪皆化熱故同歸一致也

集註

成無已曰邪在表裏之間謂之半表半裏傷寒中風者是

或傷寒或中風非傷寒再中風中風復傷寒也五六日邪自表傳裏之時邪在表則寒在裏則熱今在半表半裏之

間未有定處故往來寒熱也邪在表心腹不滿邪在裏則
心腹脹滿今言胸脇苦滿亦是在表裏之間也邪在表呻
吟不安邪在裏則內煩經云陽入之陰則靜默默由邪方
自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏不能食
不欲食者未至於必不能食故亦爲在表裏之間也邪在
表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔煩而喜嘔者邪在表
方傳裏也邪初入裏未有定處所傳不一故有或見之證
也

方有執曰五六日大約言也往來寒熱者邪入軀殼之裏
藏府之外兩界之隙地所謂半表半裏乃少陽所主之部

位也故入而併於陰則寒出而併於陽則熱出入無常故
寒熱間作也太陽一經有營衛之不同所以風寒異治陽
明切近太陽營衛之道在通風寒之辨尚嚴少陽一經越
陽明去太陽遠矣風寒無異治經以傷寒中風五六日往
來寒熱交互為文者發明風寒至此同歸於一致也

小柴胡湯方

柴胡 半劬

黃芩 三兩

人參 三兩

半夏 半升

甘草 三兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蒌實一枚

若渴去半夏加人參合前成四兩半栝蒌根四兩

若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩

若不渴外有微熱者去人參加桂枝三兩溫服微汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

方

解邪傳太陽陽明日汗曰吐曰下邪傳少陽惟宏和解汗吐

下三法皆在所禁以其邪在半表半裏而角於軀殼之內
界在半表者是客邪爲病也在半裏者是主氣受病也邪
正在兩界之間各無進退而相持故立和解一法既以柴
胡解少陽在經之表寒黃芩解少陽在府之裏熱猶恐在
裏之太陰正氣一虛在經之少陽邪氣乘之故以薑棗人
參和中而預壯裏氣使裏不受邪而和還表以作解也世
俗不審邪之所據果在半表半裏之間與所以應否和解
之宜及陰陽疑似之辨總以小柴胡爲套劑醫家幸其自
處無過病者喜其藥味平和殊不知因循誤人實爲不淺
故凡治病者當識其未然圖機於早也