

525

8684.

世

宗

說

約

(元
科)

卷四

醫宗說約外科卷之四

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏述

姚江後學石惠公威氏忝

婁東張浩孟如氏

吳縣雷仙鍾英氏訂

外科賦

瘡瘍外症歷代推詳。膏粱八風變痛本於內經。表裏三因治法。公平先哲。

經云膏粱之變。足生大丁。又云諸癰腫筋攣骨痛者。此寒氣之腫。八風變也。又云諸痛痒瘡瘍皆屬心火。三因詳後。

火氣微甚河間推痛痒之原。

河間曰人近火者微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也。或痒痛如針刺者猶飛迸火星灼之然也。或疑瘡瘍皆屬火熱而反腐出膿水者何也。猶谷肉菓菜熱極則腐爛而潰爲污水火熱過極反兼水化也。

氣血少多丹溪分經絡之異。

丹溪云瘡之要害處近虛處怯薄處。前哲已論及之。惟分經之言未之曾聞。前則諸經唯少陽厥陰經之瘍理宜預防。以其氣多血少也。其血本少肌肉難長少陽更有相火遽用破毒之劑以伐陰血禍不旋踵。一訣曰多血多氣君須記手經。

大腸足經胃多氣少血有六經三焦膽腎心脾肺多血少氣
心包絡膀胱小腸肝無異記此則知氣血多少之異矣。

外科精要五善七惡自明此事難知九死地分宜識聖濟錄名
色固詳宋李書論方斯驗竇氏之徒擅針經之妙毓仁之輩補
思邈之方熟味羣言勾述玄奧欲明大旨先分平病之人要識
安危宜究陰陽之症。

示吉按啓玄子曰經脉一周于身凡長一十六十二尺計人
之息其一萬三千五百定息平人一息脉行六寸漏水下百
刻則氣都行八百一十丈正難經所謂一日一夜榮衛行陽
二十五度行陰亦二十五度共百十度周于身也丹溪曰得

熱則行速而太過得寒則行遲而不及予按行速熱也多兼實陽症之所由生若兼虛後必陷爲陰行遲寒也多兼虛陰症之所由生若兼實後必返爲陽陰陽二症詳後

內因之故厚味薰蒸發熱更兼七情內攻外因之原風寒暑溫傷人亦爲乘虛襲體飢飽勞役失節是各不內外因更有冷熱不均而至金石燒煉常服是因藥毒內傷外有痰鬱兼發而來

三因既明部位宜審督脉通乎背脊背側二行太陽是其本經背分五行中間係可經督脉之道兩傍四行乃是太陽膀胱經之部分

任脉行乎腹中臍側兩傍三陰是其所屬

腹分七行奇經任脉從前陰起由臍中上咽喉至承漿而止
臍傍第一行一寸足少陰腎經之部第二行一寸足陽明胃
經之部第三行一寸足太陰脾足厥陰肝經之部乳根屬足
陽明胃乳傍乃手三陰經所起

足少陽

胆經

循脇肋行身之側足陽明

胃經

由乳中行身之前頭為

諸陽之會而為三陽之交手背為陽手之三陽從手走至面手

心為陰手之三陰從胸走至手足之外肘為陽足之三陽從足

走至頭足之內肘為陰足之三陰從足走至腹脣為脾竅舌乃

心苗目集五臟之精華鼻通肺家之呼吸腎竅于耳足少陽

胆經

遶耳之傍胃通于乳足厥陰司乳之頭跨馬囊膈肝家之部喉

癰臍發任脉之司

先明部分者。如毒見于背。見如胸中。屬督脉。伴屬足太陽經也。見于髤。屬手足少陽經。見于眉。屬手足太陽少陽經。見于頤。見于鬢。屬手足阳明經。見于頰。屬手太陽經。見于穿腦。屬督衝任三經。見于腿外。肘屬足三陽。內肘屬足三陰。見于臂。從手背赤肉。屬手三陽。從手心白肉。屬手三陰。見于乳內。屬陽明。外屬少陽。頭屬厥陰。還部推求。治療自驗。用藥引經。如太陽用防風羌活。陽明白芷升麻。少陽柴胡。太陰用白芍升麻。少陰只宜獨活。厥陰用青皮柴胡。佐之以桂。庶藥力直達患處也。

經絡已清引經之法有驗惡症須識費人之謗不生脫疽并疽
及腎疽天疽銳毒醫之何濟對心雙發及對口蓮子蜂窠急治
乃安

陳毓仁訣曰發于心上山心經五臟垂張事可明名曰井脾

家積毒生肩脊發于肩下脊上屬脾厚味發熱積心經火毒

對心臨背上對心而發形截督脉兩肩左右雙生發肺肝積

毒不虛稱左搭手屬肝右搭手屬肺俱生蓮子蜂窠防毒陷

孔似峰窠實如蓮于二發多生于背與心相近與脊中腰間

腎前發難生生于兩腰內陷肉之間或生兩腰中間惟此毒

活高腫為膿急以人參養督脉經虛從項發俗名對口治宜
柴湯合地黃丸療救之

精生于頭後而對前口故名對口但有偏正之不同正者屬
督脉易于起發治反易偏者屬太陽經疮多平塌治反難
俗以正爲重偏爲輕庸說也何期耳後多生發天疽銳毒病非輕

生耳後一寸三分間中是精鬱所致毒從肝肺來形多堅硬頭多隱伏未潰元氣未竭功生元氣易敗多致不救

有脫疽生手足。或生口。面。命難存。

不知痛痒熱矣難聞小兒多從積熱積毒大凡六歲至
燥熱古人雖有割截之法予見三人俱至七八日而

示吉曰諸症皆因瘡勢之治大積毒之最深。地分之險惡。故特指出然瘡之足以傷生者不止於此也。背上有九處。人髮

際爲玉枕

也頸項節二也第三椎爲崇骨二也第四

精爲主臟四也肺俞五也脾肝俞六也腎俞七也後心對鳩

尾

八也。鴈尾骨。凡九也。正面六處。喉骨爲垂骨一也。

胸爲神舍一也。心鳩尾三也。兩乳穴四也。臍中爲神闕五也。
臍上二寸爲腸屈間六也。其十五處俱忌生癰。外腦髟鬢顙
迎香瞳子膠之間者。俱地分之所忌。然種種地分皆脉絡所
會。內系府臟。若病者調攝得宜。醫者補瀉無失。亦可起死回
生。苟不知此。將息失宜。治不對症。雖發于不死之地分。吾知
其不免矣。

看病之淺深分毒之臟腑。大而高起。属于陽癰也。六腑所發。平
而內發。属于陰疽也。五臟所生。疽重而癰輕。最輕者初起無寒
無熱。是熱癰之浮于膚上。

凡瘡初起。不發寒熱。高腫于皮膚之間。淺而小。最大不過一

一寸者曰癰。六腑積熱發于肌膚之間高腫而痛如碗如盆曰癰。五臟積熱攻注肌膚初發如粟或如豆許與肉俱平而不高腫或作赤色時作痒痛曰疽。

陽毒而陰惡所慮者其症半陰半陽須司命之決于胸中初起焮疼頂如尖字惡寒發熱陽可知二七之期膿漸至。

訣曰癰疽須分陰陽症純陽初起必焮疼微惡寒時身又熱。

頂如尖字高突形腫似彎弓根緊高腫氣足根緊束血足也二七之期

膿漸侵陽瘡以十四日為關二便七焮痛二七膿成如常口有味腫消膿潰復

精神痛隨膿滅生新肉新肉紅色如痛子者吉腐皮將斂白星星此屬

純陽誠是善隨時調治自功成。

初起僵頑形如粟米。無熱不渴。陰爲逆。一七之後倦怠生。

訣曰。純陰之症。症何如。初如粟米。人不知。疙瘩僵頑。不紅腫。

無疼少熱。不愀時。七日之後。身倦怠。瘡根平大。實難支。

氣虛不能

起發則瘡頭平而不高。血虛不能束根。則瘡根漫腫而漸大。

頂不高尖。根不活。色無光采。

腐膿遲陷。軟無膿。空結聚。精神昏愒。氣難舒。飲食少減。身戰慄。瘡形紫色。藥無施。舌強痰喘。純症。縱有靈丹。不治之。

半陰半陽。死生難評。脉數無力。形似干昏。半爽半平。高食難消。運症見微寒微熱。微赤腫。投方應病。力得陰轉爲陽。腐去生新。乃可回生起死。

訣曰。陰陽相半。死生交善。惡相兼。細辨昭微。熱微寒微。赤腫。

半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖飡難運消腫而
不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒大便多澹小便數上身有汗
下身焦五善雖兼有七惡未全逃口渴喜茶腸腹痛面浮瘡
斂足心高心煩不穩睡神乱怕音焦投方應病方爲妙陰轉
爲陽漸可調

外症已審脉浮宜明氣血沉瀹脉來緊身有痛處卽發瘡疽之
兆身應發熱脉浮數人反惡寒卽爲瘡疽之萌

仲景曰脉數不時見則生惡瘡又曰肺脉俱數則生瘡

初起實大洪大爲病進已潰者爲邪氣未退而留連潰後沉實
沉伏爲餘毒初起者主邪氣深伏而難痊潰後脉沈瀹遲緩脉

症相應無効也若短細則將變症此六脈總不初起脉浮大洪

數邪正相搏有餘也若促結則非吉兆此六脈總不浮大浮數

瘡必高腫宜發表而忌攻利之方高腫者毒在表經所謂汗之

過反傷元氣沉數沉實邪必內藏其外症不煩腫高赤及發熱煩燥大便秘宜疏通而除

發表之劑平場漫腫宜內補托而益其虛不浮不沉當和榮衛

而解其勢初起宜疼不宜痒潰後作痒乃有長肉之功潰後遍身蚤疥

風乘虛入宜內托發散潰後宜痒不宜疼初起不疼乃有純陰之咎不痛

大痛非佳症或麻或痒實難医脉症初詳善惡細辨善不止于

五飲食知味二便調動息寧諍者吉惡不止于七嘔吐藥食自

上視神氣昏沉者凶善者五臟未傷善侯並至則生惡者五臟

已損惡候並至則死惡證忽有二三宜當深懼善候乍見一二便可回生。

五善訣曰心善精神爽言清古潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安
然一肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康
脾善唇滋潤衾無穢氣藏凡食俱有味膿厚更肥黃一肺善
声音響無痰韻更長皮膚多潤潤大便秘自尋常一腎善誠爲
要水升火降良口和因不渴小便利清長

七惡訣曰一惡神昏憤心煩古上乾瘡形多紫黑言語口呢

喃二惡腰身強目睛都脫入瘡頭流血水驚悸是肝逆

三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脚收不知疼四惡

皮膚稿声嘶韻不長痰多兼喘急鼻動肺將亡
五惡成消渴隨飲卽隨乾形容多慘黑囊縮腎凶端
六惡身浮腫腸鳴嘔呃頻大便多滑泄臟腑病將傾
七惡瘡陷形如剥鰓同四肢多冷逆污水自流通

示吉曰五善七惡方書俱載此訣尤備故心錄之然亦不止
於此也如膿成不自出失導引者死膿成不針烙反敷藥者
死熱痛正甚失治則毒內攻者死毒內攻後不服藥反針烙
者死潰而至于透內膜者死潰喉者死未潰而陷面青唇黑
便汚者死陰入腹入囊者死局腫不托裏反用下藥者死漫
腫不內托反用寒涼攻利者死潰後誤用寒涼致瘡紫黑者

死故治者不可不早亦不可審也

善惡明而生死自分虛實辨而補瀉方得氣實者瘡頂高而突起虛則平塌之可憂血實者瘡根束而鮮明虛則漫腫之有咎瘡之虛者腫平膿稀軟曼瘡之實者腫起堅硬膿稠瀉痢腸鳴脈弱皮寒飲食嘔而手足冷臟腑之虛可知胸腹滿脹身熱脈大飲食如故二便調臟腑之實有驗瘡口不合膿稀肉冷自汗色脫者乃氣血之虛寒熱疼痛高腫色赤膿厚肌熱者乃血氣之實上實則口渴飲冷目赤頭疼鼻不通下實則小便如淋腹中膨脹大便秘結下虛精滑泄瀉脉沉足冷最爲凶上虛則目閉神昏無熱不渴真爲逆邪氣甚則實腫焮疼痛日久不潰大便秘