

注解傷寒論卷第六

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨太陰病脉證并治法第十

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胃下結太陰為病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而為腹滿上

不得降者嘔吐而食不下不得上者自利益甚時

腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作

痞太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈太陰

脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽

脉則生以陰得陽太陰病欲解時從亥至丑上脾為陰土

傷寒論

卷六

一

王於丑亥子同
王故為解時

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

日

浮為在表沉為在裏太陰病脉
浮者邪在經也故當汗解之

自利不渴者屬太陰

以其藏有寒故也當溫之宜服四逆湯

自利而渴者屬少陰為難治

在下焦自利不渴者屬太陰為寒
在中焦與四逆等湯以溫其藏

傷寒脉浮而緩

日

足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者

不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止

以脾家實腐穢當去故也

太陰病至七八日大便鞭者為太陰入府傳於陽明

也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去
也下利煩躁者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩

下利日十餘行而利必自止

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛

者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太

陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

大實痛者桂枝加大

黃湯主之

故加大黃以下大實

太陰為病脈弱其

人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人

氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大

黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脈證并治法第十一

少陰之為病脈微細但欲寐也

少陰為病脈微細為邪氣傳裏深也衛氣

行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故

引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者

以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐煩者表邪傳

裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰

六日邪傳少陰之時白利不渴者寒在中焦屬少陰

此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲飲

水白救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利

欲飲水者以有熱故也此下利雖渴然以小便色白明非裏熱不可不察病人脉陰陽

緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脉陰陽俱緊為少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛

不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪

客少陰之絡令人嗌痛不可內食少陰病欬而不利

少陰寒甚是當咽痛而復吐利

嚴語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰少

汗者津液內竭加火氣煩之故嚴語小便難也少

陰病脉細沉數病為在裏不可發汗少陰病始得之

陰病脉細沉數病為在裏不可發汗反發熱脉沉者

為邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脉

微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可

下之脉微為亡陽表虛不可發汗脉少陰病脉緊至

七八日自下利脉暴微手足反溫脉緊反去者為欲

解也雖煩下利必自愈八日傳經盡欲解之時自下

利脉暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者

則手足厥而脉緊不去今手足反溫脉緊反去知陽

氣復寒氣去故為欲解下利煩躁者少陰病下利若

逆此正勝邪微雖煩下利必自止少陰病下利惡

利自止惡寒而踰卧手足溫者可治少陰病下利惡

陰勝也利自止手足溫者少陰病惡寒而踰時自煩

裏和陽氣得復故為惡寒而踰陰寒甚也時時自煩欲

欲去衣被者可治去衣被為陽氣得復故云可治

南京中醫藥大學圖書館版權所有

少陰中風。脈陽微陰浮者為欲愈。少陰中風。陽脈當

邪緩也。陰脈當沉而陰陽調和。故為欲愈。少陰病。

解時從子至寅上。陽生於子。為一陽。丑為二陽。寅為三陽。少陰解於此者。陰得陽則

也。少陰病吐利。手足不逆冷。反發熱者。不死。脈不

者。灸少陰七壯。經曰。少陰病吐利躁煩四逆者死。吐

發熱不死。脈不至者。吐利暴少。陰病八九日。一身手

虛也。灸少陰七壯以通其脈。少陰病八九日。一身手

足盡熱者。以熱在膀胱。必便血也。膀胱太陽也。少陰

病至八九日。寒邪變熱。復傳太陽。太陽為諸陽主氣。熱在太陽。故一身手足盡熱。太陽經多血。少氣為熱所乘。則血散下。少陰病但厥無汗而強發之。必動其

血。未知從何道出。或從口鼻。或從目出。是名下厥上

竭為難治

但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱乘經虛迫血妄行從虛而出或從口

鼻或從目出諸厥者皆屬於下但厥為下厥血少陰

流於上為上竭傷氣損血邪甚正虛故為難治少陰

病惡寒身踰而利手

足逆冷者不治針經曰多寒者難治

已此內外寒極純少

陰病吐利躁煩四逆者死

陰無陽故云不治

甚於裏四逆者寒甚於表躁少陰病下利止而頭眩

煩則陽氣欲絕是知

死矣

時時自冒者死

下利止則水穀竭也

寒而身踰脉不至不

煩而躁者死

真氣絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為熱

來有斬則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈

將滅而暴明

少陰病六七日息高者死

其能久乎

少陰病六七日不愈而

息高者生氣斷絕也

少陰病脉微細沉但欲臥汗

出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者

死陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更

故自利煩躁不得卧寐則正氣弱陽不能復病勝者

死少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯

主之少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脈沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之

麻黃二兩去節甘熱

細辛二兩辛熱

附子一枚炮去皮破八片辛熱

內經曰寒淫於內治以甘熱位以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

三日無裏證故微發汗也二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附子

子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃二兩去節

甘草二兩炙

附子一枚炮去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫經氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠

湯主之脉經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心



南京中醫藥大學圖書館藏

中煩不得卧也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連

四兩 苦寒

黃芩

一兩 苦寒

芍藥

二兩 酸平

雞子黃

二枚 甘溫

阿膠

三兩 甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱

盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣



南京中医药大学图书馆藏

弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

附子

二枚炮破入
片去皮辛熱

茯苓

三兩
甘平

人參

二兩
甘溫

白朮

四兩
甘溫

芍藥

三兩
酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參
白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所
以然者偏陰偏陽則為病火
欲實水當平之不欲偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

少陰腎水而主骨節身體疼痛支冷脈沉者寒盛於
陰也身疼骨痛若脈浮手足熱則可發汗此手足寒



脈沉故當與少陰病下利便膿血者桃花湯主之
 附子湯溫經少陰病下利便膿血者協熱也少陰病下利便膿血者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂一斤一半全用乾薑一兩粳米一升

瀉可去脫赤石脂瀉以固腸胃辛以散之
 乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤

石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止

便膿血者桃花湯主之二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便

不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利少陰病



下种便膿血者可刺下焦血氣留聚腐化則為膿少

陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之利

手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者少陰病下利

陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒少陰病下利

痛胃滿心煩者猪膚湯主之少陰之脈從腎上貫膈入肺中循喉嚨其支

別者從肺出絡心注胃中邪自陽經傳於少陰陰虛客熱下利咽痛胃滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚湯方

猪膚一斤味甘寒

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白

粉五合熬香和令相得溫分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯
陽邪傳於少陰邪熱爲咽痛服甘草湯則差若熱相搏爲咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯和少陰之氣

甘草湯方

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日

二服

桔梗湯方

桔梗一兩味辛甘微溫

甘草二兩味甘平

桔梗辛溫以散寒甘草甘平以除熱甘桔相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主

之熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能言語聲不出者與苦酒湯以解絡熱愈咽瘡

苦酒湯方

半夏

洗破如棗核十四枚辛温

大雞子

一枚去黃內上苦酒著雞子殼中甘微寒

辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以欽咽瘡

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐮中安

火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主

少陰寒熱相搏咽痛半夏及湯主少陰客寒咽痛也

半夏散及湯方

半夏

洗辛溫

桂枝

去皮辛熱

甘草

炙甘平以
上各等分

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏
桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕

日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩

方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之

少陰主水少陰客寒不能
制水故自利也白通湯溫

裏散寒

白通湯方

葱白

四莖辛溫

乾薑

一兩辛熱

附子

一枚生用去皮
破八片辛熱

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利脈微者與白通湯利不止。脈逆無脈者。

嘔煩者白通加猪膽汁湯主之。服湯脉暴出者死。微

續者生○少陰病下利脈微爲寒極陰勝與白通湯復
陽散寒服湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者寒

氣太甚內爲格拒陽氣逆亂也與白通湯加豬膽汁
湯以和之內經曰逆而從之從而逆之反曰逆者正
治從者反治此之謂也服湯脈暴出者正氣因
發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生

白通加猪胆汁湯方

葱白

卷四

乾
點
鹽

兩

附子

皮一枚生去

人尿

五合
誠寒

猪胆汁

苦寒