

舌鑑

88

外科必應方

陶慕齡撰



白胎舌

將瘟舌

週圍純紅中白胎半表半裏莫疑猜
丹田有熱胸中冷少陽施豉劑
舌見白胎滑者打入裏之乃少陽之
純紅名為將瘟舌舌見紅分內蓄熱
不同何經宜用涼透頂清神散最吉



裡圈

人裂

中有紅暈邊黑惡餘毒遺于心色落
邪火鬱結在中焦承氣煎未盡
沒江中召一紅暈沿皆黑乃餘毒遺
邪火結在中焦元極之放之

舌見紅分有裂紋君火燔灼人字痕
熱毒攻上宜涼膈後季医生仔細存




虫卒

裡黑


純紅之中紅點深三三兩三似虫形
只因水火相離遠小承氣湯服即愈
紅點如虫形蝕之狀者乃熱毒熾甚大
上水在下水火不濟故也

週圍純紅好難詳中有黑舌小而長
熱毒熾盛生紅刺速進調胃承氣湯

厥陰



死現



純紅舌上黑舌紋
此乃陰毒厥陰經

黑紋隱如珠線
理中四逆兩陽虛

此乃陰毒于肝經肝主筋故方見

滿舌之中黑似泥
病家見之命即西

只因水尅心經火
靈醫扁鵲亦難痊



黃脈

黑志

舌尖白兮舌根黃還宜解表莫心慌

若還表解方攻裏大便秘結用硝黃

小便濇者五苓散益元散即黃汗西相普

見機而作曉君用不可心粗而喜忙

週圍色白中黑心忤左見之怕脈沉

診來浮滑沉微汗實母下之減上分

醫人遇此危難症調胃承氣莫遲停

脈沉者難治浮滑可汗沉實者可下初病見此危

殆之甚也



舌尖白分二分多一分黑色在根巢
身痛惡寒如不飲五苓一劑甚調
目汗渴者白虎用下痢还将解毒
法危症也

紅凌週圍中白胎胎中黑刺亂生未
微、解毒宜涼膈毒透滯下莫遲換
調胃承氣煎一劑其危雖險可消災

滿舌灰色好難詳中間黑暈兩三長
熱逼命門兼腎肉急宜下之解毒湯
快早煎三五劑少壯之人不大難

週圍滿舌色微黃妄語譫言亂欲狂

新病提因由少汗表邪入裏內經傷

必因汗下兼行利用双解散加解毒湯

中白胎分尖微黃見人作泄更惡妨
解毒湯中加減用畏寒惡冷

週圍淡白中微黃表症未除小柴湯
若還表裏從容下大柴一劑即安康



週圍波面中純黃皆表傳裏入胃房
急速下之休遲候下遲文黑惡邪氣
邪氣深未不可治急宜調胃承氣湯
舌右本色左白胎醫人見了莫疑猜
慢々清涼不可下白虎湯中入小柴



舌左本色右白胎病在肌肉少安排
寒熱往來身倦困半表半裏用

四邊微紅中灰色此是醫人未下得
快將承氣末下之身涼熱退為下得
若下五利不轉紅何用匡家枉費功



舌見黃分黑點生謔言妄語渴身停
脈來有力皆為吉診來細清十餘日
尋衣摸床皆不治大便黑通利不難
必須大承湯二劑十分之中活
兩邊黃分中黑尖熱氣深沈兩相連
惡寒甚者終必死十分之中望一全
不惡寒時速下利調胃湯煎病可痊



週圍波紅中波黑惡寒表病未除得
雙解散加解毒湯微有汗方不傳
結胸煩燥目直視縱遇仙丹救不

四圍白色肉中黃心作煩渴吐忙
五苓益元兼表症黃盡之時承氣湯




舌見黃兮其症苦更加黑點邪入腑
將入五臟宜下之十升之中救

舌見中黃白左尖表微裏更相連
天水散加涼膈服防風通聖治脈強

弦





舌見純黃花瓣形邪熱入胃毒已深
心火煩渴兼煩燥急宜下之用大承
若發黃者茵陳用結胸堅實
有血蓄水當在脇十棗湯煎更有功
舌見灰色尖青黃不惡風寒脈浮涼
若怕熱來兼怕冷雙解散加解毒湯
三四利後黑糞見病中如同瓦上霜



中醫藥大學圖書館版權所有

舌根微黑舌尖黃脈浮養陰宜退陽
若惡風寒双解散下利还加解毒湯
匠人但能明此理十病之中有八痊

舌根灰黑舌尖黃一紋隱在中央
急用大承湯一剂脈浮作渴凉膈膏
舌中奧理君須解十病之中救一双

痧瘧舌

舌見灰色黑長紋脈實下之用大寒
脈浮渴者涼膈散十病逢之有

舌見白胎有紅星剗傷葛梗莫遲停
透肌解表重見小汗之後見分明
舌見白苔而紅點其症必嘔吐屬散

瘧斑痧之症也

