

冬部

S 2942
3417

第十二卷

婦人科痘瘡

第十三卷

麻疹門

第十四卷

痘疹門諸方

第十五卷

痘疹補遺

終

馮氏錦囊秘錄痘疹全集

共十五卷

訂四本

馬氏錦囊秘錄痘疹全集卷十一 婦人科痘疹

男 乾亨禮齋

海鹽馬兆張楚瞻甫纂輯 門人王崇志慎初仝較

男 乾吉佑民

論女人出痘經至

夫男女患痘固無異也。但痘以氣為主而血為附。故氣以
血之血以濡之一或不足則變生焉。女子乃係陰質。十四
歲已後出痘者常恐天癸之行。榮血一走。衛氣隨虛。即成
陷伏。惟斯異耳。然有痘疹發熱。却非天癸之期。經水忽行。

者此因毒火內動擾亂血海是以迫經妄行未及期而至也其瘡必多其毒必盛宜玄參地黃湯涼血解毒爲主使熱得清毒得解痘得出經水止方無變患如久不止則中氣虛弱而成陷伏十全湯補而托之更有發熱之時正值天癸之期經水適來者此則積污得去毒亦稍解熱隨血清而瘡自出不須施治更不必止之惟過四日而猶不止者是又邪乘血室之虛而迫血妄行爲內動中虛之症矣宜先服小柴胡加生地黃湯以清血室之熱後用十全大補湯以補氣血之虛令易出易發易靨可也更恐經走則

虛觸其惡氣。則痘乘虛多變。宜用芫荇煎湯洗淨其外。以香艾揉熟去梗。淨布包裹。緊納陰中。時時更換。再服參者。歸地升麻。蠶蟬退之類。虛寒者。加入炒黑乾薑。

論女人經後證治并居經症

凡發熱之時。適因經水方斷。是以血分空虛者。須早服柴胡四物湯。以防毒邪乘虛而入。若已憎寒壯熱。神識不清。見聞狂妄。言語錯亂。尋衣撮空者。此因血室空虛而熱邪已入血室。血室者。衝脉是也。而肝主之。治宜四物湯合導赤散。加麥門冬。與安神丸相間服之。更凡女子經閉者。謂

之居經滿而不瀉。病在心脾。瘡疹之毒本屬於心。又脾爲主。若心脾先病。則血室不行。衝任之間已多積垢。勢必至於瘡疹之火。鬱於命門胞戶之中。當出不出。毒邪留伏。致生乖戾者。理所必矣。是故發熱之初。當卽滌除停垢。宜桃仁承氣湯主之。後以四物湯合勻氣散。加紅花、木通治之。固不可使其有盈。更不可使其有虧也。倘雖居經而痘起。脹如常。飲食如故。而無腹痛。他苦者。亦不必過於治也。復有血海乾涸。經水不通。而適逢出痘者。治法亦宜調其心脾。使裏氣旣和。邪無留伏。而自外出。否則毒鬱衝任之間。

三熱併發互爲攻擊則血妄行不止或毒不出而爲喘急
爲腹脹爲陷伏矣

論經後失音及陷伏

凡女子出痘經水忽行乃暴瘡不語者蓋心主血舌乃心
之苗血去則心虛心虛則少陰之脉不能上榮於舌故卒
失音不語也宜先以當歸養心湯養心血利心竅待其能
言則以十全大補湯調之更有因值月事大行是以瘡不
起發不光壯不飽滿不紅活頂平陷色灰白或青乾黑陷
者此皆裏虛之候瘡復陷入也治宜十全大補湯奪命丹

相間服之。如瘡胖脹紅綻。或瘡空中再出一番者。俱爲大吉之兆。若加腹脹喘促。譫妄悶亂。寒戰咬牙。手足厥逆者。必死之症也。

論崩漏出痘

凡女子一向崩漏未止。氣血已虛。再若感患瘡疹。則必不能。以其毒宜用十全大補湯。以補氣血爲主。若灰白平陷難發。難漿者。加熟附子一二片。使裏氣充足。毒無停留。而自能飲食。自能起脹。庶可保全。否則倒塌不治矣。更凡正當起發泡漿之時。最宜表裏無病。飲食如常。若遇經行。

過三日而不止者人但慮其穢氣觸動殊不知身中之血
一去百脉之氣皆虛毒邪乘虛陷入或難灌漿頂平形塌
或爲黑陷灰白色矣惟元氣素壯又能食者必無是變如
氣虛食少之人未不如是也宜十全大補湯主之若虛
甚者則少加熟附子可也然服此而出膿痘者爲吉若寒
戰咬牙喘急腫滿手足厥冷者此爲內脫不治之症矣

孕婦出痘

附臨產

凡孕婦出痘熱能動胎胎落則氣血衰敗而痘不能起發
灌漿矣故始終以安胎爲主外用綳軟之帛緊兜肚上切

不可用丁桂燥熱之品及食牛虱毒物之類以致觸犯其
條芩白朮艾葉砂仁之類與候相宜者採而用之其初發
熱則以參蘇飲發之痘既出後則多服安胎飲保之渴者
則用人參白朮散加減泄者則用黃芩湯合四君子湯內
加訶子血虛者則以四物湯加托藥色灰白而起發較遲
者則用十全大補湯去桂服之總之不問輕重悉以清熱
安胎爲主更有孕婦出痘正當盛時忽臨正產者勢必氣
血俱虛亦只以十全大補湯大補氣血爲主虛寒者少加
熟附若腹中微痛者此惡路未盡也宜四物湯加乾薑桂

心木香黑荳用熟地黃而去芍藥蓋恐寒涼有傷生氣然
有當用者酒炒用之若寒戰咬牙腹脹不渴而足冷身熱
者此乃脾胃內虛外作假熱也宜參耆歸附木香之類一
二劑而愈者吉不愈者凶若孕婦肥胖者則氣居於表而
歉於內也人參可多黃芪宜少多加帶鼓縮砂切忌脫蒂
菓子之類至有痘將收靨忽作泄瀉口渴飲水小便短少
其痘胖壯紅潤者此內熱也宜用五苓散內加黃芩芍藥
之類若至滑泄不止食少腹脹而足冷痘色灰白脉細無
力者此犯五虛必死之症也

一凡方產之後或半月左右適逢出痘者此無胎孕繫累
惟氣血尙虛治宜大補榮衛爲主若痘出多者則加連翹
粘子之類大便自利者則用肉果炮薑之類餘卽照常一
例而治不必多疑反生他誤至於孕婦出痘在於初出之
時胎落者則血氣雖爲大虛然熱毒亦因走泄兼之未經
起脹灌漿則血氣未曾外耗倘痘非險逆加以大補托裏
每多可生至於收靨之時胎落者則毒已出表消散亦多
無事但重虛而元氣易脫倍宜補益耳若正當起脹灌漿
而胎落者則氣血衰敗內外兩虛旣不能逐毒以外出則

毒必乘虛而內攻爲不救者多矣

婦女瘡疹證治歌括

女人疹痘最難醫陰血時常有口虧待得疹瘡將發日只
愁天癸又當期發熱經行非正時火邪迫血血奔馳急須涼血停爲美莫
待中虛悔却遲發熱期逢經水行毒邪得解免煩蒸過期不止須當慮補
氣溫經令出勻發熱適逢經水斷血室空虛防他變若然謫妄神不清熱
入血室治勿緩女子居經日已餘豈堪瘡疹病來加却愁血海停污垢更
怕胞門伏毒邪崩漏無時血已枯瀉而不滿臟中虛豈堪當此天行病濟
弱扶危救弱軀起發成膿忽動經血虛氣弱事堪驚食多氣壯無他慮不
爾須防陷伏臨

馬氏婦人
婦人瘡疹證治歌括

發熱而多汗者水瀉血室空也則變汗無常矣此不背精
陰虛證今出已
發熱而多汗者水瀉血室空也則變汗無常矣此不背精
者中氣壯故也
發熱而多汗者水瀉血室空也則變汗無常矣此不背精
發熱而多汗者水瀉血室空也則變汗無常矣此不背精
發熱而多汗者水瀉血室空也則變汗無常矣此不背精

乘風而內文爲不殊者矣矣

馮氏錦囊秘錄痘疹全集卷十三

麻疹

男 乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人羅如桂丹臣全較

男 乾泰坦公

麻疹碎金賦

疹屬君火氣本少陰傳於其子分故爲脾胃之證乘於其妻兮現乎皮毛之分亦胎毒之所發因疫癘而後成咳嗽噴嚏兮辛金煉於丁火頓悶淚出兮君主御乎將軍迎而奪之兮其鋒易挫隨而擊之兮其銳難勝如折勾萌兮斧

馮氏錦囊秘錄麻疹卷十三

麻疹碎金賦

斤不用。苟待燎原兮。玉石俱焚。其色如班兮。摸之有迹。其形似痘兮。視之無津。朝出暮收兮。發之於陽。暮出朝收兮。發之於陰。變化莫測。出沒靡定。大抵愛赤而惡黑。治者喜涼而忌溫。赤如點朱兮。光明彰顯之象。黑如灑墨兮。火鬱黧昧之甚。制以酸涼兮。收炎光於麗澤。投以辛熱兮。縱赫曦於重明。○痘欲盡發而不留。疹欲盡出而無病。或邪氣之鬱遏兮。留而不去。或正氣之損傷兮。困而未伸。毒歸五臟。變有四證。毒歸脾胃兮。泄瀉不止。而變利。毒歸心肝兮。煩熱不退。而發驚。咳嗽久而血出兮。毒歸於肺。牙齒爛而

疳蝕兮。毒歸於腎。輕者從刺。以嚮善。平之有功。重者拒敵。
而肆惡。攻之不勝。牙若脫落兮。崩砂之狀。可畏。聲若啞。頃
兮。狐惑之證。難明。○應出不出兮。發之須曉。應收不收兮。
解之應明。色淡白兮。爲虛。宜溫養。血色紫黑兮。血熱。宜化
毒。清發不出而煩躁兮。虞不能臘。黑不變而譫妄兮。食不
及。薪熱蒸蒸兮。色赤。痢滴滴兮。氣腥。羸瘦骨肉之脫。瘰癧
神識之昏。喘急兮。胸高肩聳。疳爛兮。漏腮缺唇。休誇三世
之妙手。難留一息之遊魂。○豈不聞誤服湯丸兮。不如勿
藥。又不見特犯禁忌兮。可以自省。愛喫鹹酸兮。咳嗽連綿。

而未已喜啖辛燥。今火熱燔灼而不寧。甘甜過而齒齟。生
冷多而糞清。雞則生風之畜。魚則動火之鱗。雞魚貪而亂
食。風火併而啟釁。邪反滋甚。今爲班疹而不息。毒反深入。
今值疫癘而再經。斯則疹之遺毒。亦若痘之餘證。

金鏡賦

麻雖胎毒。多帶時行。氣候暄熱。傳染而成。發也與痘相類。
變也比痘匪輕。先起於陽。後歸於陰。毒盛於脾。熱流於心。
臟腑之傷。肺則尤甚。始終之變。腎則無症。初則發熱。有類
傷寒。眼胞困倦。而難起。鼻流清涕。而不乾。咳嗽少食。煩渴。