

亥 23

3748

馮氏錦囊秘錄

卷七
元



卷七 方脉心脾病合参 方脉胸脇病合参

方脉肩背臂痛合参 方脉腰痛合参

腹中水鳴 附腹中畏寒 腹中霍乱 小腹痛

方脉厥症合参 附麻木 方脉轉筋合参

方脉六鬱合参 方脉氣滯合参

腹痛大小總論合参 附腹中諸病

方脉疝病合参

方脉痿痹合参

馮氏錦囊秘錄

卷七 元



南京中医药大学图书馆版权所有

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷七

烜 謙益恭存

海藍馬兆張楚瞻甫纂輯 門人孫顯達惟良仝輯

男 乾元龍丑

方脉心脾病合參

真心痛者手足青至節。旦發夕死。夕發旦死。寒邪傷其君主也。蓋心爲君主。義不受邪。受邪則本經自病。必死不治。今之治例。皆言胞絡受邪。在府不在藏。在絡不在經。而非真心痛也。以其在心之部位而名。或心之脉絡。或手心主之脉絡。或胃脘。或胸膈。或食傷。或寒傷。或氣逆。或痰飲。或



南京中医药大学图书馆版权所有

死血。或蟲。或由火。皆致痛也。蓋胃屬濕土。列處中焦。爲水穀之海。五藏六腑十二經脉皆受氣於此。壯者邪不能干。弱者着而爲病。其冲和之氣變至偏寒偏熱。因之水停滯。積皆與真氣相補而痛。惟肝木之相乘者爲尤甚。腎氣上逆者。次之。胃病者。腹脹。胃脘當心而痛。上支兩脇咽膈不通。蓋胃脘逼近於心。移其邪而易得攻害也。

脉經曰。有憂愁思慮傷心而痛者。其人勞倦。卽頭面赤而下重。心中痛。徹背其脉弦。此心藏傷所致也。蓋心主血而統性情。因於怵惕思慮。湯神涸血。於是清陽不升。濁陰不降。以致食飲風冷熱悸蟲症之九種。乘虛侵凌也。

蟲痛者發作懊懣腫聚往來上下行痛痛有休作心腹中
熱善渴涎出而色乍青乍白乍赤嘔吐清水者虵也
大虛心痛者宜補之如大實心痛者當食受惱卒然發痛
大便或秘久而心胸高起按之至痛不能飲食宜利之
寒厥心痛者手足逆而遍身冷汗便溺清白大便秘利不
渴氣微力弱急以朮附湯溫之寒風暴痛非久病也朝發
暮死急當救之是知久病無寒暴病非熱也
夫心痛有九種曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰
曰去來痛者除風熱冷屬外所因餘皆不內外因更婦人
惡血入心脾經發作疼痛七甚於諸痛更有卒中客忤鬼



擊尸症。使人心痛。亦屬不內外因。以意推治。施治。

心膈之痛。須分新久。若明知身受寒氣。口食寒物而病。於初得之時。當用溫散。或溫利之。其病得之稍久。則感鬱矣。鬱則蒸熱生火。若再欲溫散溫利。寧無助火添病。即故古方多以山楂爲君。加熱藥爲嚮導。而開鬱行氣。則邪易伏。病易退。然向安之後。若縱恣口吐。病復作。

大槩皆以諸痛屬實。痛無補法。痛隨利減。爲不易之法。不知形實病實。便閉不通者。乃爲相宜。若形虛脉弱。食少便泄者。豈容溫治。須知痛而脹閉者。多實。不脹不閉者。多虛。拒按者。爲實。可按者。爲虛。痛不移者。爲血痛。無定者。爲氣。

喜寒者多實愛熱者多虛飽則甚者多實饑則甚者多虛
脉實氣粗者多實脉虛氣少者多虛新病年壯者多實
病年衰者多虛補而不效者多實攻而愈劇者多虛
經者脉多弦大痛在藏者脉多沉微表虛而痛者陽不足
也非溫經不可裏虛而痛者陰不足也非養榮不可
而脾傷也非補中不可不虛而脾腎敗也非溫神命門不
可若泥痛無補法爲害不淺

食積與痰飲作痛者胃氣亦藉所養故卒不便虛日數雖
多不食無損若痛止便喫物痛必復作須三五服藥後以
漸將息可也痛甚者脉必伏用溫藥附子之類不可用

參、朮、益、諸、痛、不、可、補、氣。一、胃、中、有、熱、而、作、痛、者、井、山、梔、子、
不、可、須、佐、以、薑、汁。多、用、台、芎、開、之。一、有、因、平、日、喜、食、熱、物、
以、致、死、血、留、於、胃、口、作、痛、者、必、日、輕、夜、重。甚、則、用、桃、仁、承、
氣、湯、下、之。輕、則、用、韭、汁、消、其、血。桔、梗、開、提、其、氣。
面、上、白、瘰、唇、紅、時、吐、清、水。痛、定、便、能、食。時、作、時、止。有、塊、往、
來、吐、下、行、者、是、也。治、以、苦、練、根、錫、灰、之、類。然、上、半、月、蟲、頭、
向、上、易、治。下、半、月、蟲、頭、向、下、難、治。凡、服、藥、先、以、肉、汁、及、糖、
蜜、食、下。引、蟲、頭、向、上。然、後、用、藥、打、出。脉、堅、實、不、大、便、者、
下、之。心、痛、用、山、梔、子、并、切、藥、止、之。若、又、復、發、可、用、玄、明、
粉、一、服、立、止。左、手、脉、數、熱、多、脉、濡、者、有、死、血。右、手、脉、

緊實痰積弦大必是久病有脾痛大小便不通者此是

痰隔中焦氣聚下焦心痛者脉必伏以心主脉不勝

痛故伏也不可因其脉伏神亂疑爲心虛而用地黃白

補之蓋邪得溫則散泥則不散溫散之後可用陰陽平補

中宮氣不清則痛有挾痰與火或日久成積古方用陳

皮香附甘草爲君因所挾而兼用一加海粉火加梔子穉

加醋蓬朮死血加乾漆胃中若有清痰留飲腹中漉漉

有聲及手足寒痛或腰膝脊脇抽痛惡心煩悶時吐黃水

甚則搖之作水聲用小胃丹或控涎丹徹去病根而止

丹溪曰草豆蔻一味性溫能散滯氣利膈上痰若果因寒

馬氏帝憂必錄雜症卷七方脉心脾病合參



而痛者用之如鼓應桴若濕鬱結痰成痛服之多效若因熱鬱而痛者理固不可但以涼藥兼之如炒芩連枝之類其效猶捷東垣草豆蔻丸治寒厥心痛大獲奇效若久熱鬱熱已甚者諸香燥藥斷不可用也

本附湯 治寒厥暴痛脉微氣弱

甘草 炙一兩 白朮 四兩 附子 一兩 五錢 每用五錢薑棗水煎服

一方 治心痛用荔枝核燒存性爲末醋湯下二錢

丹溪方 痰飲停積胃脘作痛

螺螄殼 墻上年滑石 蒼朮 山梔 香附

南星 各二兩 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁 各一兩



右末生薑汁浸麵糊爲丸、萊豆大、每三四下、薑湯下。

春加川芎、夏加黃連、冬加吳茱萸。

又方、治痰厥心痛、用半夏、油少爲末、每服二錢、薑湯下。

丹煥方、治死血胃脘痛者。

玄胡索一兩、五錢、桂、滑石、紅花、紅麵各五錢、桃仁箇。

爲末、湯浸麵糊爲丸。

又方、神治心痛。

香附子、高良薑、各等分、爲末、自湯調服二錢。

丹溪方、治火痛。

黃連、山梔炒各二錢、陳皮、茯苓各一錢五分、半夏一錢。

方解、心脾病諸方。



草豆蔻分七甘草分四

薑水煎食前服

失笑散

有心痛百藥不效、用此而愈、

五靈脂

蒲黃 等分爲細末、醋訓二錢熬成膏、

一盞食前溫服、有瘀血作痛加玄胡沒藥、

乾漆丸

治九種心痛、腹脇積聚滯氣、

乾漆二兩搗碎、炒去烟細研、醋煮麵糊丸如桐子、入每服十五丸、熱酒下、醋湯亦好、日進二服、

蠶沙散

治男婦心氣痛不可忍、

晚蠶沙不拘多少、滾水泡過濾淨、白湯調服立止、

梅硫丸

酸熱以收散寒、如服辛劑反甚、改服酸劑立愈、



北京中医药大学图书馆版权所有

水梅一箇生硫黃

為末搗勻可丸為度作一九白

湯下立愈病不再作

濟世方 治心痛用菴草搗汁醋汁相和服立效

人服此吐蟲二條終身不發

綠礬止痛方 用綠礬七八分好酒化下再不發

衍義方 治心痛用銅青一味淡醋湯些小服之

手拈散 治心痛最妙括曰草菓立胡索靈脂并沒藥酒

調二三錢一似手拈却

化蟲丸

鶴風 檳榔 胡粉炒 苦練根去厚皮各五十兩 白凡飛主二兩



北京中医药大学图书馆版权所有

為末、麵糊九、桐子大、凡小兒蟲痛、一、成五、九、溫水入、漆油一點、打勻下之、米飲亦得其蟲自下、

燒脾散

治飲啖生冷果菜、停留中焦、心脾冷痛、

乾薑

炮薑

厚朴

炒薑

草果仁

縮砂仁

甘草

炙

神麴

炒

麥蘖

陳皮

高良薑

炙各等分

為末、每服三錢、熱鹽湯點服、

一方

用胡椒四十九粒、乳香一錢為末、男用薑湯下、女

用當歸湯下、

錦囊心痛神方

用燒鐵浮起白沫、

婦枯一

研極細白湯

調服二分、不愈再一服、永不再發、



北京中醫藥大學圖書館版權所有

扶陽助胃湯

治寒客賜胃、胃脫當心而痛得熱則已

乾薑

炮一錢五分

揀參

草豆蔻

甘草

炙官桂

白芍

陳皮

白朮

各一錢

附子

炮吳茱萸

益智

各五分

薑棗水煎溫服

一方

用枯凡為末、蜜丸、欠實大、每服一丸、空心細嚼、淡

薑湯下、若有蟲者、苦參煎湯下、益白礬、有去熱涎之功

愈痛散

治急心、疼胃疼

五靈脂

去沙石

玄胡索

去皮

蓬莪朮

煨

當歸

良薑

炒各等分

為末、每服三錢、熱醋湯調服

檳榔散

治男婦心脾痛

馬氏

方脈



北京中醫藥大學圖書館版權所有

五靈脂

檳榔

各等分

爲末每服三錢隔夜先將猪肉

鹽醬煮熟令患人細嚼吐出以引蟲頭向上然後煎薑
薄湯調藥服之以殺蟲也

方脉胸脇病合參

經曰南風生於夏病在心喻在胸脇此以胸屬心也肝虛
則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側此又以胸屬肝也
夫胸中實肺家之分野其言心者以心之脉從心系却上
肺也其言肝者以肝之脉貫膈上注肺也然胸痛卽膈痛
其與心痛別者心痛在其骨陷處胸痛則橫滿於胸中兩
脇間也其與胃脘痛別者胃脘痛在心之下胸痛在心之



上也

素問曰胸痛少氣者水氣在藏府也水者陰氣也陰氣在中故胸痛少氣也是以胸中陽氣如離照當空曠然無物也設地氣一上則窒塞有加故濁氣在上則生脹脹胸中者陰氣上逆之候也仲景微則用薤白白酒以益其陽甚則用附子乾薑以消其陰世一不知胸痺為何病習用豆蔻木香三棱神麴等藥坐耗其胸中之陽益增其困矣有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木得以乘其土位而為胃脘當心而痛上攻兩脇膈噎不通其脉沉弦者宜歸脾湯加白芍以薤棗為引煎服