

醫門法律

卷肆

共八卷

四卷三氣門方目

附燥門方目

一括萎根桂枝湯有論

二葛根湯有論

三大承氣湯有論
已上三方俱金匱

四麻黃加獨活防風湯

五神朮湯

六白朮湯

七白朮加藥法

八桂枝葛根湯

九桂枝加川芎防風湯

醫門法律
十柴胡加防風湯

十一防風當歸湯

十二八物白朮散

十三桂枝加芍藥防風防已湯

十四附子散

十五桂心白朮湯

十六附子防風散

已上十二方俱
海藏治痙病方

十七羚羊角散

十八麥門冬散

十九石膏散

二十牛黃散

二十一愈風湯

海藏

二十二人參瀉肺湯

二十三天門冬散

二十四半夏湯

二十五赤茯苓湯

二十六龍腦雞蘇丸

二十七利膈散

二十八地黃煎

二十九碧雪

三十消毒犀角飲

三十一四物二連湯

三十二四順清涼飲子

三十三牛黃膏
已上治熱病方

三十四麻黃白朮湯
有論

三十五桂枝附子湯

三十六白朮附子湯

三十七甘草附子湯

三十八麻黃杏子薏苡甘草湯

三十九防己黃芪湯
有論
已上六方俱金匱

四十和劑五積散

四十一活人敗毒散

四十二清熱滲濕湯

四十三二朮四苓湯

四十四桂苓甘露飲

四十五羌活勝濕湯

四十六續隨子丸

四十七除濕湯

四十八白朮酒已上治濕病方

四十九白虎加人參湯

五十瓜蒂湯

二方合論
二方金匱

五十一清暑

益元湯

五十二人參

益氣湯

二方俱東垣

五十三生脈散

五十四竹葉

石膏湯

五十五黃芪

人參湯

五十六香薷飲

五十七五物

香薷飲

五十八黃連

香薷飲

五十九十味

香薷飲

六十桂苓甘露飲

宣明

六十一桂苓甘露飲

子和

六十二桂苓丸

六十三五苓散

六十四辰五苓散

六十五益元散

六十六通苓散

六十七三黃石膏湯

六十八白虎加蒼朮湯

六十九六和湯

七十却暑散

七十一消暑丸

七十二枇杷葉散

七十三潑火散

七十四香薷丸

七十五酒煮黃連丸

七十六水葫蘆丸

七十七縮脾飲

七十八大順散

七十九冷香飲子

八十大黃龍丸 已上治暑病

秋燥明方目

一滋燥養榮湯

二大補地黃丸

三潤腸丸 東垣

四導滯通幽丸 東垣

五清涼飲子

六大秦芫湯

七元戎四物湯

八大補丸 丹溪

九六味地黃丸

十局方當歸補血湯

十一神功丸

子和

十二楊氏秦芫扶羸湯

十三杏仁煎丸

十四杏仁膏

十五阿膠散

十六皺肺丸

十七自製清燥救肺湯

醫門法律卷之四

西昌喻 昌嘉言父著

黎川陳守誠伯常重梓

熱濕暑三氣門

法二十五條
律十一條

論三篇

六氣。春主厥陰風木。秋主陽明燥金。冬主太陽寒水。各行其政。惟春分以後。秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰濕土。三氣合行其事。是故天本熱也。而益以日之暑。日本烈也。而載以地之濕。三氣交動。時分時合。其分也。以風動於中。勝濕解蒸。不覺其苦。其合也。天之熱氣下。地之濕氣上。人在氣交之

中受其炎蒸無隙可避。多有體倦神昏。肌膚癩起。胸膈痞出。頭面癰生者矣。甚則消渴癰疽。吐瀉瘧痢。又無所不病矣。其不能澹泊滋味。屏逐聲色者。且以濕熱預傷金水二臟。爲秋冬發病之根。故病之繁而且苛者。莫如夏月爲最。夫天氣無形之熱。與地氣有形之濕交合。而大生廣生之機益彰。然殺機每伏於生機之內。所稱移星易宿。龍蛇起陸者。卽於夏月見之。人身亦然。內經運氣主病。凡屬少陰君火。卽與太陰濕土一類同推。不分彼此。而太陰司天。濕淫所勝。平以苦熱。佐以酸辛。以苦燥。

之以淡泄之。治濕之法則然矣。下文卽出治熱之法云。濕上甚而熱。治以苦溫。佐以甘辛。以汗爲故而止。可見濕淫而至於上甚卽爲熱淫。其人之汗必爲濕熱所鬱而不能外泄。故不更治其濕。但令汗出。如其故。常斯熱從汗散。其上甚之濕卽隨之俱散耳。觀於內經。濕熱二氣合推。卽以得汗互解。妙義彰彰矣。

仲景以瘧病濕病。暍病。其爲太陽經外感之候者。合而名篇。蓋瘧爲熱病之最惡者。而要皆爲濕熱之所釀。正從三氣交動中。會其微旨也。然三氣雜病。

非傷寒之比者。曷可枚舉。但有一端。爲時令所乘。卽當推三氣主病。何有何無。孰淺孰深。以求確然之治。如當風冒濕。飲醇啖博。精津素虧。熱毒內蘊。濕邪久着之體。發爲瘡瘍。瘡痢。黃痺。腫滿。消渴。痿厥之病。既有濕熱多寡之不同。又有氣血虛實之各異。向非深入軒岐仲景堂奧。而取途於諸家之狹隘。所稱活人手眼。果安在哉。故會三氣交病之義。以審脉辨證。用方。其於濕熱之孰多孰少。治瘡之從上從下。補救之先陰先陽。纖悉畢貫矣。不遵聖法。而欲免過差。其可得乎。

金匱論瘧病。於風木主事之時。蚤已申不可汗下之戒云。夫風病下之則瘧復發。汗必拘急。見風與熱合而生病。風則內應肝而主筋。熱則內應心而主脉。妄下損陰則筋失養而成瘧。妄汗損陽則脉失養而拘急矣。至濕暍所釀之瘧。其不可汗下之意。則爲少變。維時陽氣在外。旣屢以發汗爲戒。及遇無汗之剛。瘧又不得不用葛根湯。取其微汗。至於下法。全不示戒。且云可與大承氣湯。其意甚微。見身內之陰爲外熱所耗。容有不得不下之證。但十中不得一二。終非可訓之定法。畧舉其端。聽用者

之裁酌耳。然亦見風寒之邪中人不可妄用苦寒。
濕熱之邪中人不可妄用辛溫矣。

論金匱治瘧用括蕒根桂枝湯方○

本文云。太陽病。其證備。身體強。几几然。脉反沉遲。
此爲瘧。括蕒根桂枝湯主之。傷寒方中。治項背几
几。用桂枝加葛根湯矣。此因時令不同。故方亦少
變。彼之汗出惡風。其邪在表。而此之太陽證。罔不
具備。其邪之亦在於表。可知也。但以脉之沉遲。知
其在表之邪。爲內濕所持。而不解。卽係濕熱二邪
交合。不當從風寒之表法起見。故不用葛根之發