

是乃仁術醫方集

四

责任编辑 王庆福

图书在版编目 (CIP) 数据

是乃仁术医方集 / (清) 糜世俊编; (清) 皓山氏增补. - 北京: 中医古籍出版社, 2001.1

(中医古籍孤本大全/中医古籍孤本大全选编工作委员会选编)

ISBN 7-80013-952-2

I. 中… II. ①糜… ②皓… III. 中国医药学-古籍-汇编
IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54223 号

是乃仁术医方集

清·糜世俊 编

(《中医古籍孤本大全》)

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

金坛市古籍精装印务有限公司 印刷

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 001~200 册

ISBN 7-80013-952-2/R·948

定价: 460.00 元

婦人科

保命勝金丹

此丹能補虛益精種子百發百中兼治男

婦諸虛百損女子胎前產後血枯經閉崩漏赤白帶下男子遺

精白濁腰痛腿酸精寒陽痿咳嗽痰喘耳鳴眼花等症

南香附

次一觔第一一次量浸第二二次酒浸第三次鹽水浸第四

官棟參

川當歸赤芍白芍香白芷川芎延胡索

遠志

去心白朮各一兩桂心白茯苓丹皮川牛膝各二兩

大熟地

酒洗蒸白燕四兩去蘆大甘草七寸五分蒙本三兩

古除香附

另製外其十七味俱用煮酒亦按春三夏三秋七冬

十日浸過晒乾為末聽用後加

赤石脂

白石脂

各一兩

此二味用好醋過三日入火煨紅再淬入醋內如此七次煨乾
為末和入藥內滴乳香明沒藥各一真琥珀五硃砂五通
右四味用煮酒細研成膏和入前藥內煉蜜拌丸如龍眼大以
金箔為衣曬乾入磁罐收貯封固聽用凡修合此丸須擇壬
寅壬申日虔誠製造勿令婦女雞犬一切不潔淨人見之為妙
赤石脂 琥珀 乳香 沒藥 硃砂 此六味婦人不可用
服藥法 凡男婦遇諸症取藥一丸放在磁碗內入煮酒半碗蒸
服若女入胎前產後月子諸病用滾水小半碗將藥手捻碎入
碗內用碟蓋上泡開如水冷將碗放鍋內慢火蒸熟取出碗以
銀匙研細服之如月子病用些酒醋滴在藥內服之若碗內藥

未淨再用酒滌之飲盡令其半醉服後少坐片時待身覺困倦
可卧用衣被蓋暖使出汗則遍身暢快有病遂消如女人經至
而腹痛時服此一丸則下月即不作痛如行經三日前依法連
服三日任其久不生育雖老必成孕百發百中並無一空然淨
從第三日服藥交媾一定生男六日交媾則生女矣須當謹記
莫致差錯可也

四物湯 治婦人有孕卒然見血胎欲墜落腰疼其重之症

赤芍

當歸

各一兩

熟地

一兩五錢

川芎

二兩

共為細末每服三錢阿膠慈艾煎湯調服

催生奪命丹

治臨產胎不順者或橫或倒或數日不下

母丁香末二錢 乳香 沒藥 各一 麝香 五錢 共為細末 不用臘月

初八日 元腦合丸 雞頭子 大硃砂 為衣 每服一丸 冬月熱酒夏

黑神散 治婦人產後敗血致諸疾者 臨產亦宜用之

當歸 熟地 白芍 酒炒 肉桂 去皮 沉香 蒲黃 炒黑 沒藥

搜灰 赤芍 各一 乳香 三錢 血竭 五錢 炙甘草 一兩 共研細末

每服二小匙 產後十八症俱用 童便和煮酒調服 神效

黑神丸 治產後一切病症 俱用四物湯送下一丸

仙方濟世黑神丸 京墨一兩 用水研 一錢二分 飛羅麵

天麻細末 秤二錢 佛面赤金 須五貼 二錢 百草霜 再研

共合為丸 四十粒 產婦一粒 保安痊

烏金丸

治產後血迷瘀血上攻兩脇脹滿胃脘疼痛大小便不

通發熱作喘大渴飲涼見鬼神惡露去早不行但服之立效

乳香

沒藥

歸尾

各一

百草霜

二

已

三

右

為

細末煉

竇丸

如黃豆大硃砂為衣每服一丸用煮酒四日生薑一片煎

數沸將藥研化服之從食紅素三五枚如不吃素則吐亦無妨

烏金散

治產後血迷氣敗餘血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭眩

血竭

百草霜

血餘

燒存性

當歸

肉桂

去粗

鯉魚鱗

炒黃

末

真京墨

延胡索

各

等

石研極細末

每服二

分

溫黃酒調服

益母丸

七月七日採益母草連根葉花標採來將花葉另放一處揀用

刀切斷入鍋內水煮無青色將梗渣撈出不用即將花葉放湯
內煮熟撈起晒乾研末將此汁澄去泥脚就將末放入汁內量
有十觔對無灰酒重便各五觔用文武火煮三炷香為度用荆
條篩子一箇上攤豆腐濾子一塊放在大磁盆上將藥攤平上
再用荆條橫豎架住再將布四圍蓋之勿令藥沾布上俟澄下
水去又對重便煮酒各三觔將篩中之藥倒在蒸籠內蒸一炷
香如此七次蒸完連汁並藥盡入鍋內以文火炒用竹板鏟勻
炒乾不粘布單起出晒乾為末細羅：過煉蜜為丸藥蜜對均
勿令輕重每丸重二小照症隨引送下

如胎前產後臍腹刺痛或作聲胎動不安下血不止嚕嚕湯下

胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹悶心滿心痛炒鹽下湯
中風牙關緊急半身不遂失音不語惡露不盡結滯刺痛上衝
心胸滿悶童便合黃酒化下

兩太陽穴脹痛呵欠心忪氣短瘦弱不思飲食血氣身熱手足
頑麻遍體骨節疼痛水瀉赤白痢疾血山崩漏糯米湯化下
血暈眼黑頭疼內熱口乾作渴如見鬼神狂言亂語不省人事

薄荷湯或黃酒化下

瘀血不散結成血塊臍腹疼痛煩悶時發寒熱或有冷汗或未
滿月氣血閉塞不順咳嗽氣喘胸膈不利惡心吐酸面目浮腫
兩脇疼痛鼻衄舌黑口乾四肢無力經脈不調自汗發熱骨蒸

作腫及婦人久不孕育俱用黃酒化下

大小便不通煩燥口苦面垢顏赤五心煩熱薄荷湯化下

赤白帶下艾湯化或鴻血水棗湯化生產前後以黃酒化下

活血紫金丹 治婦人經脉不通腹內成塊遍身發熱並治心疼

歸尾 巴豆各去皮油 五靈脂 代赭石次各一 醋淬七 共為細末

醋糊為丸如棗豆大每服五七丸紅花湯送下 心疼艾醋下

一婦人懷孕須用安胎之法少生氣惱戒慎勞碌則胎元無傷再

少進保胎之劑自然無事稍有不妥即服四物湯加

白芍 黃芩酒炒 二味水煎服

一孕婦懷胎三箇月因氣所觸致傷胎元腹內少痛覺胎微動當

服四物湯加 桑葉 水煎服 服後復作痛 四物湯送紫金丹
 一 孕婦三四個月或因氣怒或登高騎馬失脚墜落傷折胎動用
 四物湯加 艾葉 大麥 水煎服
 一 孕婦四五箇月勿食傷胎之物若誤食之並氣怒傷胎腰疼腹
 痛見血者煎四物湯送 烏金散 打下惡物效
 一 孕婦六七箇月偶有所傷腹痛不安或從高墜下觸動胎元痛
 不可忍或見血露或惡心嘔吐即服安胎飲四物湯內加
 白朮 條芩 陳皮 紫蘇 砂仁 水煎服如胎安不住服即
 烏金散 黑神丸 如再不應胎不下服奪命丹
 一 孕婦七八箇月身體面目四肢浮腫用 烏金丸 丁香薤下湯

取下惡物後臍腹痛用四物湯補之加 烏金散 艾葉煎湯服

一產前小便澀少惡血阻隔不通服 烏金散

一產前小便淋瀝不通上下不和嘔吐惡心小腹脹滿服烏金丸

一產前卒然不得小便此是胎逼尿胞用 葱白搗膏貼臍上或

用白環肉搗膏亦可同葱白搗用亦可

一胎漏下血不止或心腹脹滿用 當歸 川芎 冬五水黃酒煎入童便服

一若因母病而胎動但治其母惟用 當歸 川芎 益母草

右三味煎湯送烏金散 若因胎動而母病者急當安胎用

芎藭 黃芩 益母草 右三味煎湯送黑神丸須認輕者轉

動不安重者心致傷墜若面赤舌青是兇已死面青舌赤是母

死唇舌俱青兩邊沫出子母俱死速進奪命丹

一產前身體黃腫癰痲涎潮搐目吊口喎中風頭項強直徑脉

拘急語言蹇澀不省人事者服黑神丸烏金散

一胎氣不和心胃脹滿疼痛或臨產驚恐氣結者服烏金丸或服

一胎腹中已死或橫倒或產生不下急用單麻仁粒十九麝香五

已豆仁粒十九共搗如泥攤貼臍下丹田穴隨時就下即去其藥

一少有不應即服紫金丹烏金丸或先服藥後貼臍亦妙

一產前頭疼咳嗽用蛇脫燒灰入黃酒內送烏金丸

一難產者血塞子宮門也即用烏金散黑神丸用煎湯送下

一臨產之婦不可坐卧只宜行動不可用力太早臨產之時先服

烏金散

黑神丸

用黃酒送下

一婦人月子後受風四肢攣拳名為雞爪風痛牽遍身不時發者

兩腿膝蓋旁有鬼眼穴各灸三壯即愈

一產前崩漏用槐子煎湯送烏金散

治胎衣不下方

皮硝一子用童便黃酒煎滾調服即下

治產後大熱不能着衣蓋被方

用猪苦膽一箇生飲其汁即愈

霹靂散治血山崩漏徑行不止之症

黃芩炒荆芥炒右研細末各二寸黃酒四升同盛碗內先將銅

秤錘一箇用桑木炭燒通紅淬入藥碗內酒滾乘熱服之即效

治產後腹脹閉結膨悶氣急坐臥不安方

大麦芽炒為細末用陳醋一合調服立效

治產後血暈迷悶方

五靈脂

半生炒

為末每服三小滾水調下如口閉稍開灌之

治產後症方

產後面白乃惡血下多氣脫之故目閉不開

人參一日

煎湯灌之將手插入中眉心即回神效

又方 產後面紫乃惡血上冲氣壅故目閉不開

山查

一月炒

童便煎服 再用韭菜搗爛裝入有嘴瓶內煎

滾醋冲入急包其口將嘴薰二鼻孔手插入中穴即效

治產後面黑方 此係惡血入肺發喘欲死

人參五不為末 蘓木一斗槌碎 用水三鍾先煎蘓木至一鍾

去渣調入人參末內服之神效

治產後肉線下垂方 乃產時用力太過垂出肉線痛徹心脾

老姜三觔連皮搗爛 入芝麻油二觔 先以熟絹盛起納近產戶乃以絹

袋盛姜就近薰之冷則更換漸次循進也重者須一二日方愈

治產後要方 新產後不問有無病症即宜服此

童便一鍾 陳醋半鍾 合而溫服則百病不生甚驗

治產後昏暈方

急將亂髮浸陳醋燒於床前三盞即溫服童便一碗可保無虞

治生產諸病方

治產後惡血攻心語言顛倒健忘失志及打撲損傷一切敗血為病服此殊效

血竭

沒藥

各等分

共為末

每服二

子

童便酒

各半

鍾調和

溫

服其惡血即下行而愈

其酒必用上好陳酒方妙

治產後血崩大下不止方

蒲黃

妙黑為末

每服二

子

用川

芎

當歸

各二

子

煎湯調服即

止此藥治身體無汗手足不冷者乃血欲脫而氣未脫也當服

之若汗大出手足冷而無神氣眼欲閉者身倦無力口鼻氣淺

者氣欲脫也不用前方只用

人參

五

子

煎湯熱服即止

治產後血暈方

產後血暈心眼閉塞痛手及腰四肢攣攣又治中風口喎不能服藥灌入鼻中其效如神

荆芥穗

微炒

為末

每服三

子

童便一

鍾煮酒

少許

調下或煎服