

吳門治驗錄

即泉顧曉瀾著
卷二



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

吳門治驗錄卷二

目錄

常方伯第
二郎 格陽症

常方伯第
三娘 崇附如狂

宋馬路上時邪虛脫

金十全街筋惕瘦麻

袁湖州怔忡健忘

費望信橋左偏枯

朱西滙半身不遂

鄭平將坊半偏麻木

唐廟堂巷精滑不禁

江馬路上耳後腫痛

朱休寧血冒

沈禪興寺心腎不交

卜三擺渡營虛火鬱

楊常州五更洩瀉



南京中医药大学图书馆版权所有
161

伍 常州

休息痢

桑 望信橋

鬱怒腹脹

楊 間門外

目紅珠痛

卜 三擺渡

水輪見星

俞 都亭橋

目紅痠痛

胡 十全街

耳瘡

王 通和坊

卒然厥中

姚

手足痺痛

陸 陳墓

周身痺痛

陳 小市橋

四肢痺痛

金 大井巷

周身痛痺

汪 山塘

咽痛聲嘔

程 十全街

寒熱鼻衄

張 中市

乾噙頭眩

吳門治驗錄卷二

徐玉書作梅氏

如皋顧金壽曉瀾甫著

門人黃

鶴雲客氏

沈

可舟氏

全較

男

慶鴻吉人氏

常六世兄

方伯第二郎

面紅目赤身熱不揚嘔語欲狂瘲癓不定七日眼不能合足冷舌白而滑小便涓滴俱無服清暑涼劑煩躁愈增汗不能出脈象浮洪重按不能應指此盛暑房後貪涼所致已現拒陽症象恐其陽越而脫急用溫下托汗



法。

大熟地

一兩
炒枯

炒黑乾薑

三錢

製附子

一錢五分

炒牛膝

一錢五分

茯神

三錢

車前子

一錢五分

和入童便一小杯冰水調勻涼服

又 昨服理陰煎加減至二鼓竟得安睡周身微汗神智

少清。自述頭痛如烙口渴索飲身體熾熱胸悶兼脹脉形已歛右關獨見洪實舌苔黃厚而乾此陰寒既去暑濕夾食之症已現急用涼膈散加減。

連翹

三錢

生軍

三錢

炒梔子

三錢

黃芩一錢五分 生石膏五錢 枳實一錢

枳榔二錢

飛滑石三錢

生甘草五分

薄荷五分

竹葉十片

二劑先服一劑得便卽止後劑

昨進初劑。脘中微痛氣欲下行。雖未卽便。頭痛身熱頓止。二進後一時許。腹中大痛。二便齊下。多而且暢。胸寬。思食。進粥一孟。倦怠欲睡。晨醒汗出。周遍病已豁然。但覺神弱倦甚。脈平而硬。自應少扶正氣。

人參一錢
另煎冲

大麥冬一錢五分 瓜蔞皮二錢
米炒

炒生地 三錢

白扁豆 三錢

茯苓 三錢

炒薏米 三錢

橘白 五分

炙甘草 五分

五劑後可停煎劑飲食清淡自安。

問此症狀如中暑凶險已極諸醫劑用清涼亦是無伐天和之意今獨以附子理陰得效隨又用涼膈通腑而愈何也曰輕年好內之人盛暑最多陰症彼自恃強壯毫無顧忌日間飲酒食炙胃中濕熱已聚加以入房之後惡熱露宿故見此症又復飲以涼劑正是雪上加霜雖在盛暑脉洪而哭舌白而滑足冷無汗格陽之勢已

現非薑附理陰不可。然佐以童便引之直下。和以水
防其拒格。卽冷香飲子意也。迨陰寒旣消。暑濕夾食之
症方出。北人內燥。若不卽用涼膈掃蕩。又恐邪熱劫津。
致變他症。仍防病重藥輕。二劑繼進。所謂兵貴神速也。
病去旣速。正氣尙不大傷。只須人參養胃。加減調之足
矣。至于甫用理陰。卽改涼膈。似乎自相矛盾。不知隨時
應變。古人此法甚多。余不過依樣葫蘆而已。若徒執而
不變。以自護其兩歧之迹。竟至誤人身命。其罪可勝道。

常尙氏 方伯第三媳

脉象洪搏手足振掉如狂發時目矇聲高口中喇喇大言能知戶外人事移時始定朱符滿壁藥餌亂投毫無應效此肝膽素虛又遭驚恐魂越之症急用加減服蜜煎

人參 七分

大生地 七錢

硃拌茯神 五錢

石菖蒲

五分
硃拌

粉丹皮

一錢五分
天竺黃

一錢

鬼臼 一錢五分

青花龍骨 五錢

石決明 一錢

鹽煮

生鐵落

一

兩 煎湯代水

又服藥三日。狂厥已定。飲食漸進。脈象稍不。仍照前

去鉄落加

醋煅靈慈石 三錢

又病愈十餘日。偶因思歸悲傷。前疾又復大發。脈象乍大乍小。情智時清時昏。病來如狂。病去欲脫。已現正虛。崇附之狀。再用前方送大殺鬼丸四錢。

大殺鬼丸方

虎頭骨 三兩

黎盧 一兩
去蘆

鬼臼 一兩

天雄 一兩

皂角 一兩
去皮子

透明雄黃 一兩

桃木屑 一合
酒浸

右爲細末煉蜜爲丸硃砂金箔爲衣

又 痘退脉平而喫卧不能起粥糜稍進自應大扶正氣
稍佐驅邪爲是仍照前方加

人參一錢

炙黃芪一錢五分 焦於术一錢

煎好仍送大殺鬼丸三錢

丸方

卽照前方加入珍湯爲丸每空心服四錢常服

問此症顯係邪祟諸醫皆不敢下劑惟求祈禳驅逐今
出入服蠻煎而愈何也曰此婦年輕初嫁膽怯心虛偶



遭驚恐。肝火夾風上炎。魂不能藏。飛越于外。故有通
經云邪之所湊。其正必虛。服蠻煎藥雖平淡。能扶正化
邪。用之頗有殊效。惜伊病後。懶于調治。再加鬱怒傷肝。
正虛邪戀。愈發愈重。脈見乍大乍小。所謂祟由虛召也。
卽用大殺鬼丸。仍以服蠻煎送之。俾正扶邪去。自然平
復。若此中少有冤業糾纏。豈草根樹皮所能解脫。往余
視三多橋南某姓。反胃症。服藥頗效。食漸能進。一夜忽
用手自捻其喉。所食皆出自此。水點不能入腹。再診其
脉。見乍大乍小之象。知其正虛崇附。亦欲用大殺鬼丸。

方落筆肘後似有人扳掣者再不覺駭然細詢伊家童
始知此人家以正言觸怒痛遭撻辱七日不食而死尙
未滿年故口中有不使得食等語余素不信邪祟至此
頗覺寒毛凜凜托言症重無方而出後聞其不數日而
逝嗚呼怨毒之與人甚矣哉果報匪遙人可不自知檢
束耶

宋

馬路上

十歲

身熱神倦不語蹠卧奄奄一息不能轉側冷汗時出脈
見虛大雖在幼童已見虛脫之象急宜大補氣血切勿

再治外邪。

上黨參

八錢

大熟地

入錢
炒鬆

蒸於术

一錢五分

白歸身

一錢五分
酒洗

炒白芍

一錢五分

大麥冬

一錢五分

茯神

三錢

北五味

二分

又 服藥後神清氣爽。熱退汗出。索粥頻頻。已能起坐。脉形漸歛。再照前方加龜版。

三錢

又 精神如初。已可出行走。惟出痘時。調治失宜。胸膈背聳。已成損症。丸方仿天真大造。加減。

問此症諸醫束手。咸云欲使回春。非仙丹不可。今藥投

數劑居然起死回生得毋別有秘授耶。曰此子素不以
症氣血本虧偶染時邪治者俱執體屬純陽盡情涼散
故見此狀急用氣血兩調大劑連下究係童年之情未
動故得效神速仍遵內經治病必求其本並非秘授也。
同時有某童脈症無二疑余用補太過仍投清散二日
卽斃相提並論此子亦不幸中之幸矣。

金十全街

右脉虛弦氣分較血分更虧右偏筋惕自頭至足五更
後酸麻尤甚此偏風暗動風能燄血故有口乾目滳右

手足不用等症急宜補氣和血散風庶免偏枯重症

炙黃芪一錢五分焦白朮一錢

桂枝木五分酒炒

當歸鬚一錢五分大白芍一錢

炙甘草五分

防風一錢明天麻五分

原生地三錢

酒炒桑枝一兩煎湯代水

又 脉弦稍和右脉稍起左臂亦痛偏風串散之兆欲咳不暢風痰鬱於肺部經云火鬱則發之又云在上者因而越之自應溫散上焦能咳暢痰出更妙

炙黃芪一錢五分防風一錢

杏仁三錢

桂枝 四分
酒炒

歸鬚 一錢五分
蘇葉 一錢

鬱金 五分
酒炒

桔梗 五分
炙甘草 五分

酒炒桑枝 一兩
煎湯代水

又 脉象漸平惟左寸尚嫌浮滑已有風痰外發之意但

咳痰不暢仍照前法加減

南沙參 三錢

橘紅 一錢

生黃芪 一錢五分

冬桑葉

一錢 正反
歸鬚 一錢五分

瓜蔞皮 一錢五分

赤芩

三錢 正反

宣木瓜 一錢
酒炒

杏仁 三錢

蜜炙枇杷葉

三錢

