

婦科冰鑑

三

婦科水鑑卷五

胎前門目錄

胎前總領一

惡阻二

胞阻三即腹痛

子腫子氣子滿皺腳脆胎四

子煩五

子懸胎上逼心六

子癰七



子嗽 八

子淋 九

轉胞 十

激經 十一

胎渴 十二

采血 十三

吐血 十四

胎動不安 墮胎 小產 滑胎 十五

子死腹中 十六

附胎動胎渴尿血辨



子母存亡辨 十七

胎前癥瘕 十八

胎萎不長 十九

子瘕 二十

子啼 二十一

臍燥 二十二

鬼胎 二十三

腸覃石瘕 二十四

母子盛衰 二十五

胎孕寢常記

二六

胎前門彙方目錄

保生湯 一

加味六君湯 二

加味溫膽湯 三

參橘飲 四

加味平胃散 五

加味芎歸湯 六

導赤散 七



五苓散 八

蜜消煎 九

延胡四物湯 十

加味膠艾四物湯 十一

全生白朮散 十二

天仙藤散 十三

茯苓導水湯 十四

知母飲 十五

犀角散 十六

紫蘂飲 十七

鈴羊角散 十八

釣藤湯 十九

桔梗湯 二十

枳桔二陳湯 二十一

加味五淋散 二十二

安榮散 二十三

補中益氣合四苓散 二十四

舉胎四物湯 二十五

阿膠五苓散 二六

黃耆湯 二七

銀芎酒 二八

阿膠湯 二九

血餘四物湯 三十

清胃飲 三一

加味聖愈湯 三二

加味佛手散 三三

十聖散 三四

芳藹湯三五

益母丸三六

地黃飲三七

獨參湯三八

千金保胎丸三九

平胃散四十

黃連煎四一

甘麥大棗湯四二

香稜丸四三



婦科水鑑卷五

胎前諸證門

胎證總領一

妊婦胎前變顯極多其最易犯者惡阻胞阻子
子氣子滿子煩子懸子癰子嗽子淋轉胞激經
漏尿血吐血胎動不安墮胎小產滑胎子死腹
子母存亡胎前癥瘕胎痿不長子瘠子啼臟燥
胎腸覃石瘕母子盛衰等證共計廿四條皆當
一詳辨其餘胎前傷寒傷食瘧痢霍亂泄瀉等

當於雜證門中參考施治但須時刻保護胎原
致誤犯為要耳

惡阻二

妊孕月餘惡心嘔吐名曰惡阻蓋婦人受胎之
胞門壅塞藏氣內阻挾胎氣衝逆於胃中宮鬱
不能舒布以致頭目昏眩心虛煩悶體重肢倦
酸擇食輕者勿藥可愈重者必須調理治此之
惟求於胃審其寒熱辨其痰飲或胃素虛或氣
衝隨宜施治鮮不效矣

素胃素虛者保生湯 胃寒者必喜熱飲六君子

湯 吐多痰水且心煩頭目眩暈者其人必胃

中素有停飲也宜加味六君湯 善嘔吐心中

煩熱煩悶喜飲涼漿者胃熱也加味溫膽湯

若胃熱挾氣攻衝者參橘飲

倘愈止愈急者須效仲景法停藥月餘自安

保生湯本門一

六君子湯 見經閉門五

加味六君湯本門二



加味溫膽湯 本門三

麥橘飲 本門四

胞阻 三

孕婦腹痛名曰胞阻致此之由有食滯胎氣胞寒
水熱之分欲察其因須審痛處若在心胃分界者
屬食屬滯消導即愈在少腹之間小便清利者必
因胞血受寒法當養血溫煖下焦或小水閉澀而
痛者則是膀胱蓄熱所致但清熱決水其治無難
惟腹痛連腰乃胎氣作祟或有觸犯而然治此不

易。若兼下血尤屬可畏何也。蓋胎繫於腎腰者腎之府也。若不急為安養恐墮墮墮而至矣。若心胃作痛者食傷停滯也。宜加味平胃散。若大便秘結日久。加大黃以攻之。必倍甘草以緩其峻。庶不傷胎。若少腹作痛者乃胞血受寒也。宜加味芩歸飲。小便閉澀而痛者膀胱積熱也。導赤散。若水盛陽虛不化者宜五苓散。若內熱大小便閉者蜜消煎。腰腹作痛胎動下血者宜延胡四物湯定痛而保胎。下血更

多而痛者須防墮胎宜加味膠艾四物湯

加味平胃散 本門五

加味芳歸飲 本門六

導赤散 本門七

五苓散 本門八

蜜消煎 本門九

延胡四物湯 本門十

加味膠艾四物湯 本門十一

子腫子氣子滿皺腳脆腳 四



孕婦頭面浮腫或漸及徧身小便短澁者水氣為
病也名曰子腫自足腫至膝或指縫出水小便澀
利者濕氣為病也名曰子氣若徧身俱腫腹脹而
喘在六七月之間者名曰子滿但兩腳腫而膚
厚者屬濕名曰皸腳皮薄者屬水名曰脆腳大凡
水之為病多喘但氣之為病多脹滿喘但屬肺脹
滿屬脾也以其人素有水氣濕邪故受孕有腫滿
之證兒未成形被水浸漬其胎每致損壞已成形
者尚可調治故五六月後而有是證者每多生育

但兒手足軟而有疾耳

子腫全生白朮散 子氣天仙藤散 子滿皴

腕脚茯苓導水湯 子腫子氣亦宜準此

全生白朮散 本門十二

天仙藤散 本門十三

茯苓導水湯 本門十四

子煩五

厚婦別無他證惟時時心煩者名曰子煩由陰既
養胎孤陽獨旺上乘於心故使煩熱不寧也宜知