

医 学 室 在 易 X 終 卷

亥21
46(3)-2
7.
西十三



醫學實在易卷之七

閩長樂陳念祖修園箸

男元犀靈石參訂

孫男

心典
徽菴

芝溥

白傷寒

欽青龍湯

麻杏甘石湯

白虎湯

承氣湯

但見
寒寒

九味羌活湯



清华大学图书馆版权所有

治四時感冒頭痛發熱項強惡寒惡風身痛
代麻黃桂枝青龍各半等湯

羌活

人太陽

蒼朮

人太陰

防風

名一錢半周行通身

白芷

人明陽

細辛

人入厥陰

黃芩

人少陽

生地黃

蜜波作汗以

細辛

人少陽

甘草

各一錢和諸藥

加生薑五片

葱頭二根如傷風自汗去葱頭

加白朮倍防風胸滿去地黃加枳殼枯梗喘

加杏仁夏加石膏知母汗下兼行加大黃

按生地黃黃芩雖能退熱然初起不可遽用
苦寒不如用麥芽柔潤以養汗源且能助正
氣而驅風邪

二黃解毒湯

治大熱譫語發斑發黃吐衄下血等症。

黃柏

黃芩

黃連

梔子

各二錢

甘草

一錢

水煎服

犀角地黃湯

治火邪吐血衄血尿血譫語斑黃赤淋婦人
血崩等症

生地

三錢

犀角尖

丹皮

芍藥

各一錢

水煎服

柯韻伯曰氣爲陽血爲陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘即是火火入血室血不營經卽隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便



雖有在經在腑之分。要皆心肝受熱所致也。
心爲營血之主。心火旺。則血不安。故用生犀
生地酸鹹甘寒之味。以清君火。肝爲藏血之
室。府火旺。則血不守。故用丹皮芍藥辛苦微
寒之品。以平相火。此方雖曰清火。而實滋陰
之劑。蓋失血則陰虛。陰虛則無氣。故陰不足
者。用補之以味。勿得反傷其氣也。若用芩連
膽之梔柏。以瀉其氣。則陽之虧者。苦從火化

陽已衰者。氣從苦發。燎原而飛越矣。

防風

聖散

見中風

日糜鼻衄齒衄

甘路

方見飲食亦

治胃火熾盛等症

喉痺雙蛾單蛾

導赤散

治火盛目瘡喉痺雙單蛾及赤淋革中痛如



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

刀割等症

生地

錢

木通

甘草

各二錢

加竹葉二十四片水煎服

季楚重曰。渴心湯用黃連。所以治實邪。實邪責本之有餘。渴子以清母也。導赤散用地黃。所以治虛邪。虛邪責水之不足。壯水以制火也。

血證方



北京中醫藥大學

图书馆版权所有

鴟白散

治肺受燥氣乾嗽不已火移大腸作瀉等症

桑白皮

三錢生

地骨皮

二錢黃芩

甘草

加粳米二錢水煎服

李時珍云此鴟肺諸方之準繩也

竹葉石膏湯

石膏

八錢生研

麥冬

四錢

半夏

三錢

人參

二錢

炙草

一錢袋

鮮竹葉

八十片

粳米

三錢

水三杯半煎二杯入粳米煎至米熟量入

服

固元湯

人參

炙草

當歸

各二錢

大棗

一枚

炙芪

四錢

煨薑

一錢

水煎服

八味地黃丸

白虎湯

麻黃湯

加減詳本論

四生丸

治熱甚通血妄行此方止血兼能行於所以

爲妙

生地黃 生艾葉 生側柏 生荷葉

搗爲丸如雞子大每服一丸以沸湯沖服

理中湯

方見吐血篇

上中下之血不止得此藥能歸經真神劑也

黃土湯

治吐血衄血下血婦人虛崩之神藥

竈心黃土

人錢原方四錢

生地

甘草

白木

阿膠

眼藥草

附子

杞子
錢五分

水煎服

余每用去附子加炮薑八分

甘草乾薑湯

血症服涼藥不止者得此如神

乾薑二錢

生甘草四錢水煎服

斷紅丸

治下血久不止



南京中医大图书馆

南京中医药大学图书馆

側柏葉
炒香續斷酒炒各三錢

鹿茸

一具
酥炙多

醋煮阿膠爲丸，每日服四五十九丸。烏梅湯水

隨意下。

當歸補血湯

見頭痛

旱蓮丸

種福堂

治大便下血虛弱者

宜人參

早蓮草陰乾爲末，以槐花煎湯調炒米粉糊丸，如桐子大。每日服五錢，以人參五分煎湯

丸，如桐子大。每日服五錢，以人參五分煎湯



不二服卽愈

牛膝酒煎

種福堂

治男子莖中痛及婦人血結少腹痛

牛膝一大握酒煮飲之

早蓮車前汁

種福堂

治小便下血

早蓮草

車前子

各等分

將二味搗自然汁每日空心服一杯

桂圓豬臘飲

種堂

福

治大便下膿血，卽日夜數次，數年久病，

服立愈。

雄猪臘

洗淨

桂圓肉

二兩

扁荳花

鯛白
四兩

將三味搗爛，用白糯米拌和裝入豬臘內，兩頭紮住砂鍋內燒爛，忌見鐵器，然後將人中白炙脆研末，蘸吃或醬油蘸吃，亦可不論，吃粥吃飯空口皆可吃，吃四五條卽愈。



南京中医药大学图书馆版权所有

喘促

小青龍湯

見茲

小半夏加茯苓湯

治水飲欲逆欲嘔眩暈等症

半夏

四錢

生薑

五錢

茯苓

八錢

冰煎服

草應大棗湯肺湯

治支飲阻隔氣道呼吸不利

大棗

十二枚

草應子

二錢

炒研



南京中医药大学图书馆版权所有

水二杯先煎大棗至一杯分入草庵煎八分
服、

越婢加半夏湯

治氣盛痰壅肺脹上氣目如脫脈浮大者

麻黃

二錢

半夏

二錢

生石膏

四錢研

甘草

一錢

大棗

二枚

生薑

半錢

水二杯半先煮麻黃吹去沫入諸

藥煎八分服日再

