

東醫寶鑑

十一

東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮庵 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

舌燥脉洪大人參白虎湯主之。凡得病五六

日而渴欲飲水不能多者不當與之。何者以腹中

熱尚少不能消故也。至七八日大渴欲飲水惟當

少與之。常令不足勿極意也。言能飲一斗只與五

升。若腹滿小便不利若喘若熾者不可與之。若小

渴咽乾者少少與之。令胃氣和則愈。○渴欲

飲水入即吐名曰水逆。五苓散主之。○厥陰

病渴欲飲水者少與之。愈。○熱在表則不渴。熱入裏則渴。耗奪津液而然也。然有渴必有煩。故

夏... 胃... 金... 藥... 病... 命...

虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯○凡渴欲飲水常令不足為善經云若還不能飲非其治強飲須教別病生○

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱膏中有寒也○陰盛隔陽之證口燥渴而欲飲水不○

五苓散治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分

為末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服○傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛燥或飲水不散而反吐出為水逆證或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散也

竹葉石膏湯治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四錢人參二錢

麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服門

傷寒潮熱發指時而發者謂之潮其來不失時也一日一

傷寒發狂

即發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語日晡而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用下必之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之也
床微喘直視脈弦者生脈濇者死
不微喘直視脈弦者生脈濇者死

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言

三黃垣上屋不食不時非大吐下不止表裏俱熱宜

語宜辰砂五苓散
錯言妄語非若發狂莫能制也
陽毒升麻湯陽毒瘧子湯坊見○發狂宜用妙香

九疔鯁三白飲活龍散子破搶湯水漬法火劫法○

喜忘如狂蓄血證也○凡發狂見陽證
陽脈者順見陰證陰脈舌卷囊縮者死

三白飲

治傷寒熱病熱極在走雞子清一箇白蜜一
大匙芒硝三錢右合作一處凉水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐片灌尤妙名曰涼快若熱熾則

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人屎乾者燒存性水漬飲汁一二盞即更或

水漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水亦可

傷寒謔語鄭聲

實則謔語虛則鄭聲謔語者謂亂語無次第數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩

也只將三句舊言重疊頻言之也○陽明病胃實則謔語○大小便利手足冷脉微細者必鄭

聲宜用白通湯大便秘小便秘赤手足有實有虛實必謔語宜用調胃承氣湯○謔語有實有虛實

則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者
腸胃自利也難治也○傷寒大熱呻吟錯語不得
眠黃連解毒湯主之○晝日明了夜則譫語如
見鬼乃婦人熱入血室證也○傷寒發熱譫語
宜柴胡連
翹湯

黃連解毒湯治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏知母

子各一錢二分半
剉作一貼水煎服

柴胡連翹湯治傷寒發熱譫語中吟睡卧不得
柴胡連翹黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁

連翹黃連黃芩甘草各八分
剉作一貼入薑三片水煎服

傷寒結胸而反下之熱入胃作結胸○傷寒表未解
醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下硬

痛此為結胸宜大陷胸湯○若按心下硬痛手
不可近燥渴譫語大便秘實脈沉實有力為大結胸
急以大陷胸湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者死

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

陷膏湯○小結膏者正在心下按之則痛脉浮滑宜小

陷膏湯○寒實結膏無熱證者宜三物白散小

寒熱○但用陷膏湯不差用枳實理中丸應手而愈

出名○但結膏無大熱者此為水結在胃脇但頭汗

實結膏○宜用大陷膏九○結膏宜用灸法熨法

未經下而膏滿○非結膏也○只以小柴胡合小陷膏

一加服○如神○

大陷膏湯○治大結膏大黃三錢芒硝二錢甘遂末五

分納○再煎一二沸去滓納汁

遂未攪服得快○行止後服

小陷膏湯○治小結膏半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌

瓜蒌至一盞○乃八半夏黃連煎至半去滓溫服未

利再服○利下黃泥便安

梗尤效○其子者非也

三物白散

治寒實結膏枯梗貝母各三錢巴豆去
心熬研如脂一錢右爲末和勻白湯下

熱半錢一弱挽入利減半不止或進冷或粥利一不挽利進

大陷腦丸

治熱實結胸大黃五錢
芒硝二錢半甘草二兩
石脂半斤芍藥半斤
蜜炒杏仁

煎丸
六彈
分予
溫大
服每
未一
利丸
再水
服一
不日

灸法

THE
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1890

熨法

新編
東鑑

傷寒藏結

病有結膏有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結膏也何謂藏結答曰痛如寸

結膏狀飲食如故時胎滑下利難治
○關脈入細小沉

素○有○痞○連○在○臍○傍○引○入○小○腹○入○陰○筋○者○此○名○臍○結○

連臍痛引陰筋者藏結元來白死胎不醫
○ ○ 病狀如素膏

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡如生薑以和

表灸開元以回陽解陰結危哉門○藏結與結膏相以皆下後邪氣入裏與陽相結結在膏者為結

膏與陰不相結結在藏者為藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飲食

如常時時下利古上白胎脇肋臍腹引八噎筋俱痛者丹田有熱膏中有寒所以難治門

傷寒痞氣發熱者若陰而下滿而不痛此為痞○傷寒瀉心而

湯主之胃虛氣逆者亦主之○心下痞硬按之濡其脈開上浮者三黃瀉心湯主之凡結膏與痞

開脈須沉若開脈浮者宜此湯○心下痞後下利日惡寒汗出者附子瀉心湯主之○心下後下利日

數行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之

雷鳴○汗解後胃不和心下痞硬○太有水氣腹中雷鳴○下利者生薑瀉心湯主之○太有水氣腹中

未除而數下之遂下利不止心下痞硬○太有水氣腹中未除而數下之遂下利不止心下痞硬○太有水氣腹中

桂枝人參湯主之○痞氣通用○太有水氣腹中桂枝人參湯主之○痞氣通用○太有水氣腹中

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑三錢黃連五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯一盞入三味漬

之良久去滓納附子汁分溫再服

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩乾薑各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚水煎服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚水煎服

桂枝人參湯桂枝另剉甘草炙各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二劑

傷寒筋惕肉瞤動氣在左而發汗太過所致也古以

真武湯主之然真武湯能止其汗而榮筋筋愈急

而四體百骸俱為之動宜以四物湯去地黃加

人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂為佐入生薑

傷寒除中證而利反能食曰除中其死也可立待也

○邪在表則不能食邪在裏則不能食者名曰除中

下利脈遲當不能食而反能食者名曰除中

胃氣既除豈可再復○厥利當不能食今反能

食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱

者非除中知胃氣尚在必愈也

傷寒血證

青太陽病六七日表證因在焦小腹當滿小便不利

自利者下血乃愈抵當湯主之。○太陽證身黃

傷寒宜抵當丸。○太陰病反利者為勝。○其入

下之。○氣血自下者。○自愈。○但小腹急結者。○宜

桃仁承氣湯。○若氣血自下者。○自愈。○但小腹急結者。○宜

也。○若氣血自下者。○自愈。○但小腹急結者。○宜

湯。○若氣血自下者。○自愈。○但小腹急結者。○宜

後者。○自愈。○但小腹急結者。○宜

抵當湯。○治一切瘀血結。○青澀。○語。○欲。○水。○等。○證。○水。○經。○妙。○玄。

未煎服。○作一貼。

抵當丸治蓄血在下而無身熱便黑喜忘下之水等

蜜各七箇桃仁六箇大黃三錢右為末蜜和分

桃仁承氣湯治血結膀胱小腹結急便黑謔語夜水

甘草一錢桃仁留尖十枚右剉作一貼

傷寒自利傷寒陰證身痛脈沉大便秘自利或嘔或下宜

飲大便秘自利宜柴胡湯

柴苓湯治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉

七分黃芩人參甘草各六分桂心三分

傷寒胸腹痛傷寒腹痛中脘痛太陰也臍腹痛少陰也

為結膏若未經下者非結膏也乃邪氣填塞膏中

膏加枳結一服如神
乃痞氣也宜瀉心湯加枳實
○若心下脹滿而不痛者

便利則為瀉心之證
利則為瀉心之證五苓散
○若心下之若小腹硬痛

小便不利為大便秘實
小便不利為大便秘實者有
○若心下之若小腹硬痛

傷寒吐衄死蓋胃中有
傷寒吐衄死蓋胃中有寒則
○若心下之若小腹硬痛

煎服待衄定却以小柴
煎服待衄定却以小柴胡湯
○若心下之若小腹硬痛

者手足冷胃
者手足冷胃
○若心下之若小腹硬痛

陰陽交證黃帝問曰有
陰陽交證黃帝問曰有病
○若心下之若小腹硬痛

以汗出者皆生於穀穀
以汗出者皆生於穀穀生於
○若心下之若小腹硬痛

肉而得汗者是邪邪氣
肉而得汗者是邪邪氣也汗
○若心下之若小腹硬痛

復熱者是邪勝也且夫
復熱者是邪勝也且夫熱論
○若心下之若小腹硬痛

東醫寶鑑卷之三

者死狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不

可分也此

壞證

再傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫

病經汗吐下溫鍼不解及過經不解皆名壞證或

醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久

而差不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃

湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危

急者奪命散諸藥

不效者驚甲散

知母麻黃湯治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守

汗下不盡毒留心甘草炙各一錢右剉作一貼水煎

芍藥黃芩桂心

服微汗即愈

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩

赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩
知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右到作

一貼入薑三片水煎服

奪命散

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽一證不明過

之證一好人參一兩到作一服水二升於銀石器內
煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻泉

上出一消如水是藥之
效也一名獨參湯

鰲甲散

治壞證諸藥不效鰲甲二錢犀角前胡黃芩
生地黃各一錢枳殼八分烏梅二箇右到作

一貼水煎服

百合證

大病後未平復失於調理餘證在陽醫反下之

無復經絡故謂之百合傷寒其證常然欲食
不能食欲卧不能卧欲行不能行或有時聞食臭

或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能
治藥入口即吐利如有神靈身形彈似和其脉強

數每尿時輒頭痛者六十日乃愈若尿時快然但頭眩者二十

日愈然者四十日愈若尿時快然但頭眩者二十

石代赭湯用陶氏柴胡百合湯百合湯百合湯黃湯百合滑石散

以百合洗方煎○百合者百脉合病也治

陶氏柴胡百合湯治百合病及勞復等證驚甲瞢煮

貼入參黃苓甘草各一錢右剉作一

百合知母湯治汗後百合證百合七枚知母一兩右

更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞另

服溫服

百合滑石代赭湯治下後百合證百合七枚滑石三

百合雞子湯

治吐後百合病百合七枚雞子黃一箇