

景岳全書卷之五十四書集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

和陣

局方

二陳湯

治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏 制各三錢
茯苓 二錢
炙甘草 一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪加味二陳湯三 治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮 米泔浸 白朮 炒 橘紅 半夏 泡

茯苓 川芎 香附 各八分 枳壳

黃連 薑炒 甘草 各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二術二陳湯四 治一切嘔吐清水如注

蒼朮 土炒 白朮 炒 陳皮 半夏 制

茯苓 各一錢
炙甘草 五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參
煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麴砂仁

宣明 黃芩二陳湯 五
治熱痰

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 等分

甘草 減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨疑 柴葛二陳湯 六
治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡 乾葛 陳皮 半夏

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

川芎

黃芩各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久

瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰

分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子

湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山枳檲青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七

方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱小半夏湯八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升

生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五

錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱小半夏加茯苓湯九

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

卽前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十

治胃反不受食食入卽吐○外臺云治嘔而

心下痞鞭者

半夏

二升洗

人參三兩

白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升

半溫服一升餘分再服

御藥

大半夏湯

十二

一名橘皮湯

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓

各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯

十二

治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸

及小兒等病

白茯苓

二兩

半夏

五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣明

橘皮半夏湯

十三

治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮 五錢

半夏 制二錢半

冰一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞

秫米半夏湯

十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米 一升

半夏 五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏
炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病
者覆杯即卧汗之即已久病者三日而已也

東垣

半夏白朮天麻湯

十五

治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏 錢半

白朮

神曲 炒各一錢

麥芽

陳皮 各錢半

人參

黃芪

茯苓

蒼朮

天麻

澤瀉 各五分

黃柏 二分

乾薑 三分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱 黃芩半夏生薑湯 十六

治乾嘔而利者

黃芩

生薑 各三兩

炙甘草

芍藥 各二兩

半夏 半升

大棗 十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣平胃散 十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑制炒

陳皮

去白各五兩

蒼朮

去皮米泔浸炒八兩

炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服

○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中

氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃困倦加人參黃芪○如

有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加

黃連黃芩

調氣平胃散 十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴 制

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香

各一錢

甘草

五分

蒼朮

錢半

藿香

一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏

益黃散

十九

治脾土虛寒水反來侮土而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便秘手足逆冷等證

陳皮

兩

青皮

訶子肉

炮去

炙甘草

各半兩

丁香 二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散 二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂

泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮 各一錢

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴 各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴 薑制

藿香

半夏

蒼朮 米泔浸

陳皮 各一錢
甘草 炙五分

薑棗水煎服

陳氏不換金正氣散 二二

治感冒風寒或傷生冷或瘴瘧或疫

癘

蒼朮 米泔浸
厚朴 薑汁炒
橘紅 三兩

半夏 制
藿香 各二兩
人參

木香 濕紙裹

白茯苓 各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散 二三

正胃氣進飲食退寒瘧食瘧瘴氣脾胃滯者

用之爲宜

藿香

草果 各二兩 半夏制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草 各一兩

右爲末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘧未發前和

渣服

濟生大正氣散 二四

治脾胃不和爲風寒濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白朮

陳皮 各二錢 半夏 制

藿香葉

厚朴 薑炒

桂枝

枳殼

檳榔

乾薑

炮各錢

甘草 炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東垣升陽益胃湯 二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小

便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽

氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四

味

人參

炙甘草

半夏

脈滿者置用各一錢

黃芪

一二錢

白朮 三分

白芍

防風

羌活

獨活 各五分

柴胡

茯苓

小便利者勿用

澤瀉

不淋者勿用各三分

陳皮 四分

黃連 二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎

一鍾早飯午飯之間溫服忌語語一二時及酒濕助火之物

○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓

澤瀉若得喜食增食初二日間不可太飽恐藥力尚淺胃

氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣

升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜爲尤善

海藏

白朮湯 二六

治風濕惡寒脉緩

白朮

防風

甘草

右咬咀加生薑煎服

濟生

白朮湯 二七

治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白朮

橘紅

半夏

茯苓 各二錢

炙甘草 一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方二味白朮湯二八

方在婦人十一

治妊娠內熱心痛

良方四味白朮湯二九

方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白朮散三十

治自汗盜汗極效

白朮 半斤

右將白朮切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白朮尚

硬再加水煮透爛取起切片焙乾爲末每服二三錢仍用浮

麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒菹芪煎湯量兒大小與