

冷廬醫話
四卷



冷廬醫話卷五

桐鄉 陸以湑 定圃氏著

幼科

小兒解顛者因腎氣虛弱腦髓不實不能收斂而顛爲之大也。宜急服地黃丸補之。萬密齋幼科發揮云一兒頭縫四破皮光而急兩眼甚小。萬曰腦者髓之海也腎主骨髓中有伏火故髓熱而頭破額顛大而眼楞小也。宜服地黃丸其父母不信至十四歲而死。余族一姪孫幼時解顛頭大而面甚小至十六歲竟死。余按龜板治小兒顛不合加入地黃中煎服似尤應驗。



治小兒驚風。砂雪丸用硃砂輕粉各一錢。殭蠶十箇。蝎三箇。以青蒿節中蟲搗和為丸。研細人乳調服。相傳其方甚神。余按輕粉辛燥有毒。治之不得其法。則毒氣竄入經絡。變成他疾。為害非淺。不若用青蒿蟲末和燈草灰。調人人乳服之。或飼小兒睡時。以銅管吹青蒿蟲末和燈草灰入其口中。法尤簡妙。屢屢獲效。不可忽視。喻嘉言溫證朗照云。凡小兒發熱嘔吐者。倘未佈痘。卽須審諦。不可誤用溫胃之藥。里中一宋侯。高年一子。恣啖不禁。每服香砂平胃散。極效。一夕痘發。作嘔。誤服前藥。滿頭紅筋。錯出斑點。密攢筋露。所謂瓜藤斑也。上饒



相公一姪髫齡選貢赴宴返寓痘發作嘔乃父投以膏
香正氣丸一夕舌上生三黑疔如尖栗形舌下生四黃
疔如牛爛形蓋痘邪正出阻截其路凶變若此當以爲
戒余按小兒患病挾熱者多溫燥之藥皆宜慎用不特
痘症宜防也憶在杭州時有府胥張某子十歲夏月觸
暑發熱惡寒不食醫投以藿香正氣丸遂至熱盛神昏
唇舌焦乾口鼻出血而殞聶久可活幼心法云小兒多
吐之後胃氣大虛氣不歸元陽浮於外反有面赤頭熱
身熱作渴而似熱症者俗醫誤認爲熱投以涼藥殺人
如反掌故治吐瀉而藥不中病者與其失之寒涼甯失



之溫補失之溫補猶可救療失之寒涼其禍甚速不及救也。余按此說與前條喻氏所論絕相反參觀焉。而各有至理。惟在審症之的而已。蓋凡症之初起發熱作渴而吐者。挾熱居多。吐後復發熱作渴者。往往有屬虛寒者矣。司命者其慎之。

吾邑孔雅六學博

憲采

長女初生啼哭一聲後竟默不

作聲。查方書捉貓一隻以袱包之持向女耳邊隔袱咬貓耳。貓大噪一聲女卽應聲而啼。後遂無他。今已出嫁生子矣。此卽古之所謂禁方。其理莫能測也。醫學入門云。初生月內多啼者。凡胎熱胎毒胎驚皆從此而散。且

無奇症沈芊綠甚韙其說因謂兒啼只宜輕手扶抱任其自哭自止切不可勉強按住或令吮乳止之若無他病不必服藥余謂是固然矣然有因他故而啼者杭州樂懷谷女方襁褓忽啼不止拍之則愈啼解衣視背見繡針微露其緒而針已全沒醫治之雜以藥敷肉潰而針終不出延至百餘日賣酒家傳一方以銀杏仁去衣心杵爛菜油浸良久取油滴瘡孔中移時針透瘡口而針則已灣蓋強拍入之也又曾世榮於船中治王千戶子頭疼額赤諸治不效動即大哭細審知為船篷小篋刺入顙上皮肉鑷去即愈然則小兒啼哭苟有異於尋



常卽當細心審察固不必一概投藥亦不得任其自啼
自止也

痘

翼駟稗編云海州劉永有一子年五歲出痘徧體疙瘡
大如甌凡三四十醫皆不識有老嫗年七十餘見之曰
此包痘也吾所見并此而二決無他虞六七日疙瘡悉
破內如榴子層層灌漿皆滿真從來未覩者痘書充棟
亦無人道及可見醫理淵深卽痘疹一門已難測識矣
余按此可以補諸痘書之闕錄云

阜平趙功甫長於治痘痘始萌一望已知其結局自云



一生療痘無藥不用而從未有用附子者今按曾世榮
治侯自牧子痘盛夏用附子費養恒治馮憲副孫痘亦
用附子皆採入續名醫類案然則治痘非無用附子之
症特不恆有耳

崔默庵論痘症曰今人治痘率用升麻葛根湯使毒氣
盡升頭面後多難治戒升麻勿用多用葛根及橫解之
劑少加桂枝令其毒盡散於四肢卽險逆之症亦可爲
矣見劉繼莊廣陽雜記

疔

治小兒疔病集聖丸

人參蟾蜍川連各三錢歸身川芎
陳皮五靈脂蓬莪茂夜明砂使君



子肉蘆薈砂仁木香各二錢公猪胆一箇和藥末爲丸如龍眼大每服一丸 不寒不熱亦補

亦消最爲穩善名醫類案所載單方三亦佳 一用山查

一兩白酒麩一兩 取多年瓦夜壺中人中白最多者裝

入二物炭火煨存性研細末每服六分滾水送下其一

用雞蛋七枚輕去殼勿損衣膜以胡黃連一兩川黃連

一兩童便浸春秋五日夏三日冬七日浸透煮熟服之

其一用大蝦蟆十數箇打死置小口缸內取糞蛆不拘

多少糞清浸養盛夏三日春末秋後四五日以食盡蝦

蟆爲度用粗麻布袋扎住缸口倒置活水中令吐出污

穢淨置蛆於燒紅新瓦上焙乾食之每服一二錢或用炒熟



大麥麩和少蜜作餅或丸令兒食

此皆以人身氣化之物入消導藥治

之可稱靈妙

小兒無辜疳腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不

疼壯熱羸瘦頭露骨高有謂妖鳥

一名夜行游女

夜飛其翼有

毒拂落于人家晒晾未收之襦裸衣上兒著之則病有

斥其說爲妄謂無辜烏名啼時兩領扇動如療癩之項

小兒肝熱目暗頸核纍纍其狀相類因以爲名宜用逍

遙散加減治之有謂因乏乳所致又有謂饑飽勞役風

驚暑積八邪所致宜用布袋丸治之余謂妖鳥之說無

論其是否但見項邊有核卽當挑刺以藥治之若至大



南京中醫藥大學圖書館版權所有

而潰膿法不能療至其用藥則仍不外治疔病之法耳

外科

治膿窠疥瘡用大楓子五十粒草麻子五十粒蛇床子三錢以上

麻黃半錢斑蝥去翅足雄猪油一兩先將麻黃斑蝥二味同

入猪油內煎枯去渣盡淨再將前三味放下緩緩熬煎

待渣黑然後取起用絹袋包裹向患處頻頻擦之此方

吳子嘉所傳云曾經試過甚效

子嘉又傳治發背癰疽一切無名大毒以及瘡癩等症

神方名迅風掃籜散云得自常熟屢試不爽用穿山甲

七蜈蚣去頭足蟬退五錢殭蠶炒去絲乳香去油沒



藥去油二錢半全蝎頭足要全酒浸去腹內腸七箇斑蝥去翅足搗米炒七箇明雄黃
五錢麝香一錢冰片八分五倍子一兩共爲細末曝乾

勿令見火摻於毒上再以尋常膏藥蓋之其效如神若
遇大毒須加升丹少許和藥末同摻其升丹必要自製

市者不驗

升丹方水銀一兩白礬一兩二錢牙硝一兩二錢皮不可用先將礬

硝二味研細再入水銀用小廣鍋一隻盛藥再以粗碗

一隻覆於鍋上用細白皮紙搓作紙索蘸水微濕築於

碗口另用細礬末摻紙上再用生石膏粉滿蓋碗底以

鐵秤錘壓碗上畢以大釘四枚釘入泥地用硬炭燒三



炷官香

四圍須用磚護住火方有力

第一炷火文第二炷火武

炷香

間須防

走漏 第三炷火大武當以扇拂之冷定開視而丹成

矣

丹在碗上藥渣棄去不可用

方書所言內癰大概詳於肺胃大小腸其他臟腑均略

焉吾鄉有患肝癰者醫以爲肺癰服藥後日就危篤延

張夢廬學博視之識爲肝癰誤治卒不能救藥而殞按

內經云期門隱隱痛者肝疽其上肉微起者肝癰又云

肝癰兩肘滿卧則驚不得小便是其症亦尙易辨特俗

醫不學遂致殺人耳陳遠公云肝癰在左而不在右左

脇之皮必見紅紫色而舌必見青色治必平肝爲主佐



以瀉火去毒。宜化肝消毒湯。白芍當歸各三兩。金銀花五兩。黑山梔五錢。生甘草三錢。水煎服。蓋其治法與肺癰迥殊也。

王洪緒外科全生集論馮氏錦囊治陰疽以溫補兼托以爲初起平塌安可用托托則成功宜以潰爲貴卽流

注瘰癧惡核倘有潰者仍不敢托托則潰者雖斂增者

又何如耶因立陽和湯以施治熟地一兩鹿角膠三錢白芥子二錢肉桂一錢

甘草一錢麻黃五分遇平塌不痛大疽倍加熟地嚴兼三謂

生平遵此法以治陰症屢獲奇驗嘗於六月中治一男

子徧身熱毒而腹上獨生一疽平塌不痛診其脉沈微

無力乃用陽和湯加附子黃芪服之疽消而愈蓋熱毒發於表而陰疽根於內故必治其本焉因思古方治一切癰疽用仙方活命飲未成者卽消已成者卽潰云是瘡癰之聖藥然以治陰疽則有銀花赤芍花粉貝母等涼藥不若陽和湯專用溫補能消患於未萌也

海甯許辛木部曹

棧

精醫理尤長於外科所製膏丹必

購求良藥親自研鍊拯治危症甚多嘗言癰瘰一症服藥最難見效外治亦鮮良方王氏全生集消核膏曾試用之蘊熱重者轉致紅腫蓋藥品多毒烈也因以控涎丹爲主加入麻黃煎成膏藥普施甚效故友湯緒雲又

加入數味嗣後求者踵至不獨瘰癧凡痰核乳巖貼之
初起卽消久者縱不能消亦不再大妙在並無斑蝥蜈
蚣全蝎等毒藥雖好肉貼之無損石門某醫之女頸生
瘰癧十餘年自爲醫治不效且有潰者聞部曹有自製
消核膏挽人求索令未潰者貼此膏已潰者貼陽和解
凝膏見全集摻以九一丹每次索膏必數十張如是數月
未潰者消已潰者斂遂不復發今嫁人有子女矣此方
治愈者眾其藥用製甘遂二兩紅芽大戟三兩白芥子八錢
黃四錢生南星一兩直天蟲一兩朴硝一兩藤黃一兩
半夏一兩六錢九一丹用降藥九分生石膏一分



外科之症有與內科相似者最宜詳審凡諸癰毒初起惡寒發熱不可誤認傷寒又骨槽風不可誤認牙痛鶴膝風不可誤認痛痺痔血不可誤認腸紅肺癰不可誤認外感咳嗽腸癰不可誤認諸腹痛此類尙多不可悉數

質直談耳載舊青浦鎮瘍醫陳天士名馳四方就醫者日不下數十人其藥最秘者手治之歲久毒氣薰炙晚年中拇間生惡疽知不可療聞南去百五十里地名潭中有一叟精於針砭恒自晦不欲以術自鳴卽易姓名疾赴其所乞治之叟曰此藥毒也君殆知醫向之中惡

