

治瘡子大治

或有問予曰瘡子瘡子之發也其發也同時并人
皆有痘瘡之患豈天道然乎抑本之於何臟何腑乎
請一一詳言之余應之曰痘發也本父母胎毒同天
行時氣而發此痘本乎五臟先天之症也至於瘡子
之發也亦因天行時氣與傷寒相似即所謂發斑傷
寒也自人受形而後肥燂炙薰于胃腑故胃腑清潔
其發也輕胃腑垢膩其發也重此瘡子本於胃後天
之症也其發也身熱面赤咳嗽耳後筋紅或青紫者
重眼睛水淋之搃以表發為主夫瘡之發也本於胃

腑傳於肺家與肝腎無涉而亦有用黃連而得效者
以諸火皆統於腎故也其始初發散藥升麻干葛前
胡桔梗薄荷防風荆芥蟬退粘子連翹蘓葉亦可用
消食麦芽此初發和平之藥也切不可用羌活
性燥切不可用柴胡柴胡少陽經藥瘡子自肺胃兩
經病與肝胆無涉若用柴胡故將胃火引入少陽瘡
後不無目痛此所謂引邪入經也故柴胡不用山查
只壳麦芽此三味瘡中必用之藥且山查只壳麦芽
能消小兒乳疳其見點三日不驟用者以山查只壳
麦芽其味酸則飲瘡子以發表出透為主若出到

脚踝頭斷用山查麦芽只壳等藥書云寒涼過盛未
免有氷伏之患故黃芩一味不用於見點之時而用
於將齊之際經云胃火不清則發為牙疳口爛目痛
目赤肺火不清則熱入大腸流而泄瀉下痢此瘡後
之病皆由以瘡前治之不得其法之故云
瘡前有大閉症一曰風閉一曰食閉一曰火閉其食
閉見症何如口舌燥身熱極氣粗胸滿積食填於胃
中手不可按之極痛食填中宮故出不快治宜以
大黃通之火重用川連仍佐以發散藥若出可治不
出者死其風閉見症何如額毛豎立點子隱隱於皮

膚之中治宜三拗湯以火發之麻黃石羔杏仁此即
三拗湯也再佐升提透肌等藥發出則生不出則死
何謂火氣相通舌胎白口臭此胃火也故胃火不清
點子出不快出亦模糊舌尖紅亦佐以透肌表散藥
急用石羔黃連以清其火庶可救其萬一稍緩則斃
矣此三大閉症仍是瘡前見症予已詳示開學者心
一用明藥

火閉症方

石羔

黃連

升麻

干葛

前胡

桔梗

防風

蟬退

粘子

連翹

甘草

根生

足芽

加竹葉十片

灯心

一丸

此火閉症也

食閉症方

大黃

萊菔子

有食則有火舌尖紅

用黃連不紅不用舌乃心之苗若紅必心火也內仍

佐以發散透肌等藥此食閉症也

風閉症方

麻黃

石羔

杏仁名三拗湯

升麻

干葛

前胡

防風

蟬退

粘子

根生

連翹

等藥有人虛而患風閉人參同麻黃並用亦能發瘡

子此又非瘡無補法之可疑也

瘡子初發表藥方

荆芥

防風

蘇葉

薄荷

前胡

桔梗

干葛

蟬退

連翹

芡芽

甘草

加蔥白七个灯心一九

瘡子見點一日方升麻干葛防風荊芥

薄荷桔梗粘子根生蟬退連翹芡芽

甘草灯心一九

見點之曰瘡子隱於皮膚當用麻黃舌胎白有口氣
斷用石羔以清胃火則瘡子自然出透切不謂寒胃
而不用若用見舌胎白反以謂寒不能放胆用石羔
必然胃火不清不清瘡子出不快當時就有鼻扇胸
滿氣粗之患日後又有牙疳口爛目痛目赤之害以
胃不清胃火上熾於口_鼻為胃所屬也又胃火上
熾於目胃之脈起於鼻傍納太陽目內眥故胃尋到

本經來也。夫富貴子弟肥甘食多，一見舌胎白，有口氣，須重用石羔。若貧窮子弟不吃肥甜之物，胃火到牙，不受胃火到目，不受胃火無發泄之處，有上頭頂門紅腫高起寸許，此是瘡後症，不清胃火而致之。醫者月餘不效，竟成危症。余視此症，揔是胃火不清，仍用石羔合荆芥清火敗毒之藥，再加鹿角屑。頭為諸陽火首，鹿之所運角有至巔頂，故用三劑而效。瘡子見點，方二日方干葛。前胡、薄荷、防風、蟬退、桔梗、粘子、連翹、根生、山查、芡芽、灯心、一丸點子不透，仍用升麻，隱於皮膚，可用麻黃。

點子焦於乾枯。當用黃連、紅花、紫草炒梔子、舌胎白。
用石羔、舌尖紅、用黃連、舌胎黃、用只壳萊菔子。氣喘。
鼻扇、用羚羊角、馬斗鈴、有痰、用花粉、杏仁。
痞子見點二三日方姜蚕根生、玄參、知母。

山查

黃芩

麦芽

嗽加枇杷葉去毛蜜炙、舌胎白、有口氣、可用石羔炒。
焦糯米、蓋石羔、寒胃糯米、腰胃、用之以相救。又有石。
羔、兼用升麻、取升陽以發散之。舌紅、用黃連炒梔子。
有食用、只壳萊菔子、有痰、用貝母、花粉、杏仁、氣粗、用。
蘇子。

瘡子見點三四方方 前胡 干葛 姜蚕 鮮退

玄參 知母 石斛 山查 只壳 黃芩 麦冬

桑皮 杏仁 見症加減同前

瘡子見點五六日方附後 余三十年前出瘡子一

日子午二潮三日已消必不服藥者居多 近今瘡子

有六七日不消身熱壯竟似發斑復寒其故有二一

火毒未淨一表裏未清余定一方開載於後

前胡 薄荷 干葛 黃連 梔子_焦 知母 玄參

桔梗 生地 連翹 查肉 只壳 姜蚕 見症

加減同前

瘡子消來服藥方。瘡子前以發散為主。病主消子。

消後以滋陰清胃為主。生地 骨皮 甘草 麥

冬 桑皮 杏仁 米仁 前胡 山查 只壳

貝母 知母 石斛 玄參 嗽者用北沙參。有痰

用白芥子。有食用萊菔子。見症加減。同前。

瘡子不易看。瘡後有兩大患。一曰瘡前胃火不清。以

至牙疳鼻爛。一因肺火不清。移熱大腸。變成泄瀉。下

痢。初起急用大黃。以泄其毒。若日久虛難。用大黃。用

黃連。芩黃。以清其火。牙疳者急用石羔。目痛須用石

羔。黃連。以清其火。目紅赤者。須用大黃。以瀉之。此治

之々大法也

瘡後重感風寒者。仍用表散之藥。瘡後陰虛發熱者。仍用滋陰養血之藥。當歸白芍可用。瘡後積食不消。仍用消藥。瘡後小兒乳疳難治。只有五疳一法可救。萬中之一。瘡後餘毒。仍用清涼化毒藥。瘡後痰氣喘。仍用化痰清肺藥。凡瘡無補法。故人參白朮不用。然真虛者用之。而然瘡子以陰養為主。故肉桂不用。然真虛者亦可用。麻黃一味。服子過多。肺中燥極。渴不為主。可止。惟有梨頭少杵汁飲之。可以止渴。以梨能潤肺。故也。凡眼中有星。自退。凡出痘而瘡子又出。

者此最難者用青大麦草襯於席下以陰消其瘡子
然後治痘內經曰漆得蟹而解麻得麥而消也無青
麥草大麦可代

瘡子牙疳敷藥方 人中白煨四遍鹿角屑生剉青黛五錢

製石羔飛淨五錢冰片三錢等藥研極細末敷患處立效

看瘡法可抵上白肉若紅必出瘡子松毛頭能發瘡
子西河柳能發瘡子蘆筍能發瘡子工數條乃瘡中
之大略也學者更合繆氏諸書參互考訂神明其說
然後用以濟世則一撥見應越人術得矣否則對本
拙方於經絡脉理藥性毫魚貫通時數頁書為岐皇

再世景垣復生處思洛下醫初遇輕易瘡症本來不
必服藥漫抄一方以試之遂霍然有效目欣欣得計
秘為生平獨擅之奇延門兜攬殺人如坑則又此數
頁書之作俑也譬猶大學聖經一篇聖功黃道萬理
咸備小兒上幸入學初識句讀欲號通經豈不誕哉
牙疳方用大棗去核將白信石入於棗內用清油點
燈燒至烟盡研為細末加冰片少許擦入患處立效
又方當歸一錢川芎一錢荆芥一錢黑丑一錢小青草一錢
番

去毛淨切
木鱉一個

加灯心煎

又方胡芫荽子一錢麻黃二錢雄黃一錢姜蚕四錢金蝎酒洗五隻

研為細末。灯心湯送下。

又方。胆礬一錢。明礬一錢。白信四厘。人中白二錢。藥珠七分。青

戴一錢。梅冰一錢。

末藥方。銀花二兩。姜蚕四兩。薄荷二兩。蒙石二兩。雄黃一分。

痘疹正宗。清金一貫飲。荆芥。前胡。桔梗。

占子。連翹。黃芩。杏仁。山查。甘草。

歸宗湯痘科。生地。赤芍。青皮。粘子。木通。山

查。荆芥穗。甘草。

疹之初宜升麻葛根湯次宜荆防湯若清火瀉白散
合白虎湯或加苓連桔梗終宜二冬二地飲或甘露
飲黃芩二地宜當斟酌治之

升麻葛根湯 升麻 葛根 荆芥 防風 蟬退

桔梗 薄荷 生甘草 額心出透者去升麻表不

透者加煨石羔一錢 酒炒黃芩一錢 有食加麦芽卜子

三錢 大便閉加萎仁

清火瀉白合白虎湯 桑皮 骨皮 知母 石羔

川連 黃芩酒炒 桔梗

一閉悶不出用櫻桃核三十粒打碎加葱白二根水

二鐘煎八分熟服取汗無汗再服得汗即發出矣
疹症 一晚間發熱天明畧退喉間有痰疹出后十
數日有此症五日內生疳身瘦如柴而死悞作風寒
者飲食滯者^積疳症者皆不效此陰血不足之症也皆
瘡後未養陰之故耳

察症 疹之為症本是肺胃蘊積熱毒先動陽氣後
歸陰經發必太多血分煎熬故多血耗治之法宜緩
不宜急也始宜發散內托形已盡透然後清涼益陰
又當分肺胃各部及上下之分此不易之法也

二 避風寒 風寒本是外來宜當遠避如失避恐後