

永樂大典卷之一萬四千九百四十九

六幕

婦

婦人證治二十五

婦人八癥

論

靈樞水脹篇石癥何如。岐伯曰。石癥生於胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。蟬以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。難謙甫衛生寶鑑云。大膀胱為津液之所。氣化則能出矣。今寒客于子門。則必氣塞不通。血望不流。而蟬以止之。結硬如石。是名石癥也。此氣先病而血後病。故月事不來。則可宣導而下出者也。故難經云。任之為病。其內苦結。男子為七疝。女子為癥聚。此之謂也。非大平之藥不能已。可服見睨丹。方見後。王養外臺秘要方素女經。論婦人八癥積聚。無子斷絕不產。今有子受胎養法。黃帝問於素女曰。吾聞天下婦人產乳有子而病者。未嘗生子而病者。又產乳後而中絕不復產者。何也。諸病從生而令婦人腹中有積聚。胃腸腰背攣而痛。久而生八癥之聚。病深

可畏。不在腸胃。療之或者已復。其狀寧可得聞之乎。對曰。婦人之病。皆由於月病。生屋所致。又從胞胎所起。其病不同。鍼灸食藥。不得其方也。黃

帝曰。安心其要。易聞之。為實受之。良久詳思其事。曰。善哉。療將奈何。素女曰。誠為主說。婦人胞胎之數。皆在陰裏。萬物皆從生。淵深血脉。精氣所從

行。腎為陰。陰主開閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生子之道。胞門主於子精。神氣所出入。合於中黃門。玉門四邊主持關元。禁閉子精。臍下三寸。

名曰關元。主藏鬼氣。婦人之胞。三焦之府。常所從止。然婦人經脉俞絡合調。則月水以時來至。故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通。其入慈

思。邪氣使得往來。入合於子藏。若生惡露未已。而合陰陽。即令婦人經脉攣急。令人少腹裏急支滿。背脇腰背相引痛苦。四肢酸削。飲食不調。結牢

惡血不除。月水不如時。或在前後。乍久不止。因生積聚。如懷胎狀。邪氣盛甚。令人恍惚多夢。寒熱。四肢不欲時動。陰中生氣腫肉生風。甚者小

便不利。苦痛如淋狀。面目黃黑。歲月成病。即不復生子。黃帝曰。吾深所憂也。療之奈何。可得愈病。令人有子。願拜受。非其人不敢妄傳。何以神良耳。

素女曰。今詳而圖。一曰黃氣。黃氣者。婦人月水始下。若新傷墜。血氣未止。卧寢未定。五藏六腑虛羸。精神不定。因向人風。使利陰陽。開閉關節。四

逆中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘕瘕之聚
 令人病苦四肢寒熱身重淋瀝卧不欲食左脇下有氣結牢不可得而押
 苦腰背相引痛月水不利則令人不產少腹急下引陰中如刀刺不得小
 使或時寒熱下赤黃汁病苦如此令人無子療當刺關元氣衝行以毒藥
 有法療瘕當下即愈矣 二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行下
 以湯洗大盥陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安定骨肉皆痛手臂不
 舉飲食未復內藏吸吸久當風卧不自隱爲障若居濕地及濕席令人苦
 寒洒洒入腹心腹煩悶沉淖惡血不除結熱不得散則生青瘕之聚在左
 右脇下藏於背脊上與肩甲腰下臂急兩足腹下有氣起喜睡不可多食
 四肢不欲動搖恍惚善夢手足腫面目黃大小便難其候月水不通利或不
 不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法
 瘕當下即愈矣 三曰燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而
 以夏月熱行疾步若舉重移轉汗出交流氣力未平而早以急起致腹中
 張咽不泄經脉緊急內結不舒煩滿少腹氣上逆脇中背脊少腹墮急月水
 與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他藏不去有熱則主燥
 瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛在兩脇下上引心而煩苦飲食欲嘔吐

腎及腹中不得太息。腰背重。喜卧盜汗。足酸劑。久立而痛。小便失時。忽然
自出。若夫精月水閉塞。人使澀難。有此病者。令人少子。療之以長鍼。按而
刺之。法度行以毒藥。瘕當下即愈矣。四曰血瘕。血瘕者。婦人月水新下。
未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他藏。若大飢寒。吸吸不足。
呼吸未調。而自勞動。血下走腸胃之間。派落不去。內有寒熱。與月水合會。
則生血瘕之聚。令人腰痛。不可以使仰。橫脅下有積氣。牢如石。少腹裏急。
苦病。腎腎疼。腰股下痛。陰裏。若生于風冷。子門澀。月水不時。乍來乍去。有
此病者。令人無子。療之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。五曰脂
瘕。脂瘕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。其人未復。以合陰陽。絡脉分
胞門傷。子戶失禁。關節散。五藏六腑。津液流行。陰道澀動。百脉關樞四解。
外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁于精化。不足成子。則生脂瘕之聚。合
人文滿。裏急痛痺。引少腹重。腰背如刺。四肢不舉。飲食不甘。卧不安席。左
右走腹中切痛。時差時甚。或時少氣頭眩。身體疼痛。苦寒惡風。膀胱脹。月
水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。有此病者。令人無子。療之當刺以
長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。六曰狐瘕。狐瘕者。婦人月水當日數來。
而反悲哀自恐。若以速行。過暴風疾雨。電雷驚恐。衣被濕沉。罷音倦。少氣。

心中恍惚未定。四肢懈惰。振寒若寤寐。脉氣絕。精神游亡。邪氣入於陰裏。不去。則生狐癰之聚。食人子藏。令人月水閉不通。少腹脹滿。胃脘腰背痛。陰中腫。小使難。胞門子戶。不受男精。五藏氣盛。令人嗜食。欲嘔喜唾。多所思。如有身狀。四肢不舉。有此病者。終身無子。其癰有手足。卒成形者。殺人。本者可療。以長鍼急刺之。行以毒藥。有法。癰當下即愈矣。七曰蛇癰。蛇癰者。婦人月水已下。前止。通閉未復。胞門子戶勞動。陰陽未平。榮衛分行。若其中風暴病。羸劣。飲食未調。若起行當風。及度泥塗。因衝太早。若坐濕地。名曰陰陽亂。腹中虛。若遠行道路。伏飲汚井之水。不潔之食。通吞蛇鼠之精。流落不去。則生蛇癰之聚。上食人之肝心。苦病長大。條條在臍下。上運緩左右脅。不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中。掣急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其癰手足成形者。殺人。本者可治之。療有法度。行以毒藥。癰當下即愈矣。八曰龍癰。龍癰者。婦人月水新至。其人刺作龍胎勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。雖立未安。顏色未平。復見所好。為開湯。魂魄感動。五內脫消。若入水沉洗沐浴。不以時出。而神不守。水氣與邪氣俱入。至三焦之中。又暮出入。或玉門先閉。津液妄行。留絡不去。則

生寤。寤之聚。大如小杯。令人少腹內切痛。惡氣左右。走上下。腹中苦痛。若存若亡。持之躍手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人。未者可治之。瘕有法度。以長鍼按瘕之。行以毒藥。瘕當下即愈矣。與葉凡方病源同。但多黃帝素女問答之辭。及各瘕後刺法。即毒可用方。又有食瘕者。由臟腑虛弱。月候未止。時食生冷之物。脾胃既不能消化。與臟氣相搏。結聚生塊。日漸生長。盤牢不移。故謂食瘕。瘕用和濟生論方。血瘕論治論曰。腹中之病。經書所載。有積有聚。有癖有疝。有瘕有瘕。並積者。五藏所積。其痛不離其部。聚者。六腑所聚。其病無有常處。癖者。病據兩脇之傍。疝者。弦急而多痛。瘕者。微也。有塊可驗。瘕者。假也。假物成形。其結聚浮假推移乃動。此無他。皆由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。受於風冷。與氣血相結而成也。惟婦人血瘕為病。異於丈夫。其所以異者。非獨關於飲食不節而已。多因屋後勞動太早。喜怒不調。臟虛受寒。或月水往來。取涼過度。惡血不散。遇寒搏之。寒搏則凝。皆能成血瘕也。病作之時。令人心脇攻刺。少腹痛重。或腰背互相引而痛。久而不消。令人黃瘦羸弱。遷延絕足。診其脈弦急大者生。虛小弱者死不治。

方

孫思邈千金要方治婦人血瘕。心腹積聚。乳餘疾。絕生。小腹堅滿。貫臍中熱。腰背痛。小便不利。大便難。不下食。有伏蟲。臍脈。癰疽。腫。久寒。留熱。胃管有邪氣。方千金翼方。作杜家丸。尼亦林。石馬。咳丸。

半夏一兩。陸絲石膏。

葵蘆

杜家

薇蓉各十八林。桂心。

乾薑各一兩。

烏喙半兩。

巴豆六十枚。研如膏。

右九味為末。蜜丸如小豆。服二丸。日三。及治男子疝病。

治婦人血瘕病方

乾薑

烏賊魚骨各一兩

右二味治下節。酒服方寸匕。日三。

又方。木桂心。溫酒服方寸匕。日三。

王意外臺秘要方皂莢散。導之療黃瘕方。

皂莢一兩。炙去反子。

蜀椒一兩。汗。

細辛六分。

右三味。搗散。以三角囊。大如指。長二寸。貯之。取內陰中。欲便。開則出之。已。則復內之。忌血。畢出。乃洗。以溫湯。三日。勿近男子。忌生菜等。

專藥療膏

療方太平聖惠方。名氏鹽散
戎鹽一升 皂莢半兩 去皮子炙

細辛一兩六銖

右三味搗散。以三角囊大如指長三十貯之。內陰中。但臥。瘕當下。青
如葵汁。養之。如產法。

療燥瘕方

大黃如鷄子許 乾薑二兩 黃連三兩 鷄臍腔中黃膜一

枚炙 桂心一尺 麝蟲三枚微炒 厚朴十銖炙

郁李仁一兩 去皮心熱

右八味搗散。早朝空腹。以溫酒一盞和。三錢匕。頓服。瘕當下。下畢。養
之。如產婦法。三月無子者。當有。三日勿合。陰陽。

產婦瘕入血瘕痛方

乾薑 烏賊魚骨各一兩炙 桃仁二兩 去皮炙

右三味搗散。酒服二方寸匕。日二

人方

取古鐵杆。或大斧頭。或鐵杆。以炭火燒令赤。投好酒三升中。稍柄
飲之。

導藥古今錄驗療婦人血瘕攻刺腹脅時痛方

大黃

雷歸各半兩

山茱萸一兩

皂莢一兩去皮子炙

細辛

戎鹽各六銖

右六味搗以香脂丸如指大每以綿裹內陰中正坐良久瘕當下養

如乳婦之法

又療脂瘕方

皂莢十八銖去皮炙

礬石六銖燒

五味子

蜀椒汗

細辛

乾薑各半兩

右六味搗散以青脂和如大皂著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕乃愈

又療婦人絕不復生及未曾生皆以脂瘕腹中有塊以湯前自下而不受子導散方

皂莢炙去皮子炙

雷歸各一兩

蜀椒汗各二兩

細辛然

礬石燒

五味子各三分大黃

戎鹽各二兩

乾薑二兩

右十味搗散以輕絹袋如指大長三十盛藥令滿內陰中正卧隨意

金勿行走。小使時去之。別換新者。

療狐癰方

取新死鼠一枚。裹以新絮。塗以黃土。穿肥坎。足及鼠形。置其中。桑薪灼其上。一日一夜出。分去絮。內桂心末六銖。酒服二方寸匕。病當下。甚者再服。差止。

療蛇癰方

大黃

黃芩

芒硝各半兩

甘草大如指一尺炙

烏賊魚骨二枚。炙。炙六枚。去皮子。炙。

右六味搗。以水六升。煮之三沸。下絞去滓。下硝。適寒溫服之。十日一劑。空服。服之當下。

療蠶癰方

大黃六分

乾薑

側子各半兩

附子

人參各九銖

蜚蠊一斗已熟

桂心一兩六銖細平

土雞各十八銖白朮一兩

石十味漬散。以酒服方寸匕。日三

許叔微普濟本事方治婦人血癰。血積。經候不通。桃仁煎。

桃仁五皮大契炒黃
大黃一兩

川朴消各一兩 燕蟲半兩炒黑

右四味末之。以酒醋二升半。銀石器中。慢火煎取一升。五合下大黃。桃仁燕蟲等。不住手攪。欲好。凡下朴消。更不住手攪。良久出之。凡如梧桐子大。前一日不用喫晚食。五更初用溫酒吞下五丸。日午服下。如赤豆汁。鶴肝蝦蟆衣。未下再作。血鮮紅即止。續以調氣血藥補之。此出十全方。頃年在毗陵有一貴人妻。患小使不通。臍腹脹不可忍。眾醫皆作淋治。如八正散之類。數種治皆不逞。痛愈甚。予診之曰。此血厥也。非驅蟲藥不可去。予用此藥。更切服。至日午。痛大作。不可忍。逆針少頃。下血塊如拳者數枚。小使如黑汁者一二升。痛止得愈。此藥治病的切然。猛烈太峻。氣虛血弱者。更斟酌與之。

陳無擇三因方烏金散。治婦人血氣血凝血風。勞心煩燥。筋骨疼痛。四肢困瘦。

好黑豆十兩 沒藥

當歸各半兩 洗焙乾為末

右先將黑豆不犯水淨洗。用砂瓶一隻。入豆在內。以瓦片蓋。鹽泥固濟。留背通氣。炭火二斤。煨煙盡存性。以鹽泥塞瓶背。退火。次日取出。

豆如鷄翼研細方入後末研勻不拘時候溫酒調下二錢重者不過三五服忌鯉魚毒肉水母之類

嚴用和濟生論方三棱煎丸治婦人室女血瘕月經不通臍下堅結大如杯升而不治必成血蠱

京三棱

蓬朮各二兩

芫花半兩

青皮去瓢半兩半

右剉如豆大用好醋一升煮乾焙為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前用淡醋湯吞下

琥珀丸治婦人血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引而痛久而不治黃瘦羸之

琥珀別研

白芍藥

川烏炮去皮

川牛膝去蘆酒洗

鼈甲醋炙

蓬莪茂花

當歸去蘆酒洗

厚朴薑製炒各一兩

木香不見火

澤蘭葉

官桂不見火各半兩

麝香別研半錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒米飲任下
通經丸治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來此名血瘕

當歸去蘆酒洗一錢半

蓬朮花

桂心不見火

青皮去白

大黃炮

乾薑炮

桃仁去皮炙炒

乾漆炒令煙盡紅花

川椒去目及閉口者微炒故地上

蜜並出汁各一錢

右十味為末。將一半用醋煮熬成膏子。後入一半。入鷄子清同持勻。

凡如梧桐子大。每服二十丸。空心用淡醋湯下。

六合湯。治婦室經事不行。腹中結塊。疼痛。腰痛。腹痛。

當歸去蘆酒浸白芍藥

官桂去皮

熟地黃洗

川芎

蓮肉炮各等分

右以咀。每服四錢。水一盞。煎至七分。去滓。溫空心服。

羅謙甫衛生寶鑑見脫丹

附子四錢炮去皮臍

鬼箭羽

紫石英各三錢

澤瀉

肉桂

玄明礬

木香各二錢

血竭研一錢半水蛭一錢炒黃連

續斷二錢半

桃仁炙炒黃三十粒

京三棱剉五錢大黃剉二錢用酒

同三棱浸一宿焙

右各研末和勻。用原浸酒打糊。凡梧子大。每三十丸。鹽湯或酒送下。

空心食前

和血通經湯。治因受寒。月事不來。惡血積結如石。

當歸

京三棱各五錢 廣木蛇四錢

熟地黃

木青

肉桂各三錢

紅花

貫衆

蘇木各二錢

血竭研一錢

右桂細木合勻。每三錢。熱酒一盞調下。食前鹽湯亦得。忌一切生冷

物。及雷風大小便。

和血通經丸。治經水凝澀不行。臍腹腰背痛。漸成血瘕。

木青

當歸

乾漆炒煙盡

五靈脂

官桂

廣木

大黃各半兩

芍藥一兩

水蛭二錢半炒。蠱蟲三十箇。去足翅頭炒。

桃仁二十七箇。去

皮天

右細末。醋糊丸。梧桐子大。每二十九。溫醋湯。或溫酒下。日進一服。食前

表。當肘大方大黃散。治血瘕。諸傷。婦內損。

羊脰炙燒赤。酒浸十度。五兩。巴豆肉漿水煮黃色。

大黃小使。浸七日。日一易。月足。酒飯已。服。切三兩半。

半兩錢。服醋汁為奉。二兩二錢半。

右為細末。每服半錢。當歸二錢半。小使滾煎。稍溫調服。

婦人腹中瘀血

論

巢元方病源此或月經否澀不通。或產後餘穢未盡。因而來風。取瘀為風。冷所乘。血得冷則結成瘀也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則變成積聚癥瘕也。聖濟總錄論曰。瘀血者。由經水蓄聚。或產後惡露不盡。皆本衝任氣虛。風冷所乘。氣不能宣。故血瘀也。瘀血不去。結癥成積。則令人面黃肌瘦。煩渴憎寒。腰腹重痛。久變癥瘕。

脉

史載之方。婦人肝脉洪大。而反結澀。訣云。澀脉主婦人敗血。若脉洪大而入伏。則積澀而血不行。久則陰門腫。以厥陰脉絡門而過。

唐吳舉太素脉訣。婦人敗血者。蓋肝當洪大。而反結澀。為主敗血。洪大而反伏。則積澀而血不行。久則陰門腫。蓋以厥陰之脉。絡陰門而過也。

方

王愈外臺秘要方。療一切宿血。及損傷瘀血在腹內。不問新久。并婦人月。

經不通。產後惡血不下。皆良方

大黃 芒消各三兩 桃仁四十枚去皮尖

右三味。芒消桃仁合搗四五百粒。以酢漿二升半。漬一宿。空腹攪調。頓服之。不能頓服者。分作兩服。良久。先下糞。次下如豆泥汁。或黑血為驗。強人日別服一劑。弱人兩日服之。下血盡使止。不過三兩劑。忌生冷茶葵。

太平聖惠方。蝨蟲散。治婦人臍膈宿冷。經脈不利。腹中有瘀血。攻刺疼痛。

蝨蟲半兩。天全椒黃。去翅足。水蛭半兩。炒微黃。

桃仁三分。湯浸去尖。大雙仁。麩炒微黃。烏賊魚骨半兩。

牛膝半兩。去苗。鯉魚鱗燒灰。枳殼半兩。麩炒微黃。去點。

芫花半兩。醋拌炒令乾。雷歸半兩。剉微炒。

赤芍藥半兩。硃砂半兩。桂心半兩。

右件藥搗細羅為散。每服食前。以暖酒調下一錢。烏金散。治婦人臍膈風冷。宿有瘀血不消。令人黃瘦羸困。

鯉魚鱗三兩。亂髮二兩。槐蠟二分。桑螵三分。

蝨蟲一分。水蛭一分。川大黃一兩。剉碎。

硃砂半兩 芫花半兩 牛膝半兩去苗

右件藥並入甕，新子內用瓦子蓋，以鹽泥固濟候乾，以大火版令通赤，慢慢去大，俟冷取出，入麝香二錢，同研令細，每服空心，以熱酒調下二錢。

治婦人臍膈瘀血氣脹，頭疼咽乾，胃中妨悶，食即嘔逆，臍下滿疼，四肢無力，痿黃瘦弱，宜服此方。

亂髮灰一兩 釜下墨一兩 桂心一兩 神麝一兩微炒
麝香一分細研入

右件藥搗細羅為散，每服空腹，以熱酒調下一錢。

芫花散。治婦人腹中宿有瘀血，結聚不散，疼痛。

芫花一兩醋拌炒令乾 川烏頭一分炮裂去皮臍

鬼箭羽一分 蠶蠶一分炒令微黃去翅足 水蛭一分炒令微黃

桃仁一分湯浸去皮尖雙仁炒微黃

右件藥搗細羅為散，每服食前，用熱酒調下半錢。

地龍散。治婦人氣血不調，腹中積聚，瘀血疼痛。

地龍一兩微炒場蚶一兩微炙另第一兩 桂心一兩