

雜證錄外科卷之十三

山陰陳士鐸敬之甫號遠公爰號朱華子著述

會稽陶式玉荷自甫號存齋爰號

叅訂

背癰門

七則

人有背心間先發紅癩後漸漸紅腫此發背之兆也最為可畏古人云外大如豆內大如拳外大如拳內大如盈言其外小而內實大也然而癰疽等毒必須辨其陰陽有先陰而變陽者有先陽而變陰者有前後俱陽者有前後俱陰者陽症雖重而實輕陰症雖輕而實重先陰



而變陽者生先陽而變陰者死病症既殊將何以辨之

陽症之形必高突而腫起陰症之形必低平而陷下

症之色純紅陰症之色帶黑陽症之初起必痛陰

初起必癢陽症之潰爛必多其膿陰症之潰爛必多其

血陽症之收口身必輕爽陰症之收口身必沉重至于

變陰變陽亦以此消息斷斷不差也倘見紅腫而高突

乃陽症之癰也乘其肉腫初發毒猶未化急以散毒之

藥治之可隨手愈也發背而至橫決者皆因循失治以

致破敗而不可救陽變陰者多矣救癰如救火宜一時



撲滅切勿見爲陽症無妨而輕緩治之也方用急消湯
忍冬藤二兩茜草三錢紫花地丁一兩甘菊花三錢貝
母二錢黃柏一錢天花粉三錢桔梗三錢生甘草
水煎服一劑輕二劑又輕三劑全消不必四劑也此方
消陽毒之初起極神旣無迅烈之虞大有和解之妙世
人不知治法謬陽毒易於祛除孟浪用狼虎之藥雖毒
幸消散而眞氣耗損於無形往往變成別病乃醫者成
之也

人有背脊心發燥癢甚已而背如山重悠悠發紅暈如盤之

大此陰癱初起之形象也最爲可畏尤非前症陽癱可
比乃一生罪孽鬼祟纏身必然譎語胡言如見此症
候本不可救然而人心善惡成于一念之遷悔求生無
術亦見醫道無奇蓋陽症有可救之術陰症豈無可生
之理總在救之得法耳大約陰癱之症雖成于鬼祟之
纏身然必正氣大虛邪得而入之也設正氣不虛邪將
安入故救陰癱之症必須大用補氣補血之藥而佐之
散鬱散毒之品則正旺而邪自散矣方用變陽湯人參
二兩黃芪二兩金銀花半兩前湯代水附子一錢荆芥

炒黑三錢柴胡二錢白芍一兩天花粉五錢生甘草五錢并花水煎汁二碗服渣再煎服後陰必變陽而作痛再一劑而痛亦消再服一劑而全愈竟消滅無形也然人不致皮破血出斷不肯信雖然先用此等之藥以治發背毋論病人不肯服卽醫生亦不肯用或醫生知用此治療而病人之家亦不肯信往往決裂潰爛瘡口至如碗大而不可收始悔參芪之遲用矣予旣論此症又多戒辭勸人早服此方萬不可觀望狐疑喪人性命蓋陽毒可用攻毒之劑而陰毒須用補正之味用人參黃

其以補氣氣旺則幽陰之毒不敢入心肺之間而金銀
花性補善解陰毒得參芪而其功益大然非得附子則
不能直入陰毒之中而又出于陰毒之外毒深者毒深
又益之生甘草以解其餘毒然毒結于背者氣血之壅
也壅極者鬱之極也故加柴胡荆芥白芍天花粉之類
消痰通滯開鬱引經自然氣宣而血活痰散而毒消矣
人有背癰潰爛洞見肺腑瘡口黑陷身不能臥口渴思飲
人以爲陽症之敗壞也誰知是陰虛而不能變陽乎夫
背癰雖有陰陽之分及至潰濃之後宜補內不宜消外



則陰陽之症一也潰爛而至肺腑皆見此乃失補之故
使毒過于沿燒將好肉盡化爲痰肉耳肉瘻自必成瘻
肉而腐自必洞見底裏見此等症候亦九死一生之兆
也倘胃氣健而能食者猶可救倘見食則惡者斷無生
意雖然能用參芪歸熟亦有可生不可棄之竟不救也
方用轉敗湯救之人參二兩生黃芪一兩熟地二兩肉
桂二錢白朮四兩當歸一兩金銀花四兩麥冬二兩山
茱萸一兩遠志三錢北五味子一錢茯苓三錢水煎服
一劑而胃氣大開者卽可以轉敗爲功也倘飲之而稍

能健飯亦在可救惟恐飲之杳無應驗者是胃氣已絕
也不必再治之矣或飲之而飽悶少頃而少安者亦有
生機此方補其氣血而更補其肺腎之陰蓋陰生則陽
長陰陽生長則有根易于接續而後以金銀花解其餘
毒則毒散而血生血生而肉長肉長而皮合必至之勢
也倘日以解毒爲事絕不去補氣血之陰陽則陰毒母不
能變陽有死而已可勝悲悼哉

人有背癰將愈而瘡口不收百藥敷之絕無一驗人以爲
餘毒之未盡也孰知是陰虛而不能濟陽夫癰疽初起

別毒盛變膿則毒衰濃盡則毒化矣瘡口不收乃陰氣
之虛而非毒氣之旺世人不知治法尙以敗毒之藥攻
之是已虛而益虛也欲其肌肉之長何可得乎然亦有
用補法而仍不效者但用陽分之品以補其陽而不用
陰分之藥以補其陰也獨陰不長而獨陽亦不生癰疽
至膿血已盡則陰必大虛止補其陽則陽旺陰虛陰不
能交於陽矣陽有濟陰之心陰無濟陽之力所以愈補
陽而陰愈虛而瘡口愈難合也治法必須大補其陰使
陰精盛滿自能灌注于瘡口之中不用生肌外敷之藥

而瘡口之肉內生矣方用生膚散麥冬一兩熟地二兩

山茱萸一兩人參五錢肉桂一錢當歸一兩忍冬

兩白朮五分水煎服二劑而肉自長又二劑外口自平

又二劑全愈此方補陰之藥多於補陽使陰勝陽也

補陽仍是補陰之助以其能入陰之中交於陽之內也

忍冬藤非特解餘剩之毒取其能領諸藥至于瘡口之

間也

人有背瘡長肉瘡口已平忽然開裂流血人以爲瘡口之

肉未堅也誰知是色慾惱怒之不謹耳大凡瘡癰之症



最忌色慾次忌惱怒犯惱怒新肉有開裂之虞色慾新
肉有流血之害犯惱怒者不過疾病犯色慾者多致死
亡其瘡口開裂之處必然色變紫黑而流水之處必然
肉變敗壞矣此時必須急補氣血萬不可仍治其毒蓋
前毒未盡斷難收口復至腐爛新肉不堅而自湧決裂
也况發背新愈之後其精神氣血盡爲空虛若交合泄
精遂至變害非常舍補氣血又安求再活乎卽補氣血
以些小之濟欲收危亂之功大厦傾頽豈一木能支哉
故又須大劑救之而後可方用寒變回生湯人參四兩

黃芪三兩當歸二兩北五味子二錢麥冬二兩肉桂二錢

錢白朮二兩山茱萸五錢忍冬藤二兩茯苓一兩水煎

服一劑而肉不腐二劑而肉自生三劑而皮仍合四劑

瘡口平復切戒再犯再犯無不死者卽再服此方無益

也可不慎乎此救瘡瘍壞症仙丹不止療發背愈後犯

色之敗腐也人疑泄精以致決裂宜用熟地以大補之

何故反置而不用以熟地補陰最緩而症犯甚急所以

舍熟地之不可用此方服數劑之後各宜減半惟多加

熟地留爲善後之計耳



人有夏月生背癰瘡口不起脉大而無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不實喘促嘔吐人以爲火毒太盛也誰知是元氣大虛補不足以濟之夫癰分陰陽瘡口不起乃陰症而非陽症也脉大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水不足以濟火故陡渴陡汗也旣陰症似陽用參芪陽藥以助陽正氣足以祛陰而返陽矣何以愈補而反逆冷嘔吐此陰寒之氣正甚而微陽之品力不能勝耳非加附子辛熱之品又何能斬關入陣以祛蕩其陰邪哉方用助陽

消毒湯人參半觔黃芪一兩當歸四兩白朮四兩陳皮
一兩附子五錢水煎膏作二次服諸症退連服數劑瘡
起而潰乃減半又用數劑而愈此非治癰之法也然治
癰之法而輕治此等之症鮮不立亡可見治癰不可執
也大約陽癰可以消毒化痰之藥治之陰癰之病萬不
可用消毒化痰之味此實治癰之變法醫者不可不知
人有背生癰疽潰膿之後或發熱或惡寒或作痛或膿多
或流清水自汗盜汗膿成而不潰口爛而不收人以爲
毒氣之未盡也誰知五臟虧損血氣大虛之故凡人氣

血壯盛陰陽和平何能生毒惟其臟腑內損而後毒氣
得以內藏久之外泄及至癰疽發出其毒自不留內然
臟腑原虛又加流膿流血則已虛益虛觀其外瘡口未
歛似乎有餘審其內氣血未生實爲不足法當全補不
宜偏補夫一臟致有偏勝之虞也方用十全大補湯最
妙以其合氣血而兩補之耳然而用之往往不效者非
方之不佳乃用方之不得其法耳夫背癱何等之症豈
用尋常細小之劑所能補之必須多加分兩大劑煎飲
庶幾有濟予因酌定一方以請正于同人也用人參一

兩黃芪二兩白芍五錢肉桂二錢川芎三錢熟地二兩

當歸一兩白朮五錢茯苓五錢生甘草三錢水煎服

一劑有一劑之效世疑此方絕不敗毒如何化毒而生

肉不知癰疽未潰之前以化毒爲先已潰之後補正爲

急縱有餘毒未盡不必敗毒蓋敗毒之藥非寒涼之品

卽消耗之味也消耗則損人真氣寒涼則傷人胃氣真

氣損則邪氣反盛胃氣傷則穀氣全無又何能生長肌

肉哉惟十全大補湯專助真氣以益胃氣故能全效耳

且此方不特治背癰之已潰卽瘡瘍已潰者皆宜用之

肺癰門 四則

人有胃膈間作痛咳嗽時更加痛極手按痛處尤增氣急
人以爲肺經生癰也誰知是肺熱生癰耳夫肺爲嬌臟
藥食之所不到者也故治肺甚難肺熱害肺既可成癰
將何法療之療之法似宜救火以瀉肺肺藥不可入而
肺爲脾之子膠經未嘗不受藥也補其脾經之土則土
能生金也平其肝經之木則金不能尅木矣清其心經
之火則火不能刑金也三經皆有益于肺無損于金則
肺氣得養而後以消毒之品直解其肝中之邪何難于

