

東醫寶鑑

十五

東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

痲瘧

瘧病之源

內經曰夏傷於暑秋為痲瘧。○夏暑汗不出者秋成風瘧。○又曰魄汗未

盡形弱而氣燄穴俞以閉發為風瘧。○風瘧又曰風氣盛於皮

寒熱又曰因於露風乃生寒熱。○風瘧又曰風氣盛於皮

膚之內內不得通外不得泄。○風瘧又曰風氣盛於皮

則熱而悶名曰寒熱。○夏傷於暑秋必病瘧。蓋

傷之淺者近而暴傷之重者遠而深。瘧瘧者久瘧

也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄于外邪

氣內行至秋而發為瘧也。○瘧之為病以暑含

于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑

因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在於陰則

發寒并則病作離則病止。○作止故有時在氣則發

早在血則發晏淺則日作深則間。○日或發在太陽則

在背脊中或在腰脊雖上下遠近之不同或在太陽則

一也。陳○大法風暑當發汗。夏月多。在風涼處。歇

遂閉其汗。而不泄。故也。○病氣如。凌虐入之。狀

瘧疾形證

瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠。乃作寒慄鼓

欲飲。陽并於陰。則陰實。而陽虛。陽明虛。則寒慄鼓

移也。陽并於陰。則陰實。而陽虛。陽明虛。則寒慄鼓

氣勝。則骨寒。而腰痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛。則陰

外熱。陰虛。則內熱。內外皆熱。則喘而渴。故欲冷飲

也。○夫瘧之始發也。陽氣并於陰。當是之時。陽

虛而陰盛。外無氣。故先寒慄也。陰氣逆極。則復出

之。陽陽與陰復并於外。則陰虛。而陽實。故先熱而

渴。夫瘧氣者。并於陽。則陽勝。并於陰。則陰勝。陰勝

則寒。陽勝則熱。○衛虛則先寒。榮虛則先熱。表

邪多。則寒多。裏邪多。則熱多。表裏相

門。○人之榮衛。晝行於陽。夜行於陰。晝

衛行。到病所。不通。乃作寒戰。鼓振。頭

腰脊俱痛。此邪氣入於內也。寒戰。俱已。內外皆熱

頭痛如破渴欲飲冷煩滿欲吐自汗此邪氣發於外也
○暑瘧單熱濕瘧多寒寒瘧先寒後熱風

瘧先寒後熱餘皆先寒後熱

脉法

瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之弦遲者不可弦溫之弦多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之

數者風發也以飲食消息止之
○瘧脉自弦弦遲多寒弦數則為虛代散則死

多熱隨時變遷
○瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦訣有病久而脉極虛微而無力似

乎不弦然而必於虛數之中見弦但多痰虛微無力察可也
○瘧脉短者傷食弦滑者多痰虛微無力

為久瘧醫
○瘧脉遲緩者病自愈

寒熱先後

瘧理先寒而後熱者由夏傷於大暑其汗大出

皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱

也病以時作名曰寒瘧
○先熱而後寒亦以時作名傷於風而後傷於寒故先熱而後寒

曰溫瘧內○其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧謂熱

也

寒熱往來

病有洒淅惡寒而復發熱者何也曰陰脉不足陽往乘之何謂陽不

足假令寸脉微名曰陽不足假令尺脉弱名曰陰不足陽

新惡寒何謂陰不足假令尺脉弱名曰陰不足陽

氣下陷大抵陰中則發熱也○陽微則惡寒陰微

則發熱大抵陰中則發熱也○陽微則惡寒陰微

不足則陰往乘之故陰氣上入陽中則惡寒也○陽

不足則陰往乘之故陰氣上入陽中則惡寒也○陽

邪入而王氣不入裏而與陰爭乃陽勝而為熱也若

則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則

熱多半表半裏則寒熱相等乍往乍來而間作也

寒順行則發熱故分之氣者東方之氣也逆行則發

身後為太陽太陽者膀胱水寒也身前後為陽明陽

明者大腸金燥也少陽之邪在其中近後膀胱水

則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也陳
○甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起

則休作無
定時矣補

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃

皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行

於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是

以日作○衛氣與邪相并則病作與邪相離則

病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已

離於陽則熱已至次日又集而并合則復募原也瞞

○其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間

日乃作也○時有間二日或至數日發或渴或
不渴其故何也曰其間日者邪氣與衛氣客於六
府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者
陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴○三
日一發者受病一年間日一發者受病半年連日
發者受病一月二日連發住一日者氣血俱受病
也又曰三日一月一發陰經受病也最重明○陽為府

邪淺與榮衛並行一日一發○陰為藏邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積乃發或三四

日一發久則必為瘧母門

瘧發有晝夜早晏之異帝曰其作日晏與日早者何氣

一節而下衛氣一日一夜大會於脊背也每至於風府循

則滕理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以日此

作日稍益晏也其出於脊內注於伏膂之脉其

下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其

氣上行九日出于缺盆之中其氣日高故作日益

早也○陰為夜○陽為晝○榮衛夜行胃與腹故也○陽為

子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於未申或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須用藥

在內也從酉至子發或從午至酉發者邪在外也從午至酉發者邪

寅發者知邪在血分也

六經瘡

而夏傷於暑中秋必病瘡初不知何經受病隨其受

陽氣其證各殊在太陽經者謂之寒瘧治之多汗之在
陽明經者謂之熱瘧治之多下之在少陽經者謂之

風瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧發在夏至
後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者

此則不分三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前乃傷之重者遠而深也瘧者老瘧也故謂之

溫瘧亦曰風瘧此爲傷寒壞病其證先熱後寒

傳正○瘡屬三陽宜汗枝羌活湯麻黃羌活湯○陽明

胡桂湯柴胡加桂湯三陰溫瘧宜白虎桂枝

湯物
麻湯
○黃
太白
陽木
湯
或
小
柴
胡
合
四
物
湯
名
曰
柴
胡
四
物
湯
合
病
桂
枝
芍
藥
湯
桂
枝
石
膏
湯

三陽合病宜桂枝
黃芩湯以和之

枝羌活湯治太陽風甘草各一錢半右剉作一貼水

湯物
麻湯
○黃
太白
陽術
湯或
陽明
合小
病柴
桂胡
枝合
芍四
藥物
湯湯
桂名
枝曰
石柴
膏胡
湯四

三陽合病宜桂枝
黃芩湯以和之

枝羌活湯治太陽風甘草各一錢半右剉作一貼水

湯物
麻湯
○黃
太白
陽術
湯或
陽明
合小
病柴
桂胡
枝合
芍四
藥物
湯湯
桂名
枝曰
石柴
膏胡
湯四

三陽合病宜桂枝
黃芩湯以和之

枝羌活湯治太陽風甘草各一錢半右剉作一貼水

湯物
麻湯
黃○
白太
朮陽
湯陽
或明
小合
柴病
胡桂
合枝
四芍
物藥
湯湯
名桂
曰枝
柴石
胡膏
四湯

三陽合病宜桂枝
黃芩湯以和之

枝羌活湯治太陽風甘草各一錢半右剉作一貼水

湯物
麻湯
黃○
白太
朮陽
湯陽
或明
小合
柴病
胡桂
合枝
四芍
物藥
湯湯
名桂
曰枝
柴石
胡膏
四湯

三陽合病宜桂枝
黃芩湯以和之

枝羌活湯治太陽風甘草各一錢半右剉作一貼水

煎服

麻黃羌活湯

治太陽陽瘧無汗即前方去桂枝加麻黃也劑法服法同上

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑三棗二水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三棗二水煎服

白虎桂枝湯

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮發朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一合右剉作一貼水煎服

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂皮青皮陳皮川芎白芷半夏麴紫蘇葉赤茯苓白朮桔梗細辛

檳榔甘草各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴胡四物湯治三陰經溫瘧或夜發者柴胡生乾地

歸赤芍藥各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服

桂枝芍藥湯治瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂

泄經曰汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各

二錢右剉作一貼水煎服

桂枝石膏湯治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石

剉作一貼水煎服之

桂枝黃芩湯服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽

錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服

瘧晝發夜發宜分治益氣虛晝發宜加半夏黃芩○門補中

夜發宜柴胡四物湯湯坊見桃仁承氣湯

麻黃黃芩湯

治夜發瘧疾麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢

貼水煎臨卧服○桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之挑

有邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也

柴胡芎歸湯

治夜發陰瘧引陽分而散後服人參

梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分

水煎服

諸瘧證治

瘧有風瘧寒瘧熱瘧濕瘧痰瘧食瘧

風瘧

自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯

熱瘧

因暑勝熱多得之
一名瘧瘧亦曰暑瘧
宜入參白
湯崇苓湯寒門方見柴胡知母湯爭功散龍虎湯

門入

濕瘧

因冒襲雨濕汗出
不利宜五苓散方出
濕加浴得之寒熱相平
小便

痰瘧

因外感內傷鬱聚成痰
頭痛肉跳吐食嘔沫甚則
昏迷卒倒宜柴陳湯加草果或四獸飲冷附湯久

不止以二陳湯飲截之
門入參縮砂倍用白豆蔻進一
常以二陳湯飲截之門入參縮砂倍用白豆蔻進一

二貼自然寒熱不作
蓋白豆蔻能消能
磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也
指

食瘧

一名胃瘧因飲食失節
飢飽有傷所致寒已復熱
熱已復寒寒熱交併苦飢而
不能食食已支滿腹脹病以
日作

名曰寒熱善飢而
不能食食已支滿腹脹病以
日作

麴青皮或清脾飲小清脾湯又二陳
湯加青皮或清脾飲小清脾湯又二陳

勞瘧

即久瘧也寒熱微微寒中有熱熱中有寒
最難調
治由表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來經

年不差宜芎歸鱉甲散常山飲五勞元六和湯烏
頭七棗湯露薑養胃湯十將軍丸一補一發丹辰

砂元養胃丹諸口久瘧屬元氣虛寒蓋氣虛則寒
血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒

寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷寒
戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯酌飢諸

證悉愈若投清脾
截瘧多致不起

鬼瘧因感尸症客忤寒熱口作夢寐不祥多生恐怖宜
辟邪丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻

中

疫瘧一方長河相似或染時行變成寒熱須參運氣用
藥宜不換金正氣散寒方門如意丹五瘟丹瘧疸丸

三瘟方見

瘧瘧挾山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷因發狂或啞乍寒
乍熱乍有乍無南万多病此宜雙解飲子地龍飲

羌活蒼朮湯瘧疸
九疳方門觀音元端

痲瘡

者一老瘡也以其隔三日一發纏綿不去也綱○三

少陰經瘡也一作於寅申巳亥日者厥陰經瘡也

解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與

參術等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得

汗而出至足方是佳兆○屬陰最難得汗補藥力到

陰分宜用血藥引出陽分而散○古方多用峻劑恐

非所宜明○若感病極深雖得大汗所感之邪必

自藏傳出至府其發無時必亂而失期○若發於午

之後寅之前者血受病也為難愈○須漸釺早亦是

佳兆故治此病春夏為易秋冬為難○年非有他也以

汗之難易為優劣也○凡瘡經年不差謂之老

瘡必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛

乃瘡母也雖內虛非常山嶺擲決不能除但須製

熟則不損胃○老瘡九是也血虛者宜釺甲九有水

瘡者暫用消瘳元以補脾化痰湯藥輔之且量虛

實用老瘡飲○老瘡宜七棗湯釺甲飲子

參歸釺甲散○秘方清脾九經效瘡丹黃甲九

散邪湯

治風瘧初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘇葉羌活各一錢甘草五分右剉作一

貼入薑三葱白三莖煎露一宿早晨溫服

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘草各五

分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

交解飲

治寒瘧即雙解飲子也防見

果附湯

治脾寒瘧疾面青振寒草果附子炮各二錢半右剉作一貼入薑七棗二水煎服

草果飲

治寒瘧草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉甘草各一錢右剉作一貼水煎服

柴胡桂薑湯

治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各

一錢乾薑甘草各八分右剉作一貼水煎服

柴胡知母湯

治熱瘧及瘴瘧柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘草

草灸七分右剉作一貼入薑三梅二水煎
清晨服午前一服久瘡加人參當歸

爭功散

治熱瘡多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔
地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作一

貼入桃柳枝各五寸煎服未效
加過路葛藤五寸同煎服效

龍虎湯

治熱瘡火盛舌卷唇焦鼻如烟熏六脉洪緊
石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母

黃栢各一錢梔子八分半夏七分粳米百
粒右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴陳湯

治痰瘡柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤
茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼薑三棗

二水煎服

四獸飲

治七情聚痰五藏氣虛瘡久不已人參白朮
白茯苓陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗

各一錢右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包
裹水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進

數貼即效

冷附湯

五更疾無過是痰實而脾胃弱停于胃膈所以

子一箇炮去皮臍右切片分二貼每一貼入

露薑飲

治痰癰生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約

初澄者一上飲之或有痰吐任之即安

平陳湯

治食癰蒼朮半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓

棗二水煎服

清脾飲

治食癰柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚

三棗二水煎服此方乃小柴胡平胃二陳合而

為一也一方加常山二錢煎之露服五更截癰令

小清脾湯

治胃癰厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑