

本草綱目

一



民國九年春日

本草之新編

江寶實文堂書
陰莊藏板



南京大學圖書館藏
南京中医药大学图书馆版权所有

原序

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時卽旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故輯著醫學十種其一曰一源必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變藥亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神不然則歧多而用眩凡藥皆可傷人况於性最偏

駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目爲集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用或病其稍繁腫之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過劣其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書著備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其爲近今膾炙之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增改者半旁掇舊文叅以涉厯以擴未盡之旨書成名曰本草從新付之削刪庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其

餘數種當次第刊布與有識者商之

乾隆丁五歲三月上巳日啟冰與義洛遵程書於陝川之利濟堂



本草從新

藥性總義

凡酸屬水入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡酸者能濶能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能軟音悞堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

凡寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣爲陽味爲陰氣無形而升故



爲陽味有質而降故爲陰氣厚者爲純陽薄爲陽中之陰味厚者爲純陰薄

爲陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱陽氣上行故氣薄者能味

厚則泄薄則通陰味下行故味厚者能發熱泄於表厚者能發熱

涌泄爲陰辛散甘緩故發肌表能通利辛甘發散爲陽酸苦涌

同酸收苦泄故爲吐瀉鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽

輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰清陽出上竅本平天者親上上

濁陰出下竅本乎地者親下下竅七謂耳目口鼻

發濁陰走五臟陰受氣於五臟清陽發腠理散於皮膚故清陽

之濁陰走之清陽實四肢四肢爲諸陽之濁

陰歸六腑六腑傳化水穀此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生象氣薄者降

而收象氣厚者浮而長象味厚者沉而藏象味平者化而成上冬

秋象氣厚者升而生象氣薄者降

氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而下焦沉者引之以酒則浮而上至頭項中

物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也

根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥

根梢各別用之根梢各別用之或差服亦罔效

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心爲幹者內行臟腑枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡色青味酸氣躁

躁爲水性

屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽

經

肝與膽相表裏膽爲甲木肝爲乙木

色赤味苦氣焦

焦爲火性

屬火者皆入手

心與小腸相表裏

少陰心手太陽小腸經

心爲丙火

心爲丁火

色黃味甘氣香

爲

土氣

性屬土者皆入足太陰脾

足陽明胃經

脾爲戊土

脾與胃相表裏

胃爲己土

色白味辛氣腥

腥爲金性屬金者皆入手太陰肺

手陽明大腸經

肺與大腸相表裏

大腸爲庚金肺爲辛金

色黑味鹹氣腐

腐爲水氣所化

性屬水者皆入

足少陰腎足太陽膀胱經

腎與膀胱相表裏

膀胱爲壬水腎爲癸水

凡一臟配一腑

腑皆屬陽故爲

甲丙戊庚壬臟皆屬陰

故爲乙丁己辛癸也

十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥入諸經之部分也

人之五臟應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎爲肝母心爲肝子故入肝者併入腎與心肝爲心母脾爲心子故入心者併入肝與脾也爲脾母肺爲脾子故入脾者併入心與肺脾爲肺母腎爲肺子故入肺者併入脾與腎肺爲腎母肝爲腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

凡藥各有形性氣質其入諸經有因形相類者如蓮翹似心而肺之類有因性相從者如潤者走血分燥者入氣分本乎腎之類有因氣相求者如氣香入脾氣焦入心之類有因質相同者如頭入頭幹入身如紅花蘇木汁似血而入血之類自然之理可以意得也

有相須者同類而不可離也
也惡者奪我之能也畏者受彼之制也反者兩不可合也

如黃蘖知母破故紙胡桃之類爲使者我之佐使

亦可平柔能制剛也

肝苦急急食甘以緩之
肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之

肝爲將軍之官其志怒其氣急急則自傷反爲所苦故宜食甘以緩之則急舒

木不宜

以辛散之順其性者爲補逆其性者爲瀉肝喜散而惡收故辛爲補而酸爲瀉

心苦緩急食酸以收之

心藏神其志喜喜則氣緩而心虛神散故宜食酸以收之心欲耎急食鹹以耎之用鹹補之以甘瀉之

心火太過則爲躁越故急宜食鹹以耎之蓋鹹從水化能相濟也心欲耎故以鹹耎爲補心苦緩故以甘

緩爲脾苦溼急食苦以燥之脾以運化水穀制水爲事溼勝脾則反傷脾上故宜食苦以燥之脾

脾貴充和溫厚其性欲緩故宜食甘以緩

欲緩急食甘以緩之用苦瀉之以甘補之

脾貴充和溫厚其性欲緩故宜食甘以緩

之脾喜甘而惡苦故苦爲瀉而甘爲補也肺苦氣上逆急食苦以泄之肺主氣行治則上逆於肺故急肺欲收急食酸以收之用酸補之以辛瀉之宜食苦以降泄之肺應秋氣主收斂故宜食酸以收之肺氣宜聚不宜散故酸收爲補辛散爲瀉腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎爲水藏藏精者也陰病者苦燥故宜食辛以潤之蓋辛從金化水之母也能開腠理致津液者以辛能通氣也水中有真氣惟辛能達之氣至水亦至故可以潤腎之燥腎欲堅急食苦以堅之用苦補之以鹹瀉之腎主閉藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之也苦能堅故爲補鹹能更堅故爲瀉此五臟補瀉之義也

酸傷筋酸走筋過則傷筋而拘攣辛勝酸辛爲金味故勝木之酸苦傷氣苦從火化故傷肺氣火旺金也又如陽氣性升苦味性降氣爲苦遏則不能舒伸故苦傷氣鹹勝苦鹹爲水味故勝火之用鹹勝之此自五行相制之理若以辛助金而以甘泄苦亦是捷法蓋氣味以辛甘爲陽酸苦鹹爲陰陰勝者制之以陽陽勝

者制之以陰何非勝復之妙而

酸爲木味故辛

其中宜否則在乎用之權變爾

甘傷肉酸勝甘

酸爲土之甘

傷皮毛

辛能散氣

故傷皮毛

苦勝辛

苦爲火味故勝金之辛

傷

筋

食鹹則渴

傷血可知

甘勝鹹

甘爲上味故勝水之鹹

傷

筋

辛走氣氣病無多食辛

五味論曰多食之令人洞心

透心若空也

傷

筋

多食鹹

血得鹹則凝結而不流五味論曰多食之令人渴

骨重難舉矣

傷

筋

陰也骨屬腎亦陰也骨得苦則沈陰欲盛

論曰多食之令人變幅

甘走肉肉病無多食

傷

筋

甘

甘能緩中善生脹滿五味論曰多食之令人惋心

心悶也酸走筋筋病無多食酸

收縮

筋得酸則縮五味論曰多食之令人癰瘍小便不利也

此五病之所禁也

多食鹹則脈凝泣

溫而變色

水能尅火故病在心之脈與色也五味篇曰心病禁鹹多食

苦則皮槁而毛拔

火能尅金故病在肺之皮毛也五味篇曰肺病禁苦多食辛則筋急而

爪枯 金能剋木故病在肝之筋

多食酸則肉脹

而脣揭皮

脾厚也

手足脰脰之謂

木能剋土故病在

脾之肉與唇也

五味篇曰脾病禁辛

多食甘則骨痛而髮落

土能剋水故病在腎之骨與

髮也五味篇曰腎病禁甘

此五味之所傷也

脾之肉與唇也 五味篇曰脾病禁辛
土能剋水故病在腎之骨與 肾病禁甘

多食甘則骨痛而髮落 五味篇曰腎病禁甘

此五味之所傷也 五味篇曰腎病禁甘

風淫於內治以辛涼佐以苦目以甘緩之以辛散之

風爲木氣 金能勝之

故治以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛

甘益氣也

木性急故以甘緩之

風邪勝故以辛散之

辛熱淫於

內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之 热爲火氣水能勝之故治以鹹寒佐

之

之故治以鹹寒佐

之

之故治以鹹寒佐

之

之故治以鹹寒佐

之

以甘苦甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也熱

盛於經而不斂者以酸收之熱鬱於內而不解者以苦發之

之

之

之

溼淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之 溼爲土氣燥能除之

故治以苦熱酸從木化制土者也故佐以酸淡以

火

火化也以淡泄之者淡能利竅也

火

火

苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也 相火畏火也故宜治以

火

火

火

火

火

以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之 鹹冷苦能泄火辛能散

之

之

之

之

之

火故用以爲佐酸收苦
發義與上文熱淫同治燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下
燥爲金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛水受
內故當以苦下之

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之
寒爲水氣土能制水熱能勝寒故治以甘熱甘從土化熱從火化也佐以苦辛等義如藏氣法時論曰醫
苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之也

此六淫主治各有所宜也

凡藥須俟製焙畢然後秤用不得生秤溼潤藥皆先增分兩燥
乃秤之

凡酒製升提彊製溫散八鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂童
便除劣性而降下米泔去燥性而和中利潤枯生血蜜甘緩益
元陳壁土藉土氣以補中州麪煨麴製抑酷性勿傷上膈黑豆

草湯漬竝解毒致令平和羊酥豬脂涂燒咸滲滑容易脆

去癟者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

本草所謂黑豆
烏豆皆黑大豆

也蘇頌曰緊小者爲雄入藥尤佳宋頌曰小者力更佳皆謂黑

大豆中之較小者非世俗所稱馬料豆也世俗所謂馬料豆即

稽豆也稽豆性溫熱味擣劣乃豆中最下之品以其野生價最

賤北方甚多故餵馬用之蓋凡豆皆可作馬料而莫有如此

之價廉也○今藥肆中煮何首烏不用黑大豆而用稽豆甚謬

竝有將煮過首烏之稽豆僞充淡豆豉尤屬可笑○市醫每有

以稽豆皮加入煎劑者不知黑大豆之皮有可用稽豆之

皮無可用也因時珍混註稽豆卽小黑豆以致後人多誤

收藏高燥處又必時常開看不令黴蛀

用藥有宜陳久者

收藏高燥處又必時常開看不令黴蛀

有宜精新者如南星半

夏麻黃大黃木賊櫻櫻榔芫花槐花荆芥枳實枳殼橘皮香藥佛

手柑山茱萸吳茱萸燕窩蛤蚧沙糖壁土秋石金汁石灰米麥

酒醬醋茶蘆葦艾墨蒸餅諸麪諸膠之類皆以陳久者爲佳或

取其烈性減或取其火氣脫也。凡煎阿膠鹿膠等止宜微火令氣太重雖陳之至久火氣終不能脫服之不惟無益反致助火傷陰也。○煎膏子亦宜微火并不可久煎。○陰虛有火之人應藥餌食物最忌煎炒脩合丸子宜將藥切絕薄片子蒸爛熟擣爲丸若用火製焙不但不能治病反致發火傷陰舊疾更作也。餘則俱宜精新若陳腐而欠鮮明則氣味不全服之必無效。唐耿湧詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品有新陳之不同用之貴各得其宜也。