

夏

傷寒世驗精法

傷寒世驗精法卷三

河東張春臺吾仁纂

晉州紀 鍾恬荈校

男 瑚夏尊錄

前之十六症皆傷寒之正名以後除煩傷寒四症并續類傷寒四症外其餘百般症名皆由於前之十六種病內傳變所致也假如變出黃斑譫語結胷痞滿等症卽於黃斑譫語結胸痞滿條內檢閱而治之餘皆倣此

類傷寒四症

一痰症

痰者津液所化、蓋由風傷於肺、肺氣不清而生痰、濕傷於脾、脾氣凝濁而生痰、痰之為病、其人憎寒壯熱、惡風自汗、狀似傷寒、但氣上衝咽而不息、脈有寸浮者、亦有寸伏者、以意參之、又有寸口沉滑、或沉伏者、必痰垢膩於上膈、右手關部滑大、或弦滑者、必涎飲積於中脘、但頭不疼、項不强、若涎多者、亦隱隱頭疼、此為異耳、用亦有痰厥頭疼、或在右、或在左、但柴胡半夏湯有加減法

柴胡 半夏各一錢半 黃芩 白朮 麥門冬各一錢

甘草五分 大棗二枚 生薑三片 水二鍾煎至八分溫服

一方除白朮加茯苓橘紅各一錢痰唾如膠者加金沸草前

胡各一錢咽喉不利加桔梗一錢喘嗽去白朮加杏仁桑白

皮各一錢濁痰凝結膈上加瓜婁仁貝母各一錢素飲酒熱

鬱於內者加黃連一錢胸膈痞悶加枳壳一錢兼食積加山

查神麴各一錢痰伏於脇下作痛加白芥子一錢口燥渴加

天花粉一錢無汗加防風蘇葉冬月或天氣尚冷可加麻黃

各一錢有汗加桂枝一錢痰氣壅盛喉中如牽鋸者加竹瀝

半酒盞薑汁一匙若脈大痰涎壅盛而氣上衝咽不得息者

宜吐之用

瓜蒂散

瓜蒂

炒

赤小豆

各等分

共爲細末用香豉煎湯調一錢七

如無香豉以鹽一撮和白湯一二碗頓服急用指撻之隨吐得快乃止諸亡血虛家不可用此

二食積

蓋由脾胃伏熱因食不化以致發熱惡寒頭疼與傷寒相似但身不疼左手人迎之脉平和右手氣口之脉緊盛知有食也

用五積散主之

左手寸口沉有停飲右手脉或浮大皆是有寒積停飲

五積散

川芎

桔梗

陳皮

枳殼

當歸

古方有
桔梗此

無取義
處用不
用俱可

加減法

芍藥

各一錢

半夏

一錢
月忌用

蒼朮

一錢半

白芷

茯苓

厚朴

麻黃

夏月用
蘇葉

人參

各八分
少亦可

官桂

五分

甘草

五分

生薑三片水二鍾煎至八分溫服

再乾薑

四分

古方用大料剉碎以文武火炒令香熟收貯旋用余以此法不便又難增減故依常用之

如夏月除乾薑官桂加黃連

一錢

天氣暄熱或春分後雖

無汗常去麻黃換蘇葉

一錢

腹脹滿不快或大便不去除

人參加山查神麴枳實

各一錢

潮熱或肌熱加柴胡乾薑

各一錢

服此湯後表熱未除口渴心腹滿痛大便閉者用

大柴胡湯方見潮熱條量虛實下之

如食在上脘不化胸滿嘔吐者用瓜蒂散或鹽湯探吐之
方見前條

三虛煩

其人素弱有勞傷因而損氣氣衰則火旺內經曰陰虛生內熱所以內有熱則應於外矣故類傷寒耳但無惡寒頭疼身痛之症蓋表裏皆虛不可汗下若耗損真元多不可救雖虛煩不安不可太攻其熱恐熱去則寒起活人書云止宜服竹葉

石膏湯方見中暍條

熱渴及夏月以本方竹葉石膏湯加減用其餘中益氣

湯按症
投藥最
為穩
若大便
秘澁以
竹葉石
膏湯下

如人虛脉弱者陪用人參汗多加黃芪一錢陰虛晝靜夜煩

加知母黃栢各一錢當歸生地黃各二錢芍藥一錢嘔吐去

石膏加茯苓一錢陳皮八分有鬱痰加貝母一錢濁痰加瓜

婁仁一錢口渴加天花粉一錢大便澹或瀉加白木一錢澤

瀉八分服涼藥後脉愈大而空虛熱愈盛而躁渴不可與冷

水須獨用上好人參三錢煎湯調五苓散方見汗痺條

若上盛下虛躁煩自利手足冷於竹葉石膏湯中去石膏加

附子二錢名既濟湯

若傷寒汗吐下後虛煩不得眠者用梔子豉湯方見下後發熱條

若胸中懊憹不安，加竹茹一彈丸，薑汁半匙。

婦人妊娠新產，挾血虛煩，用四物湯。方見妊娠條

本方內加人參、甘草、麥門冬、淡竹葉煎服。

若陰症內寒外熱，肢節痛，口不燥而虛者，用

陰旦湯

芍藥

黃芩

乾薑

各二錢炮

桂枝

三錢

甘草

一錢

大棗

二枚

水二鍾煎八分溫服

四脚氣

脚氣發
先從足

天之風寒暑濕之氣蒸於足，發則類傷寒，身熱頭肢節疼重，大

上起與傷寒先起自頭疼者不同

經云脚氣冲心即死是也

子金續命湯

便秘或嘔但初病起於脚膝屈弱不能移動此為異耳最忌補劑及藥湯淋洗併令草藥攤會若犯此禁則毒氣入心小腹頑痺不仁或氣喘嘔吐如不急治則死在旦夕矣用

防風

芍藥

白朮

各七分疼甚不用白朮

川芎

防己

一錢

桂枝

三分

麻黃

夏月用蘇葉

羌活

各八分

蒼朮

八分有汗忌此

甘草

五分惡心不用

大棗二枚生薑三片水二鍾燈心一丸煎至八分粗濾清

再加生薑自然汁三匙最効

要詳此

陰陽濕

風而施

治法

無汗用

獨活以

去腿膝

之風蓋

風從汗

散也

若人弱

大便秘

不用大

黃麻黃

白朮亦

勿用夏

若暑中三陽所患必熱脉來洪數者去桂枝麻黃加黃連黃

芩柴胡各一錢黃栢一錢五分

若寒中三陰所患必冷脉來遲澹者加附子二錢

若起於濕者則行起忽倒足脛或腫膝或枯細加木瓜檳榔

牛膝各一錢

若起於風者脉來浮弦則無汗加獨活一錢元氣虛者加人

參一錢虛甚者二錢大便秘去麻黃白朮加大黃二錢壯實

加三錢年老怯弱之人血燥風秘津液少大便堅者用

脾約丸

日麻黃
尤忌之

類傷寒
四症總
論

大黃

枳殼

厚朴

芍藥

各五錢

杏仁

二錢去皮尖

麻仁

三錢淨肉

爲細末煉蜜爲丸如棗豆大每服三十九溫

湯送下未利再加得快方止

或問類傷寒四症者是何所類也抑何所異耶然一曰痰症發則增寒壯熱惡風自汗此所以類也但胸滿氣上冲咽不得息寸口之脉或有浮者亦有伏者惟頭不疼項不强若涎多者亦隱隱頭疼而不甚此所以異也二曰食積發則亦頭疼身熱惡寒此所以類也但心腹飽悶或手按之則痛左手關前人迎之脉平和右手關前氣口之氣緊盛故指掌圖云傷

食傷寒惟辨人迎氣口又東垣言傷食惡食傷食明矣此所以異也三曰虛煩諸虛煩熱者至因七情內傷腎水不能上升心火不能下降此陰不足而陽有餘故使心中鬱悶不安發熱困倦此所以類也但不惡寒不頭疼不身痛衄血虛者亦有脅稜太陽額角眩運而痛氣少懶言或虛汗喘促此所以異也四曰脚氣始作亦頭疼身熱肢節痛大便秘或嘔此所以類也但病時起於脚膝屈弱不能移動蓋寒溫之氣蒸於足若感於寒所患必冷感於暑所患必熱此所以異也學者於此四症必須詳玩明辨不可苟且以悞人耳

新增類傷寒四症

一瘡毒

毒滯經絡自然生熱

仁人存心必不
自是獨
怪誤人
者其執
拘如王

經曰諸痛痒瘡皆屬心火。若夫心火熾盛則津液乾涸氣血凝濁經絡不通孔竅閉塞而生熱矣。又曰諸脉浮數當發熱而酒淅惡寒與傷寒無異。但飲食如常驗其頭面身體手足或隱處有紅腫小瘡即須認其端的。若是發背對口始覺如粟米不過二三日則大如盤矣。若是疔瘡不與速治則毒氣散蔓而莫之救也不可作傷寒發汗或投寒涼之藥醫倘不專急令病家別請外科治療庶不悞人之性命也。

安石也

噫

大便黑

小便利

自是蓄

血

須要審

的日前

曾有此

情由否

二瘀血

人有惡寒發熱狀類傷寒診得脉芤濇脇下與少腹癢痛手不可近大便黑小便利者此血症諦也蓋脇與小腹乃屬肝部肝爲血海故有瘀血蓄積於此醫須審目前曾有跌墜挫閃拳踢之情卽不可作傷寒治之與其發汗并服寒涼之劑益血得熱則行得寒則凝倘時或瘀血上衝昏迷不省良久復甦此皆血症之候也宜服行氣活血之藥

三勞發

其人元氣寡弱素有痰火結核於腠縫或腋下或臂膊上畧有

動。作。勞。傷。則。一。時。硬。腫。疼。痛。前。寒。發。熱。似。傷。寒。者。其。脈。弦。數。
無。力。若。腿。縫。有。核。腫。痛。者。俗。呼。謂。之。腿。勞。發。若。腋。下。及。臂。膊。
有。核。腫。痛。者。有。無。核。而。但。作。寒。熱。者。此。皆。謂。之。勞。發。也。蓋。因。
氣。血。虛。弱。勞。役。所。致。也。斯。勞。發。之。名。乃。世。俗。傳。襲。之。言。耳。卽。
非。正。病。名。也。所。治。之。法。不。可。汗。下。但。宜。補。血。養。氣。茲。陰。降。火。
清。痰。和。解。之。劑。其。病。自。療。矣。有。云。勞。發。不。須。服。藥。待。週。時。則。
自。然。微。汗。而。解。此。說。亦。驗。仁按歇養亦可但久久循此法氣
血日加損傷耳不如服藥好

四痘疹

凡幼穉之兒并年長之人。忽發熱憎寒。頭疼身痛。唇紅臉赤。呵

欠喘欬狀類傷寒不可遽施汗下先須問其曾出蛻瘡否如未出者當驗其尻骨耳尖并足皆冷又觀耳後有紅脉赤縷爲的卽令專門調理若已出過方可作外感治之庶不差悞矣

仁按雖要驗其曾出過否尤當驗其在痘疹流行之時爲准

或問續類傷寒四症與前類傷寒四症二者其害孰甚然續類者尤甚於前類者何哉夫以痰症食積多因實邪醫有不逮尙能少緩虛煩脚氣總生勞感藥或欠工猶堪拯療若乃瘡瘍之症或發癰毒或生疔疽妄投湯藥毒氣散蔓必致死亡瘀血之症惡物內蓄穢毒在中悞於汗下昏暈倒仆豈得

續類四症尤甚於前類但四者