

醫學從眾錄

會文堂書局
印行

卷五

和中散 治冷熱痢腹痛裏急

附子 一分四分

川連 一分四分

乳香 一分

共為末米飲湯下不止用青皮再下二服

黑豆湯 治赤白痢服藥不止

黑豆 炒去皮

甘草 二兩

用綿裹入湖水煎二杯分二服

醫學從衆錄卷六

傷暑

夏日炎炎耗傷元氣故病必體倦脈弱身熱自汗煩躁面垢唇青坐臥不安以動而得之為中熱靜而得之為傷暑熱陽而暑陰也其實本確蓋以暑字從日暑即熱也何必分名但動靜二字是陰陽分別茲仍分動以得之靜以得之以為此症提綱

何謂動以得之長途赤日荷重作勞因而致病如大熱 傷暑而發熱頭痛與傷寒症同但傷暑脈浮而數傷寒脈沉而遲以此為辨 同義也大渴脈浮盛自汗以白虎人參湯主之更加身體重者是暑而按濕宜蒼木白虎湯主之若有吐瀉腹痛此方不可輕用也若前症發熱身疼口燥咽乾或吐或瀉宜黃連香薷飲主之又有暑風症因暑氣鼓激痰火塞碍心竅以致卒倒不省人事宜吐之或以千金消暑丸灌之

白虎湯

見傷寒

一加人參二錢名白虎人參湯治汗出惡寒身熱大渴等症一加蒼木二錢名蒼木白虎湯治汗出身

熱足冷等症

黃連香薷飲

方見

去黃連名香薷飲治同

暑風發搐加羌活秦艽各一錢

瀉利加白朮茯苓各一錢五分

汗不止加白朮一錢五分炙黃耆三錢

心煩加梔子硃砂各一錢

嘔吐加半夏二錢黃耆陳皮各八分薑汁少

許

何謂靜以得之避暑於深堂大廈為陰寒所逼暑不得越手足厥逆者大順散主之霍亂吐瀉口渴者五苓散主之不渴者理中湯主之亦有以二湯送下六一散三錢者巧法不可言傳也

大順散

乾薑一錢

甘草八分

杏仁六分

肉桂六分

共為末每服五錢水一鍾煎七分服如煩躁井花水調下

三四五錢

又有遇夏即病秋後即愈是暑傷元氣如早不遇或日則得雨露則提名曰注夏症宜補中益氣湯照薛氏醫按去升麻柴胡加參冬一錢五分黃柏各五分炮薑三分服三四劑又生脈散清暑益氣湯六一散皆却暑之良方一切暑病不可須臾離之學者當於三方求其奧旨難以殫陳

脈法

傷暑脈洪而虛

大蘇一汲水方

治中暑法

大蘇一把同新黃土研爛以新汲水和之漚去渣灌入即活凡中暑傷暑不可便與冷物俟稍甦方可投冷物則中氣運動無患也

田中乾泥團臍方

治中暑昏眩煩悶欲絕急救法取田中乾泥做一團堆在病人肚上使少壯人撒尿於泥團肚臍

中片時即得甦矣後不可飲冷湯須進溫米湯

絲瓜白梅方

治中暑霍亂

絲瓜葉一片

白霜梅一枚

右同研極爛將新汲水調服入口立瘥切不可飲熱湯

陳皮藿香湯

治傷暑急霍亂吐瀉方

陳皮五分 蒼香五分 右用土淨清水二杯煎一杯服之立愈

扁豆飲 治傷暑取扁豆葉搗汁一碗飲之立愈

鹽薑湯 治傷暑霍亂上不得汗下不得瀉身出冷汗危在頃刻者

食鹽一兩 生薑五錢 同炒變色以水一大碗煎服吐出自愈不可熱服好後切不可遂吃飯食俟候極後方可吃稀粥

取新汲水法俱見前 治中暑昏眩煩悶欲絕急救挖地深三尺取新汲水傾入坑內攪濁飲數碗即愈

腫症腫者腫於外脹者脹於內二症宜分看然二症相因亦宜合看

腫者皮膚腫大古人有氣水之分其氣滯則水不行水不行則氣愈滯二者相因為病水脹為以按其腹面不起者為氣腫按其腹面而起如囊裏水之狀者為水腫蓋水之於氣說以水在肉中如糟如泥之象未必如水囊之比按之隨起惟虛與之氣其速乃然余聞思之久知二說亦不必拘大抵腫機則按之隨起腫甚則按之不起兩脇及轉動之處按之即起足面及膝股內則按之不起辨症不必以此為憑當於小便之利與不利以分陰陽身之多熱與多寒脈之洪大與細微以分寒熱病之起於驟然與成於積漸及年高多病與少壯無病之人分其虛實以先腹而後及四肢或先四肢而後及於腹分其順逆蓋岳云水氣本為同類治水者當兼理氣氣逆則水自化也治氣者亦當兼行水以氣行而水亦行也此症當與癰閉症參看 初患腫病氣喘不得臥以五皮飲為第一方蓋此方以皮治皮不傷中氣所以為妙 若腫而兼脹小水不利宜胃苓湯主之或以四苓散以半熟蘇搗丸服極妙五皮散 按上身腫宜發汗加蘇葉荆芥秦艽各一錢五分 下身腫宜利水加赤小豆木通各一錢五分防己一錢口渴多熱小便不利為陽水加滑石木通桑前子各一錢五分木香五分 不渴小便自利多寒為陰水加白朮蒼朮各二錢附子乾薑木香各一錢 脈滑實腹脹滿加坐腹子一錢五分白朮八分枳實一錢半夏二錢

婦人經水不調而腫是血化為水名水分加紅花八分桃仁香附各一錢五分婦人經水通斷即腫是水化為血名
水分加當歸三錢五靈脂醋炒一錢五分香附一錢五分 按服此方愈後必加減腎氣丸及六君子湯之類收功

胃金散

俱見

四苓散如味為丸

白水炒一兩

茯苓二兩

豬苓一兩

澤瀉一兩

研末以半熟麻為丸如菰豆大開水送下三五錢

腫症積漸而成及久而不愈氣喘口渴不臥腹脹小便短少大便微滯一切危症不外薛氏加減腎氣丸主之 張景
岳曰內經云腎為胃關關門不利故聚水而從其類也然關門而何以不利也經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化
則能出矣夫所謂氣化者即腎中之氣也即陰中之火也陰中無陽則氣不能化所以水道不通溢而為腫故凡治氣
者必先治水治水者必先治氣若氣不能化則水必不利惟下焦之真氣得行始能傳化惟下焦之真水得位始能分
清求之古法惟薛立齋先生加減腎氣丸誠對症之方也余遵用之無不見效

薛氏加減腎氣丸

熟地四兩

茯苓三兩

山萸肉

山藥丹皮

牛膝澤瀉

車前

肉桂兩

附子五錢

煉蜜丸如

桐子大每服三錢開水送下一日兩服

如素稟陽盛三焦多火煩渴面赤喘嗽服清膏此溫熱相因陰虛之證去

桂附加參冬主之醫學心悟云下焦濕熱去桂附加黃柏蛤蚧粉最妙

麻黃附子湯

方見

去附子加杏子石膏名杏子湯

又明醫指掌云臍勢大盛內而膀胱外而陰囊相連緊急阻塞道路雖加利水之劑苦無一線之通病何由去必開大
便以逐其水隨下而隨補則病已去而脾無恙漸為調理庶可得生真母守利水之舊規也如臍勢未盛還以利水為
上策 按此法惟少年體壯可以偶用否則不可輕試

脈色

脈沉遲大便滑小便利口不渴面青白為陰 脈沉數大便燥小便赤口渴面赤為陽 大抵脈喜平大忌遲細 仲景云水腫脈浮者死謂腫盛皮膚甚厚脈浮於皮毛之外輕捫之如隔一紙是死脈

腫脹危候

大凡水腫先起於腹而後散四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者難治 掌腫無紋者死 大便滑泄水腫不消者死 脊黑身種黃焦者死 臍腫突出者死 缺盆平者死 陰囊及莖俱腫者死 脈口絕張足腫者死 足跗

腫膝如羊者死 肚上青筋見滿後腹腫者死 男從身下腫上女從身上腫下皆難治

燈草薤白湯 治腫脹

燈草 一大把先將水四碗煎至二大碗

薤白子 一兩

砂仁 二錢

將二味研末傾入燈草湯內略滾即盛入壺內慢慢吃下

吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便長腫即退

脹症 宜冬看

脹者心腹脹滿實者脹起於驟然便溺脘滑而實宜散之消導之攻下之虛者脹成於積漸小便利大便滑脈滑小或微病在中焦以冬未補之病在下焦以往附吳美黃溫之或兼行導之品而脹愈並治亦可

腹而屬熱脈實而滑者宜飲之

蘇清飲

枳殼 二錢

薑朴 五錢

大腹皮 一錢

白芥子 五七分或

茯苓皮 二錢

萊菔子 生搗一錢如中不苦服能食者不必用

澤瀉 二錢

陳皮 一錢

水煎服

脹而屬寒者胃冷湯主之若小便不利者四苓散以導為也
脹而屬七情所致者宜四七湯主之逍遙散主之

四七湯

半夏三錢

茯苓三錢

厚朴二錢

蘇葉一錢

生姜二錢

水煎服

此方妙在紫蘇葉一味辛以散結香

以醒脾而順氣消脹行水乃其餘事

逍遙散

方見

此症宜加半夏二錢以降逆氣加生麥芽二錢以達肝氣蓋夢先春而萌芽得春生之氣最早也

脹而屬虛者脈微弱細小喜摩按二便利氣衰言微宜六君子湯理中湯合八味丸服之

單腹脹死症也或青年壯健起於驟然若心下堅大如盤者以金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯直搗其痰水氣

血之巢穴嗣以枳朮散消補並施可救十中之一然此猶實症也若虛症難治攻之則速其危補之愈增其脹余嘗得

有消鼓丹如白朮一兩試用四五劑不增脹方可議治但消鼓丹方中陽起石無真硫磺非從後來亦不配致效方亦

不列又名鼓脹以外實中空其狀如鼓也又名蠱脹易曰蠱壞極而有事也人病蠱者脾土敗壞身不即死復當事

也事猶病也

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

方見金匱

枳朮散

方見金匱

白朮四兩

枳實二兩

研末每服三錢穀芽湯送下

腫家

喜浮大忌虛小餘參看腫症脈

蠱齒牙更散 治五臟神方

蘿蔔子四兩明礬一兩牙皂一兩沉香五錢枳殼四兩大黃一兩琥珀一兩右共為末每服一錢隨病輕重加減雞鳴時溫酒送下薑湯亦可後服金匱腎氣丸調理收功

蘿蔔子四兩金清石散 治水腫

陳芭蕉去筋千金子去油滑石二分共為細末以腐皮包滾水送下一服全愈

黃牛糞散 治腹脹用四五月時黃牛糞陰乾微炒黃香為末每服一兩煎半時溫酒服之不過三服即愈

胡蘿蔔米酒散 治中滿腹脹

陳胡蘿蔔一個糗米一升作酒待熟用胡蘿蔔於炭上炙熟入酒浸之如此五六次將熟燒灰存性為細末每服三錢酒下

豬肚大蒜湯 治腹脹

雄豬肚子一個入大蒜四兩檳榔研末砂仁研末木香二錢砂鍋內用河水煮熟空心服豬苓立效

橘葉青鹽湯 治肝氣脹

烏梅三個鮮橘葉三錢青鹽三分川椒二錢水煎空心服

蝦蟆砂仁散 治氣脹將大蝦蟆一隻破開用大砂仁填滿腹中黃泥封固炭上煨紅冷定去泥研末陳皮湯調服故

蘿蔔砂仁散 治氣脹

蘿蔔子二兩搗研以水漚汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又晒凡七次為末每米湯送下一錢

四螺膽散 治一切腹脹肚飽發虛

蘿蔔子二兩搗研以水漚汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又晒凡七次為末每米湯送下一錢

四螺膽散 治一切腹脹肚飽發虛

蘿蔔子二兩搗研以水漚汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又晒凡七次為末每米湯送下一錢

四螺膽散 治一切腹脹肚飽發虛

蘿蔔子二兩搗研以水漚汁用砂仁一兩浸一夜炒乾又浸又晒凡七次為末每米湯送下一錢

太田螺一個 雄黃一錢 甘遂末一錢 麝香一分 先將藥末用田螺搗如泥以麝置臍放藥臍上以物壓之東好待小便大通去之重者用此相兼小便大通病即解矣

消渴

傷寒太陽症消渴小便不利宜五苓散厥陰症消渴宜大承氣湯之類與雜病之消渴名同而病異宜分別之 經云心移熱於肺傳為鬲消者腎名為上消以白虎湯加人參治之又云大腸移熱於胃善食而瘦者腎謂為中消以調胃承氣湯下之下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏或飲一升溺一升飲一斗溺一斗以腎氣丸主之 趙氏曰治消之法無分上中下先治腎為急惟六味八味及加減八味九種症而服降其心火滋其腎火則渴自止矣白虎承氣皆非所治也 或曰人有服地黃湯而渴仍不止者何也曰此方士不能屏其經墨而更其道也蓋心肺位近宜制小其服肝腎位遠宜制大其服如上消中消可以前九種而治之若下消已極大渴大燥須加減大八味之料一觔肉桂一兩水煎六七椀意欲冰冷飲之睡熟而渴如失矣處方之制存乎人之變通耳 或問下消無水用六味又以滋少陰腎水矣又如附子肉桂者何蓋因命門火衰不能蒸腐水穀水穀之氣不能薰蒸上潤乎肺如釜底無薪鍋蓋乾燥故渴至於肺亦無所累不能四布水精並行五經其所飲之水未經火化直入膀胱正謂飲一升溺一升飲一斗溺一斗觀其尿味甘而不鹹可知矣故用桂附之辛熱壯其少陰之火灶底加薪枯龍葵薄橘苗得雨生意維新惟明者知之昧者鮮不以為迂也 張隱菴謂志聰本朝人曰有脾不能為胃行其津液肺不能通調水道而為消渴者人但知以清涼藥治消而不知脾喜燥而肺惡寒試觀泄瀉者必渴此因水津不能上輸而惟下泄故爾以燥脾之藥治之水液上升即不渴矣故以涼潤治渴人皆以燥熱治渴人所不知也

附案

辛亥歲到義溪有一婦人產後一年口渴不止服藥不效手用西君子湯加麥冬烏梅生乾薑蜜丸彈子大令其虛化

三日至十日全愈方中妙在白朮之苦燥乾薑之辛熱所以鼓舞胃氣而升其水液也
玉泉散 治消渴

白甘葛 天花粉 麥冬 生地 五味子 甘草 各等分水煎服

還津丸 止渴生津

酸梅 烏梅 煅牡蠣 薄荷末 一兩 冰片 一分 礞砂 五錢 共研極細末為丸每含一丸

消渴潤燥方

白蜜 人乳 酥 各一 右溶化一處每日不拘時服

鹽絲湯 治消渴用鹽絲湯飲之

麻仁丸 方見 腎氣丸 方見 六味丸 方見 炙甘草湯 方見 三方俱見虛癆

腰痛

經曰太陽所至為骨痛太陽膀胱也主外感而言如五積散及桂枝湯加白朮附子之類皆可治之又曰腰者腎之府轉搖不動腎將憊矣主內傷而言水虛用六味丸火衰用八味丸如牛膝杜仲鹿茸羊腎人參當歸枸杞之類無不可以隨宜加入此恒法也業醫者無不共曉用而不效則束手無策而不知肝脾胃及督脈帶脈皆有此病須當細心分別經云肝足厥陰也是動則病腰痛不可以俯仰宜當歸四逆湯治之方中細辛能通肝經又曰從腰以下者是足太陰陽明皆主之病在腰者取中余過此症每以白朮為君者取之太陰有時用以仁為君者取之陽明人第曰二藥利濕退去而重著遂已孰知白朮運行土氣於肌肉外通皮膚內通經脈風寒濕三氣為年一藥可以兼治以仁為陽明正藥陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關故二藥分用合用或加一二味引經收奇效又有瘀血作痛以一味鹿角為末潤調服甚效或因挫跌外傷腫痛或敗血凝滯而不去痛止而又作者以桃仁承氣湯加附子穿山甲甚

效至於督脈為病尺寸中央俱浮起脊直上直下起長主腰強痛脊脈為病關部左右彈主腰落落如坐水中須用鍼灸之法李瀾湖奇經考極有發明宜熟讀之

當歸四逆湯 桂枝湯俱見 六味丸 八味丸俱見

新定白朮湯 治腰痛而重諸藥不效者

白朮生用五錢至一兩 杜仲生用五錢或一兩 附子三錢 水煎空心服 脈沉而微口中和加肉桂一錢 脈沉數口中

熟云附子加黃柏一錢

新定薏仁湯 治腰痛筋掣難以屈伸者

薏仁一兩 附子二錢 木瓜五錢 牛膝二錢 水煎空心服 如脈洪重按有力口中熱去附子加白朮五

錢

鹿角散 以鹿角切片酒拌焙黃勿焦研空心老黃酒送下三四錢以此藥入督脈最能拓散瘀血也

情方

青娥丸 治腎虛感寒濕之氣

胡桃三十個去殼 故紙酒炒 杜仲十六兩 絲四兩 共研末丸桐子大酒下三十丸

奇效方

胡桃肉 補骨脂 杜仲略一 水三錢煎一連服按膏脂

甘薑茶湯金 按此湯去茯苓以四味各等分名腎著湯治同

摩腰膏難 治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者虛寒者宜之

附子 川烏 南星各二錢 川椒 雄黃 樟腦 丁香各一錢 乾薑一錢 麝香一分 右為末煉蜜丸

如彈子大用生薑自然汁化開如糜融手掌上烘熱摩腰中痛處即以暖帛拭之少頃其熱如火每日用一丸

自汗盜汗

自汗者汗自出屬陽虛宜玉屏風散加牡蠣浮小麥之類以實表補陽盜汗者睡而汗出醒而汗收屬陰虛宜當歸六黃湯以補陰清火然陰陽有互根之理有陽虛而治其陰者陰虛而治其陽者不可不知又汗為心液宜補其心以人參養榮湯主之液主於腎宜補其腎以左右歸飲六八味丸主之總之汗以元氣為樞機苟大汗身冷必以六味回陽飲人參加至兩許方可挽回傷寒誤發其汗上焦津液乾枯必引腎水上泛外溢如水湧出名曰亡陽必以真武湯救之蓋以此湯君臣佐以鎮水佐附子以回陽也

汗出不治症

汗出而喘

汗出而脈絕

汗出而身痛

汗出髮潤至肩

汗出如油汗出如珠

凡見此類皆不得

妄藥

脈息

宜陰脈若漸緩者吉

忌陽脈急瀉促結代散筆者難治

方藥

玉屏風散

白朮

二錢

黃耆

二錢

防風

五分

水煎服按宜以黃耆為君可加至五七錢

當歸六黃湯

治發熱盜汗如神

當歸

熟地

生地

黃柏

黃連

黃芩

一錢

黃耆

二錢

水一鍾半煎六七分服

加浮小麥牡蠣各一

錢更效

六味回陽飲 治陰陽俱脫汗出不止

熟地四錢 當歸三錢 乾薑二錢 附子二錢三四 人參二錢 炙草三錢 水煎服

按汗出亡陽者以茯苓換當歸再加烏梅二枚

真武湯

方見傷寒

外治法 用五倍子研末口水為丸貼臍中男用女津外以膏藥封之不走氣隔宿即止 又以龍骨牡蠣煨研為末

包棉布內擦汗粉自出以實毛氈

備方

參附湯 未附湯 者附湯俱見時方

喻氏曰衛外之陽不固而自汗則用者附湯脾中之陽過熱而自汗則用未附湯腎中之陽浮游而自汗則用參附湯

凡屬陽虛自汗不能舍三方為治又曰者附可以治風虛未附可以治寒濕參附可以壯元神三者亦交相為用按

用方之妙得其性味化合如珠之走盤不拘成法

蓮菜麥豆湯 治盜汗方

蓮子七粒 黑棗七個 浮麥一合 馬料豆一合 用水一大碗煎八分服三劑

黃耆豆湯 用黃耆馬料豆二味全煎服半月愈

五倍子膏 用五倍子去蛀末炙乾研末男用女唾女用男唾調厚糊填臍中外用舊膏藥貼之勿令泄氣兩次愈

黑豆麥梅湯俱見後

止汗方

黑豆三錢 浮麥三錢 烏梅二個 水煎服

泄瀉

泄瀉之證有五而總不離於濕初起只以平胃散加積實厚瀉治之他方皆不逮也又有五更天將明時必瀉一二
次名曰脾腎泄難治蓋以腎旺於亥子今腎大虛則歲時賦數五更之時而特甚也亦謂之脾者以泄瀉之時一定不
移五行之土猶五常之信也四神丸加味主之大概初瀉與瀉之未甚宜利水次補脾久瀉大瀉宜補腎以胃關煎八
味丸之類為主兼服補中益氣湯以升其下陷之氣蓋以腎為胃關二便開闔皆腎所生也

脈息宜沉細忌浮大

加味平胃散

蒼朮二錢

炙甘草

陳皮各一錢

豬苓

厚朴

澤瀉各一錢

生薑三片

水煎服

如頭痛發熱惡

寒者外感風寒也加紫蘇二錢川芎防風各一錢

如傷食飽悶脹痛等證加山楂麥芽之類大醉之後更加乾葛

二錢

如腹痛不休脈細手足冷中寒也加乾薑二錢肉桂吳萸各一錢

如脈洪數有力口中熱舌紅腹痛時作

時止小便短澀火瀉痛也加木通一錢乾薑一錢五分

如脈沉數有力口中熱舌紅腹痛時作

瀉口渴小便不利加滑石三錢

如服前藥不能

效者是脾腎虛寒宜加補腎脂炒扁豆白朮各二錢吳萸八分乾薑一錢以溫之如滑脫不止必加訶子肉豆蔻一

錢五分櫻粟殼一錢以壽之

四神丸

細前輩林公諱祖成加白朮八兩櫻粟殼二兩肉桂一兩醋調炒米粉為丸名六神丸治同再加杜仲

四兩茯苓四兩名固腎散脾丸自註云久服此丸俾脾元足而榮衛通斯分消之力旺腎元足而開闔神斯固攝之

權行也

溫補脾腎元氣五方 林公傳

杜仲二錢

人參白

米錢各半一

徒令

肉豆蔻

卷之四

砂仁

五味二分

水前堂之序

服
小腹脹痛加肉桂五分
小便不利加澤瀉一錢

胃脘煎 治太瀉利脫久瀉不止

熟地
三七
四
五

白木錢

100

卷之五

吳華

三

5

二
五

五

生

為治瀉之恒法又有寧通法治今奇不知如久瀉服溫補及固澀之藥不止其愈而復作或就愈者又復瀉而作俱是劉精未除宜通因通用之治本事溫脾湯主之又有劉精未除則就嗽久則後寒寒熱相移者宜用藥更甚或完穀不化有似虛寒而不知脾中之熱無疑可當急塞大腸食入則不待傳化而直出食入則脾中之垢亦隨氣奔而出是以利無休也宜以黃芩地骨皮甘草杏仁河豚潤脾之藥兼潤其腸則源流俱清氣故故嗽泄為一齊俱止矣又有瀉久亡陰過服香燥之品發熱口渴微喘汗出煩燥陰虛虛陽氣不能久留且多善具陰以河豚地黃門冬等類散黃二四觔日服十餘次半月藥盡遂故另製補脾藥末就後全愈此喻嘉言之驗案也

溫脾湯
見今方

主治銅錢一粒貼臍間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可更虛以養病也

千金溫脾湯

治積久熱痢赤白

生熟地黃

心下痞鞭乾嘔是臍下有水氣腹中雷鳴下利者

中興集

後痞益甚日利數十行穀不化此非執結但以清中厚氣上逆故便腹也

半夏瀉心湯

而發熱心下滿而不痛

黃芩湯
太陽

陽合病自利者 若嘔者加生薑一錢五分半夏一錢七釐今加半夏當黃兩

黃連湯 胸中

胃中有邪氣腹中痛欲嘔者 即半夏瀉心湯去黃芩加桂枝以和表裏

乾薑黃連黃芩人參湯 下利醫復吐下之食入口即吐 此方治嘔家火熱不利於香砂橘半者服此如神張不稱
借治脾胃虛寒腸有積熱之泄甚效

厚朴生薑甘草半夏人參湯 此仲景治肝後腹脹滿之方也今石頑借治瀉後腹脹滿甚效

石頑治總或陳五瀉瀉利腹脹作痛服黃芩白芍之類脹愈甚其脈洪盛而數按之則濡此濕熱瀉脾胃之氣也與
厚朴生薑甘草半夏人參湯二劑痛止脹減而泄利未已與乾薑黃芩黃連人參湯二劑瀉止而飲食不思與半夏瀉
心湯二劑而安

葛根黃芩黃連湯 此湯仲景治桂枝證醫反下之利遂不止脈促喘而汗出之證今借治表邪未解腸胃俱熱
之瀉甚效 按君氣質輕清之葛根以解肌而止利佐苦寒清瀉之黃芩以止汗而除喘又加甘草以和中先養
根後納諸藥解肌之力緩清中之氣銳又與補中逐邪者殊法矣

鍋耙蓮肉糖散 治老幼脾瀉久不愈神方

飯鍋耙和麵 蓮肉四兩 白糖四兩 右共和白每服三五匙一日三次食遠服

丹礬榴榴丸 治一切久瀉諸藥不效宜服此丸

黃丹 枯礬 黃蠟各一 石礬皮八兩 將礬溶化小銅鈎內再以丹礬榴皮三味細末夾熟為丸如豆大
心服五丸兼治紅痢用清余下白痢用薑湯下

鍋耙松花散 治白瀉不止神效方
飯鍋耙二兩 松花二兩 臘肉骨頭五兩 共為末砂糖調不拘時服

火腿紅麴散 治脾泄
陳火腿骨 紅麴 松花 右三味各等分為細末砂糖調陳酒送下

風痺痿

風痺痿三證不同近世不能為辨而混同施治誤人不淺茲特分別之

風者肢節走痛也內經謂之賊風後人謂之痛風又謂之白虎歷節風其中表裏寒熱虛實宜因脈辨症而藥之至久痛必入絡如木通刺蒺藜紅花金銀花鉤藤之類最能通絡可隨量加入久痛必挾鬱熱而成熱熱盛則生痰如南星半夏括蕁根黃柏鬱金川貝竹瀝等之類但能解熱清熱化痰可隨量加入多用桑枝桑寄生者蓋以桑為萬世之精也多虎骨者以風從虎亦以骨膏之義也用烏附辛桂之藥而不效者宜用威靈麥冬桑葉升麻生薑制化蘇恭阿膠甘草之類為膏滋養陽明引其柔潤熄肝風之法

痺者閉也風寒濕雜至合而為痺與痛風相似但風則陽受之痺則陰受之雖行痺屬風痺屬寒著痺屬濕而三氣之合自當以寒濕為主蓋以風為陽邪寒濕為陰邪陰主閉則重著而沉痛是痺證不外寒濕而寒濕亦必挾風寒曰風寒濕曰風濕此三氣雜合之說也內經云在陽命曰痺在陰命曰痺以此分別則兩證自不混治矣至於治法不外三痺湯及景岳三氣飲之類為主如黃耆五物湯黃耆防己湯桂枝湯等藥如母湯為驅風之類如古方書知標用張景岳云低宜峻補真陰當通脈絡使氣血得以流行不得過用驅風等藥傷陰氣反增其病矣若胸痺腰痛及臟腑之痺當另立一門方能分曉將門法律分別甚詳宜熟玩之

痿者兩足痿弱而不痛也內經分為五臟肺痿者主皮毛痿也心痿者脈痿也肝痿者筋痿也脾痿者肉痿也腎痿者骨痿也而其要旨在獨取陽明蓋陽明為五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關若陽明虛不能滋養水穀之氣而布化則五臟無所資宗筋無所養而痿瘳作矣醫者不知誤投燥熱風藥則火得風而益熾誤投烏附劫藥則陰被劫而連亡要知此證無寒當遵張子和為定論若用痛風三痺湯湯多燖等法立見其危至於方治以虎潛丸加減四魴丸為主痿多者間服六君子湯加黃柏蒼朮竹瀝薑汁黑瘦人血虛多燥宜間服二妙地黃丸肥白人龜鹿