

玉機微義卷之四十二

吳陵劉純宗厚輯

後學

伍承先開成
葉樹德茂滋校

破傷風門

論破傷風表裏中治法

病機云破傷風者同傷寒證治通於表裏分別陰陽
有在表有在裏有在半表半裏者在裏宜下在表宜
汗在表裏之間宜和解不可過其治也故表脉浮而
無力者太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小

者少陽也若明此三法而施治不中病者鮮矣

原病式云夫破傷中風之由者因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通怫熱因之徧體故多白痧是時瘡口閉塞氣難通泄熱甚則生風也不已則表傳於裏亦猶觸冒傷寒怫熱鬱甚不解則表傳於裏者也但有風熱微甚兼化故殊異矣大法破傷中風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦也宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱怫鬱而以麻黃湯辛熱

發散者也凡用辛熱開衝風熱結滯宜以寒藥佐之
則良免致藥不中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱
用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也若世以甘
草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不已而漸入於裏
裏又未太甚而脉在肌肉者宜以退風熱開結滯之
寒藥調之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半
裏而以小茈胡和解之也若裏勢已甚而舌強口禁
項背反張驚搐惕搦涎唾稠粘胸腹滿塞而或便溺
閉結或時汗出脉洪數而弦也然汗出者由風熱鬱

甚於裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒藥調之而熱退結散則風自愈矣凡治此亦宜按摩導引及以麤幹開牙關勿令口禁使粥藥得下也

按此論表裏中脉病證治至爲詳盡前人所未論也

論破傷風所因不同

病機云破傷風者有因卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使寒熱更作身體反張口禁不開甚者邪氣入

臟有因諸瘡不瘥榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡爲破傷風之候有諸瘡不瘥舉世皆言著灸爲上是謂熱瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口禁目斜亦有破傷不灸而病此者因瘡著白痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易爲鬱結熱甚則生風也

按此論所因有四二者因瘡口入風似屬外因一者因灸逐熱似屬不內外因一者因瘡口閉塞內熱生風似屬內因也

謹按破傷風證古方藥論甚少豈非以此疾與中風同論故不另立條目也唯河間論與傷寒表裏

中三法同治用藥甚詳其言病因有因外傷於風有因灸及內熱所作者然與中風相似也但中風之人尚可淹延歲月而破傷風者犯之多致不救蓋中風有在經在腑在臟之異獨入臟者最難治破傷風或始而出血過多或瘡早閉合瘀血停滯俱是血受病血屬陰五臟之所主故此風所傷始雖在表隨卽必傳入臟故多死也又此病或瘡口坦露不避風寒而無所傷或瘡口閉合密避風邪而反病此或病已十分安全而忽有此大抵皆由內氣虛而有鬱熱者得之若內氣壯實而無鬱熱者雖傷而無所害也

破傷風治法

治表之劑

病機羗活防風湯治邪初在表

羌活

防風

甘草

川芎

藁本

當歸

白芍藥

各四兩

地榆

細辛

各二兩

右咬咀每五錢水煎熱服無時熱則加大黃黃芩
各二兩

防風湯治破傷風同傷寒表證未傳入裏急宜服之

防風

羌活

獨活

川芎

各等分

右咬咀每五錢水煎服宜調蜈蚣散大効

按已上二方並
三陽經藥也

蜈蚣散

蜈蚣 一對

鰮 三錢

右爲細末用防風湯調下如表解不已覺轉入裏

當服左龍丸

卽後江鰮丸
四味是也

蜈蚣散

蜈蚣 一對

鰮 五錢

左盤龍

五錢炒烟盡
野鴿糞是也

右爲細末每服一錢清酒調下治裏和至愈可服

但有裏證不可服次當下之用蜈蚣散四錢巴豆
霜五分燒飯爲丸如菉豆大每服一丸加至六七
丸清酒調蜈蚣散少許送下宜利爲度
發表雄黃散裏和至愈可服

雄黃 一錢

防風 二錢

草烏 一錢

右爲細末每服一字溫酒調下

天麻雄黃散治表

天南星 三錢

半夏

天麻 各五錢

雄黃 二錢
五分

右爲細末每服一錢溫酒調下如有涎加大黃爲下藥

三因防風散治風入瘡口項強牙關緊急欲死又名

玉真散

防風

天南星

炮各等分

右爲末每服三錢童子小便一大盞煎七分熱服香膠散治破傷風口禁直強

魚膠

七錢燒存性

右研細入麝香少許每服二錢酒調下不飲米湯

下一方以蘇木煎湯下

元戎方治破傷風欲死者

川烏

南星

半夏

並生

天麻

去蘆各等分

右爲細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒一二盞投之

治破傷風方

蝎稍七條爲細末熱酒調下

按此以上八方並厥陰例藥也

治半表裏之劑

病機羌活湯治半在表半在裏

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子

各一兩

薄荷

白芷

各五錢

右咬咀每服五錢水煎入生薑五片熱服日二三

按此三陽
經藥也

地榆防風散治破傷風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜表裏治之

地榆

防風

地丁草

馬齒莧

各等分

右爲細末每服三錢溫米湯調服

治裏之劑

病機大芎黃湯治破傷風臟腑秘小便赤自汗不止者

川芎

五錢

羌活

黃芩

大黃 各一兩

右咬咀五七錢水煎溫服以利爲度

按此三陽經藥也此自汗非表證乃裏實也如陽明病汗多急下之

江鰮丸治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病在裏可

用此下之

江鰮

剉炒五錢

雄黃

一錢

野鴿糞

五錢炒

白僵蚕

五錢

蜈蚣

一對炙

天麻

一兩

只用前四味名左龍丸

右爲細末分作三分將二分燒飯爲丸桐子大硃

砂爲衣將一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯爲丸如桐子大不用硃砂爲衣每服硃砂爲衣者二十丸入巴豆者一丸第二服二丸加至利爲度再服硃砂爲衣藥病愈卽止

按此厥陰例藥也

治汗之劑

病機白朮防風湯治服發表藥過有自汗者

白朮

黃芪

各一兩

防風

二兩

右咬咀每服五七錢水煎溫服無時臟腑和而自

汗者可服此藥若臟腑秘小便赤自汗者無寒也

宜速下之用大芎黃湯

按此手少陽足陽明
太陰太陽經藥也

白朮湯治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮

葛根 各一兩

升麻

黃芩

各五錢

芍藥

二兩

甘草

三錢
五分

右咬咀每服五錢水煎溫服無時

按此陽明太
陰經藥也

理血之劑

養血當歸地黃散治病日久氣血漸虛邪氣入內宜
養血爲度

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各一兩

細辛

五錢

右咬咀水煎服

按此厥陰四
物例藥也

雜方

如聖散

方見中風門