


醫宗金鑑
病案



初生門下

目爛○兒生兩目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯清熱外點真金目即明註目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中過熱後發毒

於目故有是證內服地黃湯以清熱外用真金散以點目其證自愈

生地黃湯方見目不開

真金散 黃連生 黃藥生 當歸 赤芍藥各一

懸癰○睛上腫起就懸癰皆因胎毒熱上冲法當刺破鹽湯拭如聖一字搽之靈註凡喉裏上腮腫起如蘆穗或水狀者名曰懸癰

戶也此胎毒上攻須以綿纏長針留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或一字散搽之

如聖散 鉛霜錢 真牛黃錢 太陰元精石 硃砂各二錢五分 龍腦五分 右為極細末每用一字搽患處

一字散 硃砂水 硼砂各五分 龍腦 朴硝各一 右為極細末用蜜調少許鵝翎蘸搽口內

重齟○重齟胎熱胃中蓄牙根腫脹痛難禁刺破一字散敷上繼進清胃散如神註重齟者因小兒在胎有熱蓄於胃中故牙根腫如水泡故

曰重齟治法用鍼刺破以鹽湯拭淨外敷一字散內服清胃散其腫自消○一字散方見懸癰

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 石膏煨 引用燈心水煎服方清胃散治胃熱重生地黃連當歸身丹皮升麻石膏煨臨

煎須要入燈心

鵝口○鵝口白屑滿舌心脾熱本胎原清熱瀉脾搭保命少遲糜爛治難痊註鵝口者白屑生滿口舌如鵝之口也由在胎中受母飲食

熱毒之氣蘊於心脾二經故生後遂發於口舌之間治法以清熱瀉脾散主之外用麝香并水拭口搭以保命散日敷三次白退自安倘治之

稍遲必口舌糜爛吮乳不得則難痊矣

清熱瀉脾散 山梔炒 石膏煨 黃連 薑炒 生地 黃芩 赤苓 引用燈心水煎服方清熱瀉脾治鵝口石膏生地赤苓煎連梔

子合成劑加入燈心病即安

保命散 白礬燒灰 硃砂各二錢五分 馬牙硝錢五分 右研末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上

吐舌○吐長收緩名吐舌皆是心經有熱成面紅煩渴溺赤瀉瀉心導赤服即寧註吐舌者伸長而收緩也因心經有熱所致故面紅煩燥口

渴尿赤宜瀉心導赤湯主之

瀉心導赤湯 木通 生地 黃連 甘草生 引用燈心水煎服方瀉心導赤湯最良心熱吐舌即堪當木通生地黃連草燈心加自強



南京中醫藥大學圖書館藏

弄古○弄古時時口內搖心脾熱發口唇焦燥熱古乾大便穢瀉黃導赤並能療兒熱口中搖動者因心脾有熱以致唇焦古乾煩熱便穢先用瀉黃散次服瀉心導赤湯

瀉黃散 藿香葉 山梔子炒 石膏煨 防風 甘草生 引用燈心水煎服 勸弄古瀉黃散最神藿香葉配山梔仁甘草防風石

臨時煎服入燈心○瀉心導赤湯方見吐舌 重古○古下腫突似舌形心脾積熱上攻衝內服宜以清熱飲外敷涼心功最靈註重古者因古下近古根處其腫形如舌故名重古心脾

之熱宜服清熱飲外吹涼心散 清熱飲 黃連生 生地 木通 甘草生 連翹去心 蓮子 引用淡竹葉水煎服時灌入口中 勸清熱飲內用黃連生地蓮子木

通甘連翹更加淡竹葉一同煎服自然安 涼心散 青黛 硼砂 黃蘗 黃連入乳拌晒 人中白各二錢 風化硝錢 冰片二分 右為極細末吹之甚效

木古○木古心脾積熱成腫脹木硬證多山外用川硝散古上內服瀉心導赤靈註木古一證皆因心脾積熱而成蓋脾之脈絡在古下及

為心苗遇火上冲令兒舌腫滿木硬不能轉動故名木古外用川硝散古上內用瀉心導赤湯若不急治必致難救 川硝散 朴硝分五 真紫雪分 鹽分 右為細末以竹瀝調敷古上○瀉心導赤湯方見吐舌

嘔乳○嘔乳之候非一端傷乳停痰胃熱寒熱宜和中清熱飲寒用溫中止吐煎傷乳平胃散最妙停痰二陳湯可痊若是滿而自溢者常須

節乳自能安註小兒嘔乳證非一端有宿乳停痰胃寒胃熱之分不可一例而治如面色多赤二便微秘手足指熱此為熱嘔也宜和中清熱

飲主之面色青白薑青多沫手足指冷此因寒而嘔也宜溫中止吐湯主之口熱唇乾夜卧不寧手足心熱此為傷乳而嘔也宜平胃散主之

胸膈膨脹嘔吐痰涎此因停痰而嘔也宜枳桔二陳湯主之若吃乳過多滿而自溢者不須服藥惟節乳則嘔自止矣 和中清熱飲 黃連薑炒 半夏薑製 陳皮 茯苓 藿香 砂仁 引用薑水煎服 勸和中清熱飲黃連半夏陳皮茯苓藿香砂仁

合成劑水煎徐服可安全 溫中止吐湯 白豆蔻研 茯苓 半夏薑製 生薑 水煎冲麝沉香汁服 勸溫中止吐白豆蔻茯苓半夏共生薑臨服沉香汁加入專

治嘔乳自寒傷 平胃散 蒼朮炒 陳皮 厚朴炒 甘草炙 麥芽炒 砂仁研 引用薑水煎服 勸小兒傷乳多吐嘔平胃調和功可見蒼陳厚朴甘

草倍加入麥炒薑一片 枳桔二陳湯 枳殼炒 桔梗 陳皮 半夏薑製 茯苓 甘草炙 引用薑水煎服 勸停痰嘔乳不能安枳殼二陳湯最先枳桔陳半苓

甘草生薑加入即時痊 甘草生薑加入即時痊



夜啼○夜啼寒熱因胎受須將形色辨分明寒屬脾經面青白手腹俱冷曲腰痠面赤溺閉屬心熱熱用導赤寒鉤藤若無寒熱衣裏證古法
蟬花散最精註小兒初生夜啼其因有二一曰脾寒一曰心熱皆受自胎中觀其形色便知病情矣如面色青白手腹俱冷不欲吮乳胸腰不
伸者脾寒也鉤藤飲走面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩燥多啼者心熱也導赤散主之若無以上形證但夜啼者用蟬花散最當
鉤藤飲 川芎 白當歸 茯神 白芍 茯苓 甘草 木香 煨 鉤藤鈎 引用紅棗水煎服 夜啼之證因脾寒須服鉤藤飲可也

芳歸神芍令甘草木香鉤藤紅棗煎○導赤散方見小便不通

蟬花散 蟬蛻不拘多少 右研細末每服少許薄荷煎湯調下

胎黃○兒生偏體色如金溼熱熏胎受深法當溼滌清熱地黃犀角二方神註胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃胎毒氣入血小兒
在胎受母熱毒故生則有是證也法當溼滌清熱須分輕重治之微黃者生地黃湯深黃者犀角散

生地黃湯 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 赤茯苓 澤瀉 猪苓 甘草 茵陳蒿 引用燈心水煎服 胎黃須用

地黃湯四物花粉赤苓良澤瀉猪苓甘草等茵陳加入水煎嘗

犀角散 犀角 茵陳蒿 枯薑根 升麻 甘草 龍胆草 生地 寒水石 煎 水煎不拘時服 胎黃又有犀角散甘薑犀角

與茵陳升麻胆草生地共寒水石同枯薑根

胎赤○胎赤胎中受毒熱生後偏體若丹塗清熱解毒湯最妙蔣氏化毒功效殊胎赤者因孕婦過食辛熱之物以致毒熱凝結蘊於胎中
遂令小兒生下頭面肢體赤若丹塗故名曰胎赤當以清熱解毒湯主之熱盛便秘者將氏化毒丹主之

清熱解毒湯 生地 黃連 金銀花 薄荷葉 連翹 赤芍 木通 甘草 引用燈心水煎服 胎清熱解毒湯堪誇生地黃

連金銀花薄荷連翹亦乃藥木通甘草燈心加

蔣氏化毒方 犀角 黃連 桔梗 元參 薄荷葉 甘草 生 大黃 青黛 右為細末煉白蜜為丸重六分每服一丸燈心湯

赤游風○赤游胎中熱毒成皮膚赤腫偏身行頭面四肢猶可治若歸心腹命難生內服犀角監葉散外用破法數神功百日之內忌破血貼

塗二法可安寧註小兒赤游風證多由胎中熱毒而成或生後過於溫暖毒熱蒸發於外以致皮膚赤熱而腫色若塗丹游走不定行於偏身
故名曰赤游風多發於頭面四肢之間若內歸心腹則死治法當服犀角解毒飲如不愈繼以監葉散外用破法刺出毒漿甚者數以神功散

毒輕者不用數藥在百日內者小兒忌破血以其肌肉難任也須用豬肉貼法或以赤小豆末雞子清調塗之甚效

犀角解毒飲 牛蒡子 炒 犀角 荆芥穗 防風 連翹 金銀花 赤芍藥 生甘草 川黃連 生地黃 引用燈心水煎服

犀角解毒藥最良牛蒡犀角合煎防連翹銀花赤芍藥甘草川連生地黃

藍葉散 藍葉 錢 黃芩 犀角屑 川大黃 炒 柴胡 梔子 各二 川升麻 錢 石膏 錢 生甘草 錢 右為粗末每服一錢水二小

編制幼科雜病心法法錄



中國大學圖書館藏

杯煎五分去渣兌竹瀝一酒杯煎三兩沸放溫量兒大小用之氣怯弱者可去大黃

砭血法 口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將着頭臂開夾住用線縛定兩指輕握筋稍令磁鋒對聚血處再用筋一銀頭擊刺

出毒血砭後毒甚者以神功散敷之毒輕者砭後不可用恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用砭法祇宜針針倒挑患處則愈

神功散 黃藥炒 草烏生 右各為末等分用漱口水調敷頻以漱口水潤之

猪肉貼法 用生猪肉切片貼於赤腫處數更換

塗法 生赤小豆不拘多少研為細末用雞子清調塗患處乾則再塗

初生無皮○兒生無皮有二端父母梅毒遺傳或因未足月生早無皮亦爛痛難堪梅毒換肌消毒散胎怯當歸飲能治外敷清涼藥散

毒解形完膚自堅 嬰兒生下無皮其證有二或因父母素有楊梅結毒傳染胎中故生下或上半身赤爛或下半身赤爛甚至色帶紫黑

有因月分未足生育太早偏體遺漬紅嫩而光二證俱屬惡瘡遺毒者內服換肌消毒散外用清涼膏或鵝黃散敷之胎元不足者內服當歸

飲外用稻米粉撲之毒解形完者謂解去毒氣其皮自漸新生完而堅實矣

換肌消毒散 當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 皂刺 土茯苓 金銀花 連翹 甘草 白芷 苦參 白鮮皮 防風 引用

燈心水煎服 無皮換肌消毒散四物皂刺土茯苓銀花連翹草白芷苦參白鮮皮共防風

當歸飲 何首烏 白鮮皮 白茯苓 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎 水煎服 貼當歸飲治兒無皮面白

肢冷服最宜首烏鮮皮白茯苓甘草四物共參者

清涼膏 石灰四兩未經水濕成塊者 用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多寡對小磨香油亦如之以順

攪成膏為度用雞翎搽之自愈

鵝黃散 黃藥生 石膏各等 共研為細末撲之溼則乾撲乾則用猪苦胆調搽

撲粉法 早稻白米作粉時時撲之其皮漸生神效

變蒸○萬物春生夏孰長兒生同此變形神三十二天為一變六十四日為一蒸變長百骸生藏府蒸增智慧發聰明十八五百七十六變蒸

既畢形神成變蒸之狀身微熱耳尻骨冷無病情註天地生化萬物必以春溫夏熱兒之初生變生形神亦同此理自生之日至三十二日曰

一變至六十四日曰一蒸變則長其百骸生其藏府蒸則增其智慧發其聰明也曰十八五百七十六者謂十變五蒸之外又有三大蒸合計

五百七十六日也變蒸既畢形神具足此後不復變蒸矣然每變蒸之時其狀身微熱耳冷尻骨冷而無他病情狀蓋以陰陽和變生化形

神故無他病情狀也身微熱者以陰陽氣之氣變蒸而然也耳尻冷者耳尻屬陰以陽不勝陰而與陰和之象故不熱也按變蒸既曰生五臟六腑次序又曰包絡三焦二經俱無形狀故不變不蒸夫胞絡乃周身脂膜聯絡百骸藏腑者一經乃軀殼內氣充滿百骸藏腑者變蒸時豈



獨不及之耶其說不經細閱靈素自知附辨以俟識者

驚風門

驚風總括○心主驚肝主風心熱肝風作急驚素虛驚因成慢吐瀉後起慢脾風急驚陽症有實象慢脾陰症有虛形慢驚半陰半陽證虛實寒證要詳明益心藏神心病故主驚也肝屬木肝病故主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風火相搏必作急驚之證也若素氣不足或因急驚用藥過峻暴傷元氣每致變成慢驚之證更有因吐瀉既久中氣大虛脾土衰弱肝木來虛而內生驚風者名曰慢脾風也三者致病之因既不同故所現之證亦各異急驚屬陽必有陽熱有餘等實象也慢脾屬陰必有陰冷不足等虛象也至於慢驚初得之時陰陽未過損或因急驚傳變而成其中常有夾痰夾熱等證故屬半陰半陽不比慢脾純陰之病也治者須詳分虛實寒熱以治之無不致候矣驚風八候○驚風八候指搐掣顫反引驚視之名肘臂伸縮名為搐十指開合指狀成勢若相撲謂之掣顫則頭筋動搖發及張身仰頭向後引後兩手若開弓實則目直而似怒視則覩物不轉睛內外左右分順逆須識急慢證皆同八候謂指搐掣顫反引實視是也指謂肘臂伸縮謂十指開合掣謂肩頭相撲顫謂手足動搖反者身仰向後引者手若開弓實則目直而似怒視則睛露而不活其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內為順反是為逆此候急驚慢驚同皆見之虛實無所異焉治者宜切記之

通關急救法○驚風搐搦神昏憤痰壅氣塞在心胸急用通關吹入鼻無噴嚏則死有噴嚏者驚風搐搦必神氣昏憤痰壅氣塞結胸中而致急用通關散入鼻內無噴嚏者不治有噴嚏者審其表裏虛實隨證治之

通關散 半夏生 皂角 細辛 薄荷 各等 共為細末用筆管吹入鼻內少許

急驚風○急驚觸異心驚熱或因風鬱火生風暴發痰盛或熱極壯熱煩急面唇紅痰壅氣促牙關緊二便秘瀉脉數洪驚用鎮驚風至寶牛黃攻痰涼膈清平治先活瀉青等化痰導赤共涼驚急驚風一證有因目觸異物耳聞異聲神散氣亂而生者有因心肝火盛外為風寒鬱閉不得宣通而生者有因痰盛熱極而內動風者然證多暴發壯熱煩急面唇紅唇赤痰壅氣促牙關緊急二便秘瀉急者齒緊急不能開也二便秘瀉者大便秘結而小便澀難也脈洪數者主陽熱也觸異致驚者清熱鎮驚湯安神鎮驚丸主之火鬱生風者至寶丹主之痰盛生驚者牛黃丸攻下之熱極生風者涼膈散清解之病不甚者則用平治之法風熱者先活散主之肝熱者瀉青丸主之痰兼熱者清熱化痰湯主之心經熱者導赤散涼驚丸主之惟在臨證者審而用之

清熱鎮驚湯 柴胡 薄荷 麥冬 法 梔子 川黃連 龍胆草 茯神 鈎藤鈎 甘草 生 木通 引加燈心竹葉調碎砂末服

清熱鎮驚湯治外驚柴胡薄荷麥冬梔子黃連龍胆草茯神鈎藤草木通

安神鎮驚丸 天竺黃 茯神 各五 胆星 桑仁 炒 麥冬 各三 赤芍 當歸 各三 薄荷葉 黃連 辰砂 牛黃 梔子 木通 龍

骨 各三 青黛 一錢 右為細末煉蜜丸如菜豆大赤金箔為衣量兒大小與之淡薑湯化下

編錄幼科雜病心法要訣

三

三

三

壯氣虛炎痰醒脾治參木天麻白茯苓橘半全蠍蠶絲草木香食米胆南星

緩肝理脾湯 廣桂枝 人參 白茯苓 白芍藥 白朮 陳皮 山藥 扁豆 甘草 引用煨薑大棗水煎服

壯旺肝脾虛緩肝湯桂枝參苓芍木良陳皮山藥扁豆草煎服之時入棗薑

夾熱痰痰慢驚○慢驚火熱或火痰身熱心煩口溢涎宜以清心滌痰治白丸柴芍六君子煎 壯慢驚之症本無熱可言但脾虛熱內生或

涎上泛咽喉氣粗身熱心煩所謂虛火痰熱是也痰熱相兼者清心滌痰湯主之脾虛肝旺痰盛者青州白丸柴胡六君子湯主之

清心滌痰湯方見急驚後調理法

青州白丸 生川烏 生半夏 南星 白附子 右為末盛生絹袋內用井花水攪出粉末盛再攪以粉盡為度

置磁盆內日晒夜露每早撒去舊水別用新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾研為細末用糯米粉煎粥清火茶豆大吞服

五九薄荷湯送下

柴芍六君子湯 人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 甘草 柴胡 白芍 鈎藤鈎 引用薑水煎服 壯脾虛木旺風痰盛

四君人參米苓苓陳陳半因加入肝風更用柴芍藤

慢脾風○肝盛脾衰金氣弱金失承制木生風每因吐瀉傷脾胃閉目搖頭面唇青額汗昏睡身肢冷舌短聲啞嘔澄清溫中補脾為主刺固

真理中隨證從 壯慢脾風一證多緣吐瀉既久脾氣大傷以致土虛不能生金金弱不能制木肝木強盛惟脾是尅故曰脾風閉目搖頭面唇

青額汗昏睡四肢厥冷舌短聲啞嘔清水此乃純陰無陽之症逐風則無風可逐治驚則無驚可治惟宜大補脾土生胃回陽為主吐瀉

無陽者溫中補脾湯主之大病後成者固真湯主之四肢厥冷者理中湯加附子主之

溫中補脾湯 人參 黃耆 白朮 乾薑 附子 半夏 陳皮 茯苓 砂仁 肉桂 白芍 甘草 丁香 引用

煨薑水煎服 壯慢脾溫中補脾湯參苓白朮共乾薑陳半附苓縮砂桂白芍甘草共丁香

固真湯 人參 白朮 肉桂 白茯苓 山藥 黃耆 甘草 附子 引用薑棗水煎服 壯固真湯治慢

脾風人參白朮桂茯苓山藥黃耆煨甘草附子浸泡最宜精○理中湯方見不乳

痢證門

痢證總括○小兒痢證類癰瘡發時皆倒搖涎聲食頃即甦如無病陰陽驚熱痰食風 壯痢證類乎驚風癰瘡者謂時皆倒抽搐涎涎壅盛氣

促作聲與驚癰一證相似也但四體柔軟一食之頃即醒依然如無病之人非若癰風一身強硬終日不醒也陰者陰痢也見藏陰證陽者陽

痢也見府陽證驚癰因驚熱痰痢因痰食風痢因食風痢因風其證不一治亦不同臨證宜詳辨之

陰痢○陰痢屬肢厥厥冷偃卧拘急面白青吐沫聲微沉細醒脾固真定痢靈 壯陰痢屬陰藏寒之病也多因慢驚之後痰入心包而得發

醒脾湯方見慢驚門○固真湯方見慢脾風

鈎藤鈎四

甘草二錢

右共爲細主

木煉蜜丸口津

徐子大每服

一丸炎薑湯

七
服

1



版

成此證發身熱自于甲申而赤脈象共收牙關緊急或喘斗不已口上生沫口風兼熱者用龍胆湯易干堅決者用烏青散

[illegible]

拔龍大主之○龍朋漢
天宮黃五
長少二
旦星一
佳宮二
壽亭一分
由起用三
月未意之
九并直
分上處亦
勞苦
公

巴戟天去心 天冬 三錢 辰砂辰砂 月星兩 雄黃錢 麝香半 右為細末另用庫裏熟艾花甘草各五錢煎湯去滓入藥分作六服

合藥末煮丸如淡實大每服一丸薄荷湯化下

驚癇○驚癇觸異驚神氣吐舌急呾面白紅發作如人將捕狀安神大青鎮驚靈註小兒心肝熱盛偶被驚邪所觸因而神氣潰散遂成癇發

發時吐舌急呌面色乍紅乍白悚惕不安如人將捕之狀先服大青膏次服鎮驚丸則癩自定矣

大青膏 天麻三錢 白付子二錢 青黛一錢 歌尾一錢 朱少一錢 天竺黃二錢 青膏三錢 烏梢蛇肉一錢 酒 古司開田東霞口膏每

子帶去月錢 萬一錢 子魚研 蠅眉去毒 石灰研 九子貢錢 麝香分 魚和虫肉 浸焙乾 木同研細炒空煮壹

服大兒五分小兒三分薄粥湯化服

鎮驚丸
茯神
麥冬各五錢
去心
辰砂
遠志去心
石菖蒲
棗仁各三錢
炒
牛黃一錢
半
川黃連三錢
生
鈎藤五錢
炙
但星五錢
炙
天竺黃
珍珠

犀角二錢 甘草二錢 右共研細末凍蜜爲丸每丸重五分量兒與之用淡薑湯下

楚蘭平素因多痰哮喘氣足前上痰去一合人具痰也注痰消而心已平下痰不常自出也

癩癧（癩癧平素自多癩癧石喙陷氣促官僅已癩癧一搥金與癩癧癩癧老因小兒平素癩癧或偶因驚熱遂致成癩癧發時癩

涎壅塞喉間氣促昏倒口吐痰沫宜先服一捻金以急下其痰次服硃衣滾痰丸則氣順痰清而癰自止矣○一捻金方見不乳

朱家葵凡 蒙石一兩 元香五 黃芥七 大黃一 古為田末水多為丸朱少為交多寡量見六日及之也最

石不火大 石不煇 沙石錢 貴石錢 大貴兩 木燕絲牙小 沙燕大 砂燕衣 多夢量 大小台 渾水什用

食滯（食滯食過積中脘）時疫熱使之然直黃腹滿吐痢臭如蟹溺痰和胃安食滯者其病在脾胃小兒乳食過度停結中脘乘一時疫

熱壅塞遂致成癰其初面黃腹滿吐利酸臭後變時時發搐宜用妙聖丹主之痰盛者硃衣滾痰丸主之後用清熱和胃丸調理則積滯清而

驚觸定矣

少
集
歌
未
戈者口各一錢
已豆三个
全二錢炒
古共為田天
參是月七口同子
及五乙六
市耳易九

女青 石石 仁赤石 醋煨 已上 去油 杏仁 去皮尖 石上煮紅才 女梔子 女每服三五丸 木香煎湯

肥兒疳積丸 方見疳積

清熱和胃丸
川連生五錢
梔子生五錢
竹茹四錢
麥冬五錢
連翹去心四錢
山查一兩
神麴一兩
麥芽一兩
陳皮四錢
枳實五錢

金

大黃^{錢三} 甘草^{錢三} 右共為細末煉蜜為丸每丸重一錢重兒與之用白滾水化下

風癰○風癰汗出風囊經二目青黯面淡紅十指屈伸如數物化風羌活年黃靈風癰因汗出脫衣腠理開張風邪乘隙而入發時身痛面紅手如數物治法先宜疎風解表輕則化風丹主之重則羌活桂枝湯主之風兼痰者年黃丸主之

化風丹 胆星^{錢二} 羌活 獨活 天麻 防風 甘草^生 荆芥穗 人參 川芎^{錢一} 右共為細末煉蜜為丸每丸重一錢重兒與之用白滾水化下

羌活桂枝湯 羌活 防風 麻黃 桂枝 天麻 大黃 甘草^生 引用生薑水煎服 羌活桂枝治風癰疎風解表輕則化風丹主之重則羌活桂枝湯主之

桂天麻草大黃煎服自然安 牛黃丸 胆星 全蠍^{錢二} 蟬退^{錢半} 防風 牛黃 白附子^生 僵蠶^炒 天麻^{各一錢五分} 麝香^{分五} 右為細末煎藥水核皮取肉和丸

如萊豆大每服三五丸生薑湯化服 卷五十二 編輯幼科雜症心法要訣

疳證門 疳證總括○大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液極熱煎初患尿滑年潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦

皮毛憔悴眼睛腫^註大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所稟之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治令青筋

暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發腫而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有誤也 脾疳○脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腫脹臥冷食泥腹脹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥粘攻積消疳肥兒治補脾

參苓白朮^註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體羸瘦困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡臥喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥粘之證也宜先攻其積用消肝理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消肝理脾湯 蕪荑 三棱 義木 青皮^炒 陳皮 蘆薈 枳榔 使君子肉 甘草^生 川黃連 胡黃連 麥芽^炒 神麴^炒 引

用燈心水煎服 肥兒丸 人參^{半錢} 白朮^{五錢} 茯苓^錢 黃連^錢 胡黃連^{五錢} 史君子肉^{四錢} 神麴^炒 麥芽^炒 山查肉^{各三錢半} 甘草^{錢半} 蘆薈

一錢 右為末煮米糊丸如黍米大每服二三十丸米湯化下 參苓白朮散 人參^錢 白朮^錢 茯苓^錢 扁豆^炒 蒼朮^錢 山藥^錢 陳皮^錢 縮砂 桔梗^錢 甘草^錢 建蓮子^{五錢} 右共

參苓白朮散 人參^錢 白朮^錢 茯苓^錢 扁豆^炒 蒼朮^錢 山藥^錢 陳皮^錢 縮砂 桔梗^錢 甘草^錢 建蓮子^{五錢} 右共



為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉○疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯久瀉參苓白朮捷註疳瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻嘔吐宜清熱滲瀝以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮最主之

清熱和中湯 白朮炒 陳皮 厚朴炒 赤苓 黃連 神麴炒 穀芽炒 使君子 生甘草 澤瀉 引用燈心水煎服

瀉名疳瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚亦各連神穀史君草澤瀉

參苓白朮散方見脾疳

疳腫脹○疳疾腫脹面浮光傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良註疳疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈痞悶肚腹腫脹面浮光宜用御苑勻氣散治之其腫脹自消矣

御苑勻氣散 桑皮炒 桔梗 赤苓 甘草生 藿香 陳皮 木通 引用薑皮燈心水煎服

桑皮桔梗亦各草霍香陳皮合木通

疳痢○疳疾日久頻下痢多緣腸胃熱凝滯或赤或白腹窘急香連導滯為妙劑註疳痢之由皆因熱結腸胃所致故劑時或赤或白然中窘痛急用香連導滯湯治之其痢自愈

香連導滯湯 青皮炒 陳皮 厚朴製 生甘草 川黃連炒 山查 神麴炒 木香煨 檳榔 大黃 引用燈心水煎服

下痢名疳痢香連導滯功最良青陳厚朴川連草查麴木香枳大黃

肝疳○肝疳面目小甲青眼生眵淚淫難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸弱燥渴煩急蓋常青清熱柴胡同蘆薈調養逍遙抑肝靈註肝屬木色青主筋故肝疳則見面目小甲皆青眼生眵淚淫難睜搖頭揉目合面睡卧耳瘡流膿腹大青筋身體羸瘦燥渴煩急蓋青如豆之證也治宜先清其熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病勢稍退當以逍遙散抑肝扶脾調理

柴胡清肝散 銀柴胡 梔子微炒 連翹心去 生地黃 胡黃連 赤芍 龍胆草 青皮炒 甘草生 引用燈心竹葉水煎服

清肝治肝疳銀柴梔子翹胡連生地赤芍龍胆草青皮甘草一同煎

蘆薈肥兒丸 五穀蟲炒 蘆薈生 胡黃連炒 川黃連各一兩 銀柴胡一兩二錢 扁豆炒 山藥各二兩 南山查二兩 蝦蟆四個

肉豆蔻錢 枳榔錢 使君子二錢 神麴二兩 麥芽錢 鵝虱錢 蕪荑一兩 硃砂二錢 麝香一錢 共研細末醋糊為丸

如黍米大每服一錢米飲下

加味逍遙散 茯苓 白朮炒 當歸 白芍炒 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子炒 引用薑棗水煎服

加味逍遙散 茯苓 白朮炒 當歸 白芍炒 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子炒 引用薑棗水煎服

苓白木當歸身白芍柴胡薄荷草再加丹皮梔子仁

抑肝扶脾湯 人參 白朮^{土炒} 黃連^炒 柴胡^{酒炒} 茯苓 青皮^炒 陳皮 白芥子 龍胆草 山查 神麴^炒 炙甘草 引用薑棗

水煎服 勸調理抑肝扶脾湯參朮黃連柴胡良育陳白芥龍胆草山查神麴甘草膏

心痞○心痞面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口煩燥口舌生瘡小使紅胸膈滿悶喜伏卧懶食乾瘦吐利頻瀉心導赤珍珠散
調理可收功註心屬火色赤主血脈故心痞則見面紅目赤壯熱有汗時煩渴咬牙弄舌口舌煩燥渴飲生瘡小使紅赤胸膈滿悶喜
伏卧懶食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱盛兼驚者珍珠散主之病久心虛者茯神湯調理之○瀉心導赤湯方見不書

珍珠散 珍珠^錢 麥冬^{五錢} 天竺黃^{錢三} 金箔^{五片} 牛黃^錢 胡黃連^{錢三} 生甘草^{錢二} 羚羊角 大黃 當歸^錢 砂^錢 雄^錢

黃錢 茯神^{錢五} 犀角^{錢三} 右為細末每服五錢茵陳湯調服

茯神湯 茯神 當歸 炙甘草 人參 引用龍眼肉水煎服 煩熱者加麥冬 方茯神湯內用茯神當歸甘草并人參若煩熱者

入清補兼施功最純

痞渴○肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘露膏熱減津生渴自歇 痞渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津液虧損故不時

大渴引飲心神煩熱速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲 生地黃 麥冬^錢 石斛 知母^生 枇杷葉^炙 石膏^煨 甘草 茵陳蒿 黃芩 引用燈心水煎服 方耗液傷津成

痞渴清熱甘露飲如神生地麥冬斛知母枇杷石膏茵陳

肺病○面白氣逆時咳嗽毛髮焦枯皮栗乾發熱增寒流涕鼻煩生癆號肺病疎散生地清肺散清熱甘露飲為先肺虛補肺散最妙隨證

加減莫遲延註肺屬金色白主皮毛故肺病則見面面白氣逆咳嗽毛髮焦枯皮上生粟肌膚乾燥增汗發熱常流涕涕鼻煩生瘡也先用生地

清肺飲以疎解之繼用甘露飲清之日久肺虛者當以補肺散主之

生地清肺散 桑皮^炒 生地黃 天冬 前胡 桔梗 蘇葉 防風 黃芩 生甘草 當歸 連翹^錢 赤茯苓 引用生薑紅棗水

煎服 勸生地清肺用桑皮生地天冬前胡蘇葉防風黃芩當歸連翹赤苓宜

甘露飲 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬^錢 枳殼^炒 桔梗 黃芩 枇杷葉^炙 茵陳蒿 石斛 引用紅棗水煎服 方甘露飲治

肺火壅生熟地黃二門冬枳殼黃芩枇杷葉茵陳陳石斛煎服

補肺散 白茯苓 阿膠^{蛤粉炒} 糯米 馬兜鈴 炙甘草 杏仁^{炒去} 水煎服 方肺虛補肺散通仙茯苓阿膠糯米攪馬兜鈴配炙甘

草杏仁微炒去皮六

腎痞○解顛顛膝齒行遲骨瘦如柴面黑齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎痞先用金蟾沼九味地黃繼進宜若逢稟賦氣虛弱調元

散進莫遲疑註腎屬水色黑主骨患此痞者初必有解顛顛膝齒行遲骨氣不足等證更因肥甘失節久則漸成腎病故見面色黧黑齒齦出血

口中氣臭足冷如冰腹痛泄瀉喘咳不已之證先用金蟾丸治其痼癰以九味地黃丸調補之若稟賦不足者調元散主之

金蟾丸 乾蝦蟆^{五個} 胡黃連^{各三錢} 鶴龜^錢 肉豆蔻^煨 苦楝根白皮 雷丸 蘆薈^生 蕪荑^{各三錢} 右為末麵糊為漿豆

大九雄黃為衣每服十五丸米湯化下

九味地黃丸 熟地 茱萸肉^{各五錢} 赤茯苓 澤瀉 牡丹皮 山藥^炒 當歸 川棟子^{各三錢} 右為細末煨白蜜為丸如大

實天用白滾水研化食前服

調元散 人參 茯苓 白朮^炒 山藥^炒 川芎 當歸 熟地黃 茯神 黃耆^炙 甘草^炙 白芍 引用薑棗茶煎服 婦調元散

治稟賦弱參苓白朮山藥歸熟地共茯神黃耆甘草同白芍

疳熱○小兒疳疾身發熱輕重虛實當分別初用青蒿飲為宜日久驚甲散最捷疳疾之證身多發熱治者宜分別輕重虛實治之為初起

多實者驚甲青蒿飲主之日久多虛者驚甲散主之

驚甲青蒿飲 銀柴胡 驚甲^炙 青蒿 生甘草 生地黃 赤芍 胡黃連 知母^炒 地骨皮 引用燈心水煎服 疳疔瘰癧瘰癧

發熱驚甲青蒿藥有功銀柴胡驚甲草地均胡連知母地骨同

驚甲散 人參 黃耆^炙 驚甲^炙 生地 熟地 當歸 白芍^炒 地骨皮 水煎服 疳疔瘰癧瘰癧日久骨蒸驚甲散治效從容參看驚

甲生熱地當歸白芍地骨同

腦疳○腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮光急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮腫困倦睛暗身汗熱龍胆龍腦丸甚良吹鼻

龍腦散甚捷註腦疳者因兒素受風熱又兼乳哺失調以致變成此證頭皮光急腦生瘡餅頭熱毛焦髮結如穗鼻乾心煩腮腫困倦睛

暗自汗身熱也腦熱生瘡者龍胆丸主之煩熱羸弱者龍腦丸主之外用吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍胆丸 龍胆草 升麻 苦楝根皮^焙 赤茯苓 防風 蘆薈 油髮灰^{各二錢} 青黛 黃連^{各三錢} 右為細末猪胆汁浸糕糊丸如麻

子大薄荷湯下量兒大小與之

龍腦丸 龍腦 麝香^{各五錢} 雄黃^{二錢} 胡黃連^{三錢} 硃砂^{五分} 牛黃^{一錢} 蘆薈^{三錢} 乾蝦蟆^{四錢} 右為細丸龍胆合丸如麻子大每

服三九薄荷湯下

吹鼻龍腦散 龍腦 麝香^{少許各研細末} 蝸牛殼^炒 蝦蟆反 瓜蒂 黃連 桔梗 細辛^{各等分} 右為細末入磁盒內貯之每取少許吹入

鼻內日吹二次

眼疳○疳熱上攻眼疳成痒泄赤爛胞腫疼白睛生翳漸遮滿流淚羞明目不睜疎解瀉肝散最妙雲翳清熱退翳靈目久不瘥當補養追遠

瀉肝二方從註眼疳者疳熱上攻於眼故發時痒泄赤爛眼胞腫疼白睛生翳漸遮滿不時流淚羞明閉目也先用瀉肝散疏解之再用清



熱退弱湯消其弱若自久不瘥法當調補逍遙散或羊肝散主之

瀉肝散 生地黃 當歸 赤芍 川芎 連翹 龍胆草 大黃 羌活 甘草 生 防風 引用燈心水煎服

治肝熱癰當歸赤芍連翹生地龍胆草大黃羌活草防風

清熱退弱湯 梔子 胡黃連 木賊草 生地 羚羊角 龍胆草 銀柴胡 蟬蛻 赤芍 甘草 生 菊花 蒺藜 引用燈心水煎服

煎服 清熱退弱湯消雲翳梔子連木賊芍生地羚羊角銀柴胡蟬蛻甘草菊藜○逍遙散方見肝病

羊肝散 青羊肝 一具去筋膜 人參 羌活 白木 蛤粉 各等 右為細末令勻聽用將藥置荷葉上如錢厚一層鋪肝一層包圍以新竹青布包裹蒸熟住兒食之如不食者及夏月恐腐壞則曬乾為末早晚白湯調下服完再合以好為度若熱者減人參

鼻疳○疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤癢痛難堪浸淫潰爛連唇際咳嗽氣促髮毛乾熱盛清金化毒致府蟲蝕鼻化蟲九調敷用鼻疳散吹鼻

蟬蛻致通神 註鼻疳者因疳熱攻肺而成益鼻為肺竅故發時鼻塞赤癢痛連唇際連下連唇際成瘡咳嗽氣促髮毛髮焦枯也熱盛者宜清金散將氏化毒丹主之蟲蝕者用化蟲丸主之外用鼻疳散敷之或以吹鼻蟬散吹入鼻內

清金散 生梔子 黃芩 枇杷葉 生地黃 花粉 連翹 麥冬 薄荷 元參 生甘草 桔梗 引用燈心水煎服

金散治肺熱熱梔子黃芩枇杷葉生地花粉連翹麥冬薄荷元參甘草桔○將氏化毒丹 方見胎亦

化蟲丸 蕪荑 蘆薈 青黛 川芎 白芷梢 胡黃連 川黃連 蝦蟆 各等 右為細末猪胆汁浸糕為丸如麻子大每服二十九食後杏仁煎湯下

鼻疳散 青黛 麝香 熊胆 右為細末乾者用猪骨髓調貼濕者乾上

吹鼻蟬散 蟬殼 青黛 蛇蛻皮 滑石 麝香 各等 右為細末每用菜豆大吹入鼻中日三用之疳蟲盡出

牙疳○疳成毒熱內攻胃上發齦肉赤爛口臭血出牙枯落穿腮蝕唇命多頃攻毒消疳無荑效繼以蘆薈肥兒靈外用牙疳散時上能食

堪藥始能生 註牙疳者因毒熱攻胃而成故毒熱上發齦肉赤爛疼痛口臭血出牙枯脫落穿腮蝕唇病勢危急急用消疳蕪荑湯瀉其熱毒繼以蘆薈肥兒丸清其餘熱外用牙疳散時敷之自愈總之此證必胃強能食堪勝藥始有生機否則難治也

消疳蕪荑湯 大黃 芒硝 蕪荑 蘆薈 川連 胡黃連 黃芩 雄黃 水煎服後便較反不食者去大黃芒硝加石膏羚羊角

牙疳散 人中白 綠礬 五倍子 冰片 右為極細末先用水拭淨牙齒再以此散敷之有蟲者加枳榔

脊疳○積熱生蟲蝕脊脊骨若鼓高瘦弱脊骨鋸齒狀身熱下利煩渴增十指皆瘡齒爪甲此名脊疳病勢凶蘆薈凡同金蟾散急急

調治莫從容 註脊疳者因熱生蟲上蝕脊脊骨也以手擊其背必空若鼓鳴脊骨瘦弱狀若鋸齒始為脊疳外證亦身體發熱下利煩渴十指

知要錄 卷五十二 編輯幼科雜病心法要訣

皆瘡癰毒入甲其證最為可畏須先以蘆薈丸殺其蟲繼用金蟾散消其瘡臨時調治或可愈也

蘆薈丸 生蘆薈 青黛 硃砂 熊胆 胡黃連 貫眾 地龍微炒 川黃連 蟬蛻去足 雷丸各五錢 麝香一錢 蝦蟆一個酥

細末用蠟角肉研和丸如麻子大每服五丸粥飲下量兒大小與之

金蟾散 蟾一枚酥 夜明砂炒 桃白皮 栲根白皮 地榆 黃藥 訶黎勒煨 百合 人參 太黃 白蘞煨 胡粉各三錢

椰錢 丁香三十粒 右為細末每服五分粥飲調下

蛔疳○過食膩冷與肥甘溼熱生蛔腹內纏時煩多啼時腹痛口唇色變溢清涎腹脹青筋肛溼癢多言散治莫遲延不愈下蟲尤極難治

補脾肥兒丸註 蛔疳者因過食生冷油膩肥甘之物以致溼熱生蟲腹中擾動故有時煩燥多啼有時肚腹攪痛口唇或紅或白口溢清涎腹

脹青筋肝門溼癢也先用使君子散治之不愈下蟲丸主之若蛔退又當調補其脾肥兒丸主之

使君子散 史君子十個瓦上 苦楝子五個泡 白蘞煨 甘草各一錢胆 右為末每服一錢水調服

下蟲丸 苦楝根皮新白者佳 木香 桃仁去皮 綠包貫眾 蕪荑煨 雞心檳榔各二錢 輕粉五分 鶴虱一錢 乾蝦蟆三錢 史君子

肥兒丸 方見脾疳 右為末麵糊成丸如麻子大每服二十丸滾白水下

無辜疳○無辜疳傳有二因鳥羽汚衣著兒身或緣乳母病傳染頸項瘡核便利膿蟲食藏府身羸弱面黃發熱致疳生清熱宜用柴胡飲消

疳肥兒效如神註 無辜疳者其病原有二或因浣衣夜露被無辜鳥落羽所汚兒著衣後致成此證或因乳母有病傳染小兒以致此疾其證

頸項生瘡或項內有核如彈按之轉動軟而不疼其中有蟲如米粉不速破之使蟲食藏府便利膿血身體羸瘦面黃發熱也治宜先清其熱

柴胡飲主之再消其疳以蘆薈肥兒丸主之

柴胡飲 亦芍藥 柴胡 黃連 半夏製 桔梗 夏枯草 龍胆草 浙貝母 黃芩 甘草生

引用燈心水煎服 歌柴胡飲治無

辜疳亦芍藥 柴胡 黃連 半夏製 桔梗 夏枯草 龍胆草 浙貝母 黃芩 甘草生

蘆薈肥兒丸 方見肝疳

丁癸疳○偏身骨露癰丁癸肌肉乾涸晝夜啼手足枯細面鰐黑項細腹大突出臍尻削身軟精神倦骨蒸潮熱渴煩急化滯五疳消積治補

養人參啟脾宜註 丁癸者偏身骨露其狀似丁故名白丁癸也其證肌肉乾涸晝夜啼哭不已手足枯細面色黑項細腹大肚臍突出尻削身軟精

神倦怠骨蒸潮熱燥渴煩急也先用五疳消積丸化其滯繼用人參啟脾丸理其脾病可漸愈矣

五疳消積丸 史君子肉五錢 麥芽炒 陳皮 神麴炒 山查各一 白蘞煨 黃連 胆草各三錢

飲下 右為末陳米飯為丸每服一錢米

人參啟脾丸 人參五錢 白朮五錢 白茯苓五錢 陳皮四錢 扁豆五錢 山藥五錢 木香二錢 穀芽三錢 神麴三錢 炙甘草二錢

右研細末煉蜜為丸重一錢用建蓮湯化下

嘔噎○乳食不節傷脾胃氣虛如柴嘔噎虛成多食吐蟲多煩渴頭骨開張嘔噎紫先用集聖清積滯繼用肥兒其有靈者還腹大青筋參九服莫從容 註嘔噎者因乳食不節大傷脾胃也其證羸瘦如柴吐食吐蟲心煩口渴頭骨開張日嘔蒸熱先用集聖丸消其積滯再用肥兒丸清理其脾胃若嘔噎日久壯大青筋者又宜清補兼施以人參丸主之

集聖丸 蘆薈炒 五靈脂炒 夜明砂淘洗 縮砂 木香 陳皮 莪朮 史君子肉 黃連 川芎酒洗 乾蟾各二錢 當歸五錢

青皮五錢 右為細末用雄豬胆二個取汁和麵糊為丸每服一錢米飲送下○肥兒丸 方見脾胃

人參丸 人參 麥冬去心 半夏製 大黃炒 黃耆炙 茯苓 柴胡 黃芩 炙甘草 川芎 龜甲炙 訶黎勒各二錢 右為細末煉蜜

為丸如麻子大以粥飲下量兒大小用之

吐證門

吐證總括○諸逆上衝成嘔吐乳食傷胃或夾驚或因痰飲或蟲擾虛實寒熱要分明 註嘔吐一證皆諸逆上衝所致也夫諸逆之因或因食過多停滯中脘致傷胃氣不能健運而上逆也或於食時觸驚停積不化而上逆也或痰飲壅盛阻隔氣道或蟲擾亂懷不安而上逆也總之上逆之因雖不同而皆能成嘔吐也但病者有虛有實有寒有熱治者當於臨證時參合兼見之證審慎以別之庶不致誤矣 辨吐嘔噎證○有物有聲謂之嘔有物無聲吐證名無物有聲謂噎證分別醫治中病情 註嘔有三曰嘔曰吐曰噎古人謂嘔屬陽明有聲有物氣血俱病也吐屬太陽有物無聲血病也噎屬少陽有聲無物氣病也獨李杲謂嘔吐噎俱屬脾胃虛弱滯古老人又從三焦以分氣積寒之三因然皆不外諸逆上衝也治者能分虛實別寒熱以治之自無不曲中病情矣

傷乳吐○乳食過飽蓄胃中乳片不化吐頻頻身熱面黃腹膨脹治宜消乳丸保和丸化其宿乳安胃和中節其乳食自然止也

乳片猶如物盛滿而上溢也其證身熱面黃腹膨脹治宜消乳丸保和丸化其宿乳安胃和中節其乳食自然止也

消乳丸 香附製 神麴炒 麥芽各一兩 陳皮錢 宿砂炒 甘草各五錢 右為細末滴水為丸如粟米大量兒大小服之薑湯送下

保和丸 南山楂二兩 神麴炒 茯苓各一兩 連翹心 陳皮 萊菔子銹炒 右為細末麵糊為丸麥芽湯化服

傷食吐○過食傷胃腹脹熱惡食口臭吐酸粘眼胞虛浮身潮熱須服三稜和胃煎傷食吐者因小兒飲食無節過食油膩麴食等物以致壅塞中脘而成也其證肚腹脹熱惡食口臭頻吐酸粘眼胞虛浮身體熱潮治宜清胃和中為主先用三稜丸止其吐再用和胃湯化其滯而

病漸愈矣

三稜丸 三稜煨 陳皮 半夏製 神麴各一兩 黃連炒 枳實炒 丁香各五錢 右研細末麵和為丸如黃米大每服二十丸食後薑湯下

和胃湯 陳皮 半夏錢 縮砂仁研 蒼朮炒 厚朴炒 藿香葉 香附炒 甘草炙 山查 神麴炒 引用薑水煎服 和胃湯

治嘔吐頻陳皮半夏縮砂仁蒼朮厚朴藿香葉香附甘草山查神

夾驚吐○食時觸異吐清涎身熱心煩睡不安截風觀音散極妙止吐定吐丸可痊註夾驚吐者多因飲食之時忽被驚邪所觸而致吐其

證頻吐清涎身熱發熱心神煩躁睡不安先用全蠍觀音散截其風次用定吐丸止其嘔而病可痊矣

全蠍觀音散 人參錢三 黃耆錢三 扁豆炒 茯苓錢五 蓮肉三錢 木香分錢五 白芷錢二 羌活 防風 天麻 全蠍各三錢

甘草一錢 右為細末薑棗煎湯調服量兒大小與之

定吐丸 丁香二十粒 蠍梢四十九 半夏三錢 右為細末令勻煮棗肉為丸如黍米大每服七丸金器煎湯化服

痰飲吐○痰飲壅塞在胸中痰因氣逆嘔吐成眩暈面青吐涎飲香砂二陳六君寧註痰飲吐者由小兒飲水過多以致停滯胸膈變而為痰

痰因氣逆遂成嘔吐之證其候頭目眩暈面青嘔吐涎水痰沫也宜用香砂二陳湯虛者香砂六君子湯治之

二陳湯 方見嘔乳本方加藿香砂仁

香砂六君子湯 藿香 宿砂仁 白朮炒 人參 茯苓 半夏錢 陳皮 甘草炙 引用生薑水煎服 香砂六君子虛痰吐者香

砂共白朮人參茯苓及陳皮半夏甘草同煎服

蟲吐○蟲吐胃熱或胃寒色變時疫嘔清涎寒熱當以陰陽辨化蟲加減理中症註蟲吐之證有二有以胃經熱蒸者有以胃經寒迫者皆能

令蟲不安擾亂胃中而作吐也其證唇色或紅或白胃口時痛時止頻嘔清涎屬寒屬熱當從陰陽之證辨之熱者化蟲丸主之寒者加減理

中湯主之

化蟲丸 蕪荑錢五 鶴蟲 苦楝根皮 胡粉 史君子肉 枳榔各一兩 枯礬二錢 右為細末麵糊為丸量兒大小用之

加減理中湯 人參 乾薑 白朮炒 川椒 引用烏梅一個水煎服 加減理中寒吐蟲人參乾薑白朮從川椒烏梅伏蟲動煎成服

下即安寧

虛吐○虛吐多因胃弱成神倦顫動睡露睛自利不渴頻嘔吐丁沉四君藥最靈註虛吐之證多因胃氣虛弱不能消納乳食致成此證也其

精倦怠顫門煽動睡臥露睛自利不渴頻嘔吐者以丁香四君子湯治之

丁沉四君子湯 人參 白朮炒 茯苓 炙甘草 丁香 沉香 引用煨姜水煎服 助胃嘔虛吐不思食丁沉四君治最良參朮苓草

補其胃丁香沉香溫其脾

實吐○小兒實吐腹脹滿二便不利痞硬發渴思涼吐酸臭三一承氣可收功註實吐者小兒平素壯實偶而停滯胸腹脹滿二便秘澀痞

硬痰痛口渴思飲寒涼吐多酸臭也宜用三一承氣湯下之二便利而吐止矣

