

幼科心法要法

初生門下

驚風

痢症

疳症

吐症

瀉症

感冒

瘟疫

暑症

霍亂

痢疾

瘧疾

痧脹

嘔症

疳症

淋症

腰痛

膝痛

黃疸

水腫

腹脹

朱田元

醫宗金鑑內科

卷五

五五五五

拾貳冊



編輯幼科雜病心法要訣

初生門下

目爛 兒初生目痛難睜胞邊赤爛胎熱內攻用地黃湯清熱外點真金目即明註目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中
蘊熱生後毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以清熱外用真金散以點目其證自愈

生地黃湯 方見目不開

真金散 黃連生 黃蘗生 當歸 赤芍藥 各一 杏仁 五分炒 右剉散乳汁浸一宿晒乾為極細末用生地黃汁

調一匙頻頻點眼即愈

懸癰 脛上腫起號懸癰皆因胎熱上冲法當刺破鹽湯拭如聖一字搽之靈註凡喉裏上脛腫起如蘆葦盛水狀者

日懸癰蘆葦者蘆葦也此胎毒上攻須以綿繯長鍼留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再刺刺後以鹽湯拭口用如

聖散或一字搽之

如聖散 鉛霜 錢一 真牛黃 錢一 太陰元 石 硃砂 各二錢五 龍腦 五 右為末每用一字搽患處

一字散 硃砂 飛水 硃砂 各五 龍腦 朴硝 各一 右為極細末用蜜調少許鵝翎蘸搽口內

重齟 重齟胎熱胃中蓄牙根腫脹痛難禁刺破一字散敷上繼進清胃效如神註重齟者因小兒在胎有熱蓄於胃中

故牙根腫如水泡名曰重齟治法用鍼刺破以鹽湯拭淨外敷一字散內服清胃散其腫自消

一字散 方見懸癰

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 石膏 用 引用燈心水煎服 方清胃散治胃熱重生地黃連當歸身

丹皮升麻石膏煨臨煎須要入燈心

鵝口 鵝口白屑滿舌口心脾蘊熱本胎原清熱瀉脾搽保命少遲糜爛治難痊註鵝口者白屑生滿舌口舌如鵝口也由

在胎中受母飲食熱毒之氣蘊於心脾二經故生後遂發於口舌之間治法以清熱瀉脾散主之外用髮蘸井水拭口搽

以保命散日敷二三次自退自安倘治之稍遲必口舌糜爛吮乳不得則難痊矣



清熱瀉脾散 山梔炒 石膏煨 黃連燼 生地 黃芩 赤苓 引用燈心水煎服 方清熱瀉脾治鵝口石膏生

地赤苓煎 連梔子合成劑加入燈心病即愈

保命散 白礬燒灰 硃砂各二錢五分 馬牙硝五 右研末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上

吐舌 吐長收緩各吐舌皆是心經有熱成面紅煩渴溺赤瀉瀉心導赤服即靈 註吐舌者伸長而收緩也因心經有熱

所致故面紅煩燥口渴尿赤宜瀉心導赤湯主之

瀉心導赤湯 木通 生地 黃連 甘草生 引用燈心水煎服 方瀉心導赤湯最良心熱吐舌即堪嘗木通生地

黃連草燈心加入服自強

弄舌 弄舌時時口內搖心脾熱發口唇焦燥熱舌乾大便穢瀉黃芩赤並龍療 註兒熱口中搖動者因心脾有熱以致

唇焦口乾煩熱便穢先用瀉黃散次用瀉心導赤湯

瀉黃散 藿香葉 山梔子炒 石膏煨 防風 甘草生 引用燈心水煎服 方弄舌瀉黃散最神藿香葉配山梔

仁甘草防風石膏煨臨時煎服入燈心

瀉心導赤湯方見吐舌

重舌 古下腫突似舌形心脾積熱上攻衝內服宜以清熱飲外敷涼心功最靈 註重舌者因舌下近舌根處其腫形如

舌故名重舌此心脾之熱宜服清熱飲外吹涼心散

清熱飲 黃連生 生地 木通 甘草生 連翹去心 蓮子 引用淡竹葉水煎服時時灌入口中 方清熱飲內

用黃連生地蓮子木通甘草連翹更加淡竹葉一同煎服自然安

涼心散 青黛 硼砂 黃蘗 黃連人乳拌晒 人中白各二錢 風化硝錢 冰片二分 右為極細末吹之甚效

木古 木古心脾積熱成腫脹木硬證多凶外用川硝數古上內服瀉心導赤靈 註木古一證皆因心脾積熱而成蓋脾

之脈絡在舌下又舌為心苗過大上衝令兒舌腫滿木硬不能轉動故名木古外用川硝散數古上內服瀉心導赤湯若

不急治必致難救

川硝散 朴硝五 真紫雪二 鹽一分 右為細末以竹涎調敷舌上

瀉心導赤散 方見吐舌

嘔乳 嘔乳之候非一端傷乳停痰胃熱寒熱宜和 中清熱飲寒用溫中止吐煎傷乳平胃散最妙停痰二陳湯可發若
是滿而自溢者常須節乳自能安註小兒嘔乳證非一端有宿乳停痰胃寒胃熱之分不可一例而治如面色多赤二便
微秘手足指熱此為熱嘔也宜和中清熱飲主之面色青白薑青多手足指冷此因寒而嘔也宜溫中止吐湯至之只熱
唇乾夜卧不寧手足心熱此為傷乳而嘔也宜平胃散主之胸膈膨脹嘔吐痰涎此因停痰而嘔也宜枳桔二陳湯主之
若嬰乳過多滿而自溢者不須服藥惟節乳則嘔自止矣

和中清熱散 黃連炒 半夏製 陳皮 茯苓 藿香 砂仁 引用薑水煎服 方和中清熱飲黃連半夏陳皮茯苓

苓攢薑香砂仁合成劑水煎條服可安全

溫中止吐湯 白豆蔻研 茯苓 半夏製 生薑 水煎沖磨沉香汁服 方溫中止吐白豆蔻茯苓半夏共生薑

服沉香汁加入專治嘔乳自寒傷

平胃散 蒼朮炒 陳皮 厚朴薑 甘草炙 麥芽炒 砂仁研 引用薑水煎服 方小兒傷乳多吐嘔平胃調和

功可見蒼陳厚朴甘草偕加入麥薑

枳桔二陳湯 枳殼炒 桔梗 陳皮 半夏製 茯苓 甘草炙 引用薑水煎服 方停痰嘔乳不能安枳桔二陳

湯最先枳桔陳半苓甘草生薑加入即時

夜啼 夜啼寒熱因胎受須將顏色辨分明寒屬脾經面青白手腹俱冷曲腰疼面赤溺閉屬心熱熱用導赤寒鈎藤若

無寒熱表裏證古法蟬花散最精註小兒初生夜啼其因有二一曰脾寒一曰心熱皆受自胎中觀其形色便知病情矣

如面色青白手腹俱冷不欲吮乳曲腰不伸者脾寒也鈎藤飲主之面赤唇紅身腹俱熱小便不利煩躁多啼者心熱也

導赤散主之若非以上形證但夜啼者用蟬花散最當

鈎藤飲 川芎 白當歸 茯神 白芍炒 茯苓 甘草 木香煨 鈎藤鈎 引用紅棗水煎服 方夜啼之證因

脾寒須服鈎藤飲可 芎歸神芍苓甘草木香鈎藤紅棗煎

導赤散 方見小便不通

蟬花散 蟬蛻不拘多少 用下半截 石研細末每服少許薄荷煎湯調下

胎黃 兒生偏體色如金溼熱熏蒸胎受深法當溼熱地黃犀角二方神註胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃

孕婦濕熱太盛小兒在胎受母熱毒故生則有是證也法當溼熱清熱須分輕重治之色微黃者生地黃湯深黃者犀角

生地黃湯 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 赤茯苓 澤瀉 猪苓 甘草生 茵陳蒿 引用燈心水煎服

煎服 方胎黃須用地黃湯四物花粉赤苓良澤瀉猪苓甘草等茵陳加入水煎膏

犀角散 犀角錢 茵陳蒿 枯蘗根 升麻 甘草生 龍胆草 生地 寒水石煨 水煎不拘時服 歌胎黃又耳

犀角散甘草犀角與茵陳升麻胆草生地共寒水石同枯蘗根

胎赤 胎赤胎中受熱毒生後偏體若丹塗清熱解毒湯極妙蔣氏化毒功效殊 註胎赤者因孕婦過食辛熱之物以致

毒熱凝結蘊於胞中遂令小兒生下頭面肢體赤若丹塗故名曰胎赤當以清熱解毒湯王之熱盛便秘者蔣氏化毒湯

主之

清熱解毒湯 生地 黃連 金銀花 薄荷葉 連翹去心 赤芍 木通 甘草生 引用燈心水煎服 歌清熱

解毒湯堪誇生地黃連金銀花薄荷連翹赤芍藥木通甘草燈心加

蔣氏化毒方 犀角 黃連 桔梗 元參 薄荷葉 甘草生 大黃各一兩生 青黛錢五 右為細末煉白蜜為丸重六

分每服一丸燈心湯化服

赤游風 赤游胎中熱毒成皮膚赤腫偏身行頭面四肢猶可治若歸心腹命難生內服犀角藍葉散外用砭法數神功

百日之內忌砭血貼塗二法可安 註小兒赤游風證多由胎中毒熱而成或生後過於溫煖熱毒蒸發於外以致皮膚

赤熱而腫色若塗丹游走不定行於偏身故名曰赤游風多發於頭面四肢之間若內歸心腹則死治法當服犀角解毒

飲如不愈燻以藍葉散外用砭法刺出毒血毒甚者敷以神功散毒輕者不用敷藥在百日内者小兒忌砭血以其肌肉

難任也須用猪肉貼法或以赤小豆末雞子清調塗之甚效

犀角解毒飲 牛蒡子炒 犀角 荆芥穗 防風 連翹去心 金銀花 赤芍藥 生甘草 川黃連 生地黃

引用燈心水煎服 歌犀角解毒藥最良牛蒡犀角合荆防連翹銀花赤芍藥甘草川連生地黃

藍葉散 藍葉錢五 黃芩 犀角屑 川大黃炒 柴胡 梔子錢二 川升麻錢一 石膏錢一 生甘草錢一 右為粗

末每服一錢水一小杯煎五分去渣兌竹瀝一酒盞煎三兩沸放溫量見大小用之氣怯弱者去大黃

砒血散 口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將筋頭劈開夾住用線縛定兩指輕撮筋梢令磁芒對聚血處

再用筋一根頻擊刺出毒血砒後毒甚者以神功散敷之毒輕者砒後不可用恐皮膚既破草烏能作痛也如患在頭

者不用砒法祇宜卧鍼倒挑患處出毒血則愈

神功散 黃蘗炒 草烏生 石各為末等分用漱口水調敷頻以漱口水潤之

猪肉貼法 用生猪肉切片貼於赤腫處數數更換

塗法 生赤小豆不拘多少研為細末用雞子清調塗調患處乾則再塗

初生無皮 兒生無皮有二端父母梅毒遺染傳或因未足月生早無皮赤爛痛難堪梅毒換肌消毒散胎怯當歸飲能

痊外敷清涼鵝黃粉毒解形完膚自堅註嬰兒生下無皮其證有二或因父母素有楊梅結毒傳染胞中故生下或上半

身赤爛或下半身赤爛甚至色帶紫黑又有因月分未足生育太早偏體浸漬紅嫩而光二證俱屬惡症遺毒者內服換

肌消毒散外用清涼膏或鵝黃散敷之胎元不足者內服當歸飲外用稻粉米撲之毒解形完者謂解去毒氣其皮自漸

漸生完而堅實矣

換肌消毒散 當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 皂刺 土茯苓 金銀花 連翹 去心甘草 生 白芷 苦參

白蘚皮 防風 引用燈心水煎服 方無皮換肌消毒治四物皂刺土茯苓銀花連翹草白芷苦參白蘚皮防風

當歸飲 何首烏製 白蘚皮 白蒺藜 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎 水煎服

方當歸飲治兒無皮面白肢冷服最宜首烏蘚皮白蒺藜甘草四物共參者

清涼膏 石灰四兩木經水 用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多少對小

磨香油亦如之以順攪成膏為度用雞翎搽之自愈

鵝黃散 黃蘗生 石膏各等分 共研為細末撲之溼則乾撲乾則用猪苦胆調搽

撲粉法 早稻白米作粉時時撲之其皮漸生神效

變蒸 萬物春生夏熱長兒生同此變形神三十二天為一變六十四日為一蒸變長百骸生藏府蒸增智慧發聰明十八五百七十六變蒸既畢形神成變蒸之狀身微熱耳尻骨冷無病情註天地生初萬物必以春溫夏熱見之化生變生神形亦同此理自生之日至三十二日曰一變至六十四日曰一蒸變則長其百骸生其藏府蒸則增其智慧發其聰明也日十八五百七十六者謂十變五蒸之外又有三大蒸合計五百七十六日也變蒸既畢形神具足此後則不復變矣然每變蒸之時其狀惟身微熱耳冷尻骨冷而無他病情狀蓋以陰陽和變生化形神故無他病情狀也身微熱者以陰陽氣血之氣變蒸而然也耳尻冷者耳尻屬陰以陽不傷陰而與陰和之象故不熱也按變蒸既曰生五臟六府次序又曰包絡三焦二經俱無形狀故不變不蒸夫胞絡乃周身脂膜聯絡百骸藏府者三焦乃軀殼內氣充滿百骸藏府者變蒸時豈獨不及之耶其說不經細閱靈素自知附辨以俟識者

驚風門

驚風總括 心主驚今肝主風心熱肝風作急驚素虛藥峻因成慢吐瀉後起慢脾風急驚陽症有定象慢脾陰證有虛形慢驚半陰半陽證虛實寒證要詳明註心藏神心病故心驚也肝屬木肝病故主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風大相搏必作急驚之證也若素稟不足或因急驚用藥過峻暴傷元氣每致變成慢驚之證更有因吐瀉既久中氣大虛脾土衰弱肝木乘虛而内生驚風者名曰慢脾風也三者致病之因既不同故所現之證亦各異急驚屬陽必有陽熱有餘等是象也慢脾屬陰必有陰冷不足等虛象也至於慢驚初得之時陰陽尚未過損或因急驚傳變而成其中常有夾痰夾熱等證故屬半陰半陽不比慢脾純陰之病也治者須詳分虛實寒熱以治之庶不致悞矣

驚風八候 驚風八候搐搦掣顫反引躓視之名肘臂伸縮名為搐十指開合撮狀成勢若相撲謂之掣顫則頭筋動搖鈴反張身仰頭向後引狀兩手若開弓竄則目直常似怒視則覩物不轉睛內外左右分順逆須識急慢證皆同註八候謂搐搦掣顫反引竄視是也搐謂肘臂伸縮搦謂十指開合掣謂肩頭相撲顫謂手足動搖反者身仰向後引者手若開弓竄則目直而似怒視則睛露而不活其搐以男左手女右手男大指在外女大指在內為順反是為逆此候急驚慢驚同皆見之虛實無所異焉治者宜切記之

通關急救法

驚風搐搦神昏憤痰壅塞在心胸急用通關吹入鼻內變則死有嘆生註驚風搐搦必神昏憤皆由

痰雍氣壅壅結胸中而致急用通關散入鼻內無嚏者不治有嚏者留其衣裏虛實隨證治之

通關散 半夏生 皂角 細辛 薄荷各等分 共為細末用筆管吹入鼻內少許

急驚風 急驚觸異心驚熱或由風鬱大生風暴發痰盛或熱極壯熱煩急面唇紅痰壅氣促牙關緊二便秘澀脈數驚用鎮驚風至寶牛黃攻痰涼膈清平治羌活瀉青等化痰導赤共涼驚註急驚風一證有因目觸異物耳聞異聲神散氣亂而生者有因心肝大盛外為風寒鬱閉不得宣通而生者有因痰盛熱極而內動風者然證多暴發壯熱煩急面唇赤赤痰壅氣促牙關緊急二便秘澀急者齒緊急不能開也二便秘澀者大便秘結而小便澀難也脈洪數者主陽熱也觸異致驚者清熱鎮驚湯安神鎮驚丸主之大鬱生風者至寶丹主之痰盛生驚者牛黃丸攻下之熱極生風者涼膈散清解之病不甚者則用平治之法風熱者羌活散主之肝熱者瀉青丸主之痰熱者清熱化痰湯主之心經熱者導赤散涼驚丸主之惟在臨證者審而用之

清熱鎮驚湯 柴胡 薄荷 麥冬心 梔子 川黃連 胆龍草 茯神 鈎藤鈎 甘草生 木通 引加燈心竹

葉調硃砂末服 方清熱鎮驚治外驚柴胡薄荷麥冬梔子黃連龍胆草茯神鈎藤草木通

安神鎮驚丸 天竺黃 茯神各五錢 胆星 棗仁炒 麥冬心 赤芍 當歸各三錢 薄荷葉 黃連 辰砂 牛黃

梔子 木通 龍骨各三錢 青黛一錢 右為細末煉蜜丸如菜豆大赤金箔為衣量見大小與之薑湯化下

至寶丹 麻黃 防風 荊芥 薄荷 當歸 赤芍 大黃 芒硝 川芎 黃芩 桔梗 連翹心 白朮炒

梔子 石膏煨 甘草生 滑石 全蠍去毒 細辛 天麻 白附子 羌活 僵蠶炒 川連 獨活 黃蘗各等分

右共為細末煉蜜為丸每丸重五分量見大小與之薑湯化下

牛黃丸 黑牽牛 白牽牛各七錢半 胆星 枳實煨 半夏各五錢 牙皂二錢 去皮錢 大黃一兩半 右研極細末煉蜜為

丸每丸重五分量見大小與之薑湯化下

涼膈散 黃芩 大黃 連翹心 芒硝 甘草生 梔子 薄荷 引用竹葉生蜜煎服 無汗者加防風羌活方涼

膈散治膈熱盛梔翹苓薄芒硝黃便秘硝黃加倍用無汗更加羌活防

羌活散 羌活 防風 川芎 薄荷 天麻 僵蠶炒 甘草生 川黃連 柴胡 前胡 枳殼煨 桔梗 引用

上海錦章書局石印

生薑水煎服

歌方羌活散風兼清熱羌防川芎薄荷葉天麻殭蠶草黃連柴胡前胡枳椇桔

瀉青丸

龍胆草焙

梔子

大黃煨

羌活

防風各一錢

川芎半錢

右研末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉薄荷湯調下

清熱化痰湯

橘紅

麥冬去心

半夏製

赤苓

黃芩

竹茹

甘草生

川連

枳殼炒

薑燈心水煎服

歌方清熱化痰有橘紅麥冬半夏赤茯苓竹茹黃芩生甘草川連枳殼胆南星

瀉心導赤湯

方見木舌

源驚丸

龍胆草

防風

青黛各三錢

鈎藤鈎二錢

黃連五錢

牛黃一錢

右研細末麩糊為丸如粟米大薑水小兒

之全器煎湯化下

急驚後調理法

急驚之後尚未清痰熱琥珀抱龍靈神虛氣弱痰兼熱清心滌痰大有功註急驚多用寒涼之藥亦急

則治標之法但得痰大稍退即當調補氣血若過用寒涼必致轉成慢驚等證故驚邪一退餘熱尚在者當用琥珀抱龍

丸主之若脾虛多痰者宜清心滌痰湯主之

琥珀抱龍丸

人參

琥珀

茯神各五錢

山藥一兩

甘草四兩

檀香三錢

天竺黃

枳殼炒

枳實各五錢

辰砂三錢

膽星五錢

赤金箔二十

右為細末煉蜜為丸每丸重五分大兒一丸小兒半丸淡薑湯化下

清心滌痰湯

竹茹

橘紅

半夏製

茯苓

枳實炒

甘草生

麥冬去心

東仁炒

人參

川黃連

引用生薑水煎服

歌方清心滌痰湯效靈補正除邪兩收功參苓橘半連茹草枳實當歸星麥冬

慢驚風

慢驚多緣稟賦弱或因藥峻損而成緩緩搖搦時作止面白青黃身則溫昏睡眼合睛或露脈遲神慘大便青

氣虛夾痰醒脾效脾虛肝旺緩肝靈註慢驚一證或緣稟賦虛弱土虛木盛者有之或由急驚過用峻利之藥以致變

成此證者有之發時緩緩搖搦時作止面色淡黃或青白相兼身必溫和昏睡眼合或睡卧露睛脈來遲緩神氣慘

慘大便秘色此乃脾胃虛弱治宜培補元氣為主虛而夾痰者醒脾湯主之脾虛肝旺者緩肝理脾湯主之

醒脾湯

人參

白朮炒

茯苓

天麻

半夏製

橘紅

全蠍去毒

殭蠶炒

甘草炙

緩肝理脾湯

廣桂枝

人參

白茯苓

白芍藥炒

白朮炒

陳皮

山藥炒

扁豆炒

甘草炙

引用煨薑大

棗水煎服

歌肝旺脾虛發肝湯桂枝參芍末良陳皮山藥扁豆草煎服之時入棗薑

火熱夾痰慢驚 慢驚夾熱或火痰身熱心煩口溢涎宜以清心滌痰治白丸柴芍六君煎 註慢驚之證本無熱可治但

脾虛虛熱內生故痰涎上泛咽喉氣粗身心煩所謂虛火熱痰是也痰熱相兼者清心滌痰湯主之脾虛肝旺痰盛者

青州白丸 柴胡六君湯主之

清心滌痰湯 方見急驚後調理法

青州白丸 生川烏 五錢去 生半夏 七兩 南星 三兩 白附子 二兩 右為末盛生絹袋內用井花水攪出粉末盡

再攪以粉盡為度置磁盆內日晒夜露每早撒去舊水別用新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾研為細

末用糯米粉煎粥清丸菜豆大每服三五丸薄荷湯送下

柴芍六君子湯 人參 白朮 炒 茯苓 陳皮 半夏 薑 甘草 炙 柴胡 白芍 炒 鈎藤鈎 引用薑水煎服

歌脾虛木旺風痰盛四君人參末草苓痰盛陳半因加入肝風更用柴芍藤

慢脾風 肝盛脾衰金氣弱金失承制木生風每因吐瀉傷脾胃閉目搖頭面唇青額汗皆睡身肢冷舌短聲啞嘔澄清

溫中補脾為主劑固真理中隨證從 註慢脾風一證多緣吐瀉既久脾氣大傷以致土虛不能生金全弱不能制木肝木

強盛惟脾是尅故曰脾風閉目搖頭面唇青額汗皆睡四肢厥冷舌短聲啞頻嘔清水此乃純陰無陽之證逐風則無

風可逐治驚則無驚可治惟宜大補脾土生胃回陽為主吐瀉亡陽者溫中補脾湯主之大病後成者固真湯主之四肢

厥冷者理中湯加附子主之

溫中補脾湯 人參 黃耆 炙 白朮 炒 乾薑 附子 製 半夏 薑 陳皮 茯苓 砂仁 肉桂 去粗 白芍 炒 炙

甘草 炙 丁香 引用薑水煎服 歌慢脾溫中補脾湯參耆白朮共乾薑陳半附苓縮砂桂白芍甘草共丁香

固真湯 人參 白朮 炒 肉桂 去粗 白茯苓 山藥 炒 黃耆 炙 甘草 煨 炙 甘草 湯去皮 炙 甘草 湯去皮 炙 甘草 湯去皮 炙

服 歌固真湯治慢脾風人參白朮桂茯苓山藥黃耆煨甘草附子浸泡最宜精

理中湯 方見不乳

痢證門

上海錦章書局石印

痾證統括 小兒痾證類經驚發時昏倒搐涎聲食頃即甦如無病陰陽驚熱疾食風 痾證類予驚風痾證者謂時昏倒抽搐涎涎壅盛氣促作聲與驚痾一證相似也但四體柔軟一食之頃即醒依然如無病之人非若痾風一身強硬終日不醒也陰者陰痾也見藏陰證陽者陽痾也見府陽證驚痾因驚熱疾痾因疾食痾因食風痾因風其證不一治亦不同臨證宜詳辨之

陰痾 陰痾屬藏肢厥冷偃卧拘急面白青吐沫聲微脈沉細醒脾固真定痾靈 陰痾屬陰藏寒之病也或因慢驚之後疾入心包而得發時手足厥冷偃卧拘急面青白口吐涎沫聲音微小脈來沉細輕者醒脾湯甚者固真湯病過調理用定痾丹主之

醒脾湯 方見慢驚門 固真湯 方見慢脾風

定痾丹 人參^{三錢} 當歸^{三錢} 白芍^{三錢} 茯神 棗仁^{各五錢} 遠志^{三錢} 琥珀^{三錢} 天竺黃^{四錢} 白朮^{五錢} 煨

半夏^{三錢} 天麻^{各三錢} 鈎藤^{鈎四錢} 甘草^{二錢} 右共為細末煉蜜丸如榛子大每服一丸淡薑湯化服

陽痾 陽痾屬府身熱汗仰卧面赤脈數洪喋急啼吐沫涎龍胆湯青與抱龍 陽痾屬陽府熱之病也或因急驚去風下痰不淨久而致成此證發時身熱目汗仰卧面赤脈象洪數牙關喋急或啼叫不已口吐涎沫如風兼熱者用龍胆湯肝經熱者用瀉青丸痰涎壅者用四製抱龍丸主之

龍胆湯 方見慢驚門 瀉青丸 方見急驚風

四製抱龍丸 天竺黃^{五錢} 辰砂^{二錢} 膽星^{一兩} 雄黃^{二錢} 麝香^{一分} 右為極細末另用麻黃款冬花甘草各五錢煎

湯去滓慢火熬成膏合藥末為丸如芡實大每服一丸薄荷湯送下

驚痾 驚痾觸異驚神氣吐舌急呌面白紅發作如人將捕狀安神大青鎮驚靈 小兒心肝熱盛偶被驚邪所觸因而神氣潰散遂成痾證發時吐舌急呌面色乍紅乍白悚惕不安如人將捕之狀先服大青膏次服鎮驚丸驚則痾自定矣

大青膏 天麻^{三錢} 白附子^{二錢} 青黛^{一錢} 蠅尾^{一錢} 硃砂^{一錢} 天竺黃^{二錢} 麝香^{三分} 烏梢蛇肉^{一錢} 酒

右同研細煉蜜和膏每服大兒五分小兒三分薄荷湯送下

鎮驚丸 茯神 麥冬^{各五錢} 辰砂 遠志^{各三錢} 石菖蒲 棗仁^{各三錢} 牛黃^{一錢} 川黃連^{三錢} 珍珠^{二錢}

膽星錢 鈎藤鈎錢 天竺黃錢 犀角錢 甘草二錢 右共研細末煉蜜為丸每丸重五分量兒與之用薑湯送下

疾癰 疾癰平素自多疾發時疾壅在喉間氣促倒昏吐痰沫一捻金與滾痰丸 註 疾癰者因小兒平素痰盛或偶因驚熱遂致成癰發時疾延壅塞喉間氣促倒昏口吐痰沫宜先服一捻金以急其下痰次服珠衣滾痰丸則氣順痰消而癰自止矣

一捻金 方見不乳

珠衣滾痰丸 礞石一兩 沉香錢 黃令錢 大黃兩 右為細末水泛為丸硃砂為衣多量兒大小口滾痰水化服

食癰 食癰食過積中腕一時疾熱使之然面黃腹滿吐利吳妙聖滾痰和胃安 註 食癰者其病在脾因小兒乳食過度

停結中腕乘一時疾熱壅塞遂致成癰其初面黃腹滿吐利酸臭後變時時發搐宜用妙聖丹主之痰盛者硃衣滾痰丸

主之後用清熱和胃丸調理則積滯清而驚癰足矣

妙聖丹 雄黃 蠟稍 硃砂 代赭石 各一錢 巴豆三個 杏仁一錢炒 右共為細末蒸棗肉丸如桐子大每服

三五丸木香煎湯化服

硃衣滾痰丸 方見痰論 清熱和胃丸 川連五錢 梔子五錢 竹茹四錢 麥冬五錢 連翹四錢 山查一兩 神鉤一兩 麥芽一兩 陳皮四錢

枳實五錢 大黃五錢 甘草三錢 右共為細末煉蜜為丸每丸重一錢量兒與之用白滾水化下

風癰 風癰汗出風龍經二目青黯面淡紅十指屈伸如數物化風菟活牛黃靈 註 風癰因汗出脫衣膝理開張風邪乘隙而入發時目青面紅手如數物法治先宜疎風解表輕則化風丹主之重則菟活桂枝湯主之風兼痰者牛黃丸主之

化風丹 膽星錢 菟活 獨活 天麻 防風 甘草 荊芥穗 人參 川芎各一 右共為細末煉蜜丸皂子大

每服一丸薄荷湯化開服

菟活桂枝湯 菟活 防風 麻黃 桂枝 天麻 大黃 甘草生 引用生薑水煎服 菟活桂枝治風癰疎風

馮熱妙難言菟防麻桂天麻草大黃煎服自然安

牛黃丸 膽星 全蠍 蟬退各半 防風 牛黃 白附子生 殭蠶炒 天麻各一錢 麝香五分 右為細末煮

上海錦章書局石印

棄去按皮取肉和丸如菜豆大每服三五丸生薑湯化服

卷五十二

編輯幼科雜症心法要訣

疳證門

疳證總括 大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被焚煎初患尿甘午潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛眵註大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所稟之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則精耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治致令青筋暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發眵而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有悞也

脾疳 脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腫脹卧冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾參苓白朮先註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消肝理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消肝理脾湯

無姜

三棱

莪朮

青皮炒

陳皮

蘆薈

檳榔

史君子肉

甘草生

川黃連

胡黃連

麥芽炒

神麴炒

引用燈心水煎服

方消疳理脾用無姜三棱莪朮青陳皮蘆薈檳榔史君子肉甘草川連胡連麥芽錢

肥兒丸

人參二錢

白朮五錢

茯苓三錢

黃連二錢

胡黃連五錢

史君子肉四錢

神麴炒

麥芽炒

山查肉各三錢

甘草

蘆薈二錢

右為末黃米糊丸如黍米大每服二三十丸米湯送下

參苓白朮散

人參二錢

茯苓

白朮土炒

扁豆炒

薏米炒

山藥各五錢

陳皮三錢

縮砂

桔梗各二錢

甘草

一錢

建蓮子五錢

右共為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉

疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯久瀉參苓白朮提註疳瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀

不分頻煩作瀉法當清熱燥濕以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮散主之

清熱和中湯 白朮炒土 陳皮 厚朴燭 赤苓 黃連 神鉤炒 穀芽炒 史君子 生甘草 澤瀉 引用燈心

水煎服 癰疽人泄瀉名疳瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚赤苓連神穀史君草澤瀉

參苓白朮散 方見脾胃

疳腫脹 疳疾腫脹面浮先傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸膈滿御苑勻氣服最良疳病腫脹之證多因傳化失宜

致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胃膈痞悶肚腹腫脹面色浮光宜用御苑勻氣散治之其腫脹自消矣

御苑勻氣散 桑皮炒蜜 桔梗 赤苓 甘草生 藿香 陳皮 木通 引用薑皮水煎服 歌方肝久脾虛腫脹生御

苑勻氣有奇功桑皮桔梗赤苓草藿香陳皮合木通

疳痢 疳疾日久頻下痢多緣腸胃熱凝滯或赤或白腹窘急者連導滯為妙劑疳痢之由皆因熱結腸胃所致致痢

時或赤或白腹中窘痛急用香連導滯湯治之其痢自愈

香連導滯湯 青皮炒 陳皮 厚朴燭 川黃連炒 生甘草 山查 神鉤炒 木香煨 枳榔 大黃 引用燈

心水煎服 疳疔久下痢名疳痢香連導滯功最良青陳厚朴川連草查鉤木香枳大黃

肝疳 肝疳面目爪甲青眼生多淚澀難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸弱燥渴煩急晝帶青清

熱柴胡同蘆薈調養逍遙抑肝靈 肝屬木色青主筋故肝疳則見面目爪甲皆青眼生淚液隱澀難睜搖頭揉目合面

睡卧耳瘡流膿腹大青筋身體弱瘦燥渴煩急晝帶青如苦之證也治宜先清其熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病

勢稍退當以逍遙散抑肝扶脾湯調理

柴胡清肝散 銀柴胡 梔子微炒 連翹心 生地黃 胡黃連 赤芍 龍胆草 青皮炒 甘草生 引用燈心竹

葉水煎服 歌柴胡清肝治肝疳銀柴胡梔子翹胡連生地赤芍龍胆草青皮甘草一同煎

蘆薈肥兒丸 五穀蟲炒 蘆薈生 胡黃連炒 川黃連各一兩 銀柴胡一兩二錢 扁豆炒 山藥各二兩

南山查二兩 蝦蟆四個 肉豆蔻七錢 枳榔五錢 使君子半錢 神鉤二兩 麥芽一兩六錢 鶴虱炒

燕麥炒 硃砂飛 麝香錢 共研細末醋糊為丸如黍米大每服一錢米飲下

加味逍遙散 茯苓 白朮炒 當歸 白芍炒 柴胡 薄荷 吳甘草 丹皮 梔子炒 引用薑棗水煎服 歌加

上海錦章書局石印

味道遙散如神茯苓白朮散歸身白芍柴胡薄荷葉再加丹皮梔子仁

抑肝扶脾湯 人參 白朮^土 黃連^炒 柴胡^酒 茯苓 青皮^醋 陳皮 白芥子 龍胆草 山查 神麴^炒

炙甘草 引用薑棗水煎服 歌調理抑肝扶脾湯參天黃連柴苓良青陳白芥龍胆草山查神麴甘草薑

心痛 心后面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口燥渴口舌生瘡小便紅胃膈滿悶喜伏卧慙食乾瘦吐利煩渴

心導赤珍珠治茯神調理可收功 証心屬大赤主血脈故心痛則見面紅目脈赤壯熱有汗時時煩渴咬牙弄舌口舌

煩燥渴飲生瘡小便紅赤胃膈飽悶睡喜伏卧慙食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱盛兼驚者珍珠散主

之病久心虛者茯神湯調理之

瀉心導赤湯 方見本舌

珍珠散 珍珠^{三錢} 麥冬^{五錢} 天竺黃^{三錢} 金箔^{二十} 牛黃^{一錢} 胡黃連^{三錢} 生甘草^{二錢} 羚羊角 大黃

當歸^{各三錢} 硃砂^{二錢} 雄黃^{一錢} 茯神^{五錢} 犀角^{三錢} 右為細末每服五錢茵陳湯調服

茯神湯 茯神 當歸 炙甘草 人參 引用龍眼肉水煎服 煩熱者加麥冬 方茯神湯內用茯神當歸甘草共

人參若是煩熱麥冬入清補兼施功最純

痞渴 肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘露宜熱減津生渴自歇 証痞渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以

致津液虧損故不時大渴引飲心神煩熱速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲 生地黃 麥冬^{去心} 石斛 知母生 枇杷葉^蜜 石膏^煨 甘草生 茵陳蒿 黃芩 引用燈心水

煎服 歌耗液傷津成痞渴清熱甘露飲如神生地麥冬斛知母枇杷石膏茵陳蒿

肺病 面白氣喘時咳嗽毛髮枯焦皮栗乾發熱憎寒流涕鼻煩生瘡號肺病疎散生地清肺效清熱甘露飲為先肺

虛補肺散最妙隨證加減遲延 証肺屬金色白主皮毛故肺病則見面白氣逆咳嗽毛髮焦枯皮上生粟肌膚乾燥增

汗發熱常流涕鼻煩生瘡也先用生地清肺飲以疎解之繼用甘露飲清之日久肺虛者當以補肺散

主之生地清肺散 桑皮^炒 生地黃 天冬 前胡 桔梗 蘇葉 防風 黃芩 生甘草 當歸 連翹^{去心} 赤茯

苓 引用生薑紅棗水煎服 歌生地清肺用桑皮生地天冬前胡蘇葉防風黃芩草當歸連翹赤苓宜



甘露飲 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 枳殼 枳實 桔梗 黃芩 枇杷葉 茵陳蒿 石斛 引用紅棗水

煎服 歌甘露飲治肺大壅生熟地黃二門冬枳殼黃芩枇杷葉茵陳石斛共煎成

補肺散 白茯苓 阿膠 糯米 馬兜鈴 炙甘草 杏仁 水煎服 歌肺虛補肺散通仙苓茯苓阿膠

米攪馬兜鈴配炙甘草杏仁微炒去皮尖

腎疳 解願鶴膝齒行邊骨瘦如柴面黑齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎疳先用金蟾治九味地黃繼進若達

稟賦氣虛弱調元散進莫遲疑 腎屬水色黑主骨患此疳者初必有解願鶴膝齒遲行邊腎氣不足等證更因肥疳先

節久則漸成腎疳故見面色黎黑齒齦出血口中氣臭足冷如水腹痛泄瀉啼哭不已之證先用金蟾治其疳繼以九味

地黃丸調補之若稟賦不足者調元散主之

金蟾丸 乾蝦蟆 胡黃連 黃連 鶴蟲 肉豆蔻 苦楝根白皮 雷丸 蘆薈 生 燕麥 右為末

右為末麪糊為丸萊豆大雄黃為衣每服十五丸未湯送下

九味地黃丸 熟地 茺蔚肉 赤茯苓 澤瀉 牡丹皮 山藥 當歸 川楝子 史君子 右為細

末煉白蜜為丸如芡實大用滾白水研化食前服

調元散 人參 茯苓 白朮 山藥 川芎 當歸 熟地黃 茯苓 黃耆 甘草 白芍 引用薑棗

水煎服 歌調元散治稟賦弱參苓白朮乾山藥當歸芎地共茯苓黃耆甘草同白芍

疳熱 小兒疳疾身發熱輕重虛實當分別初用青蒿飲為宜日久鼈甲散最捷 疳疾之證身發熱治者宜分別輕

重虛實治之初起時病多實者鼈甲青蒿飲主之日久多虛者鼈甲散主之

鼈甲青蒿飲 銀柴胡 鼈甲 青蒿 生甘草 生地黃 赤芍 胡黃連 知母 地骨皮 引用燈心水煎

服 歌疳疾血虛身發熱鼈甲青蒿藥有功銀柴鼈蒿草地芍胡連知母地骨同

鼈甲散 人參 黃耆 鼈甲 生地 熟地 當歸 白芍 地骨皮 水煎服 歌疳疾日久骨熱蒸鼈甲

散治效從容參耆鼈甲生熟地當歸白芍地骨同

腦疳 腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮先急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮腫困倦暗睡身汗熱龍

腦疳 腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮先急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮腫困倦暗睡身汗熱龍

腦疳 腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮先急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮腫困倦暗睡身汗熱龍

胆龍腦丸甚良吹鼻龍腦效甚捷腦疳者因兒素受風熱又兼哺乳失調以致變成此證頭皮无急腦生瘡餅頭熱毛髮焦枯如穗鼻乾心煩腮腫硬困倦睛暗目汗身熱也腦熱生瘡者龍胆丸主之煩熱羸弱者龍腦丸主之外用吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍胆丸 胆龍草 升麻 苦楝根皮炮 赤茯苓 防風 蘆薈 油髮灰各二錢 青黛 黃連各三錢 右為細末右為細末

胆汁浸熬糊丸如麻子大薄荷湯下量兒大小與之

龍腦丸 龍腦麝香各五 雄黃二錢 胡黃連三錢 牛黃一錢 硃砂一錢五分 蘆薈三錢 乾蝦蟆四錢 右為細末右為細末

胆合丸如麻子大每服三丸薄荷湯下

吹鼻龍腦散 龍腦麝香少許各研細木 蝸牛殼炒黃 蝦蟆灰 瓜蒂 黃連 細辛 桔梗各等分 右為細末入磁盒內

貯之每取少許吹入鼻內日吹二次

眼疳 疳熱上攻眼疳成癢澀赤爛胞腫疼白睛生翳漸遮滿流淚羞明目不睜疎解瀉肝散最妙雲翳清熱退翳靈日

久不瘥當補養逍遙瀉肝二方從証眼疳者疳熱上攻於眼故發時癢澀赤爛眼胞腫疼白睛生翳漸遮滿不時流淚

羞明閉目也先用瀉肝疎解之再用清熱退翳湯消其翳若日久不瘥法當調補逍遙散或羊肝散主之

瀉肝散 生地黃 當歸 赤芍 川芎 連翹法 梔子 龍胆草 大黃 羌活 甘草生 防風 引燈心水

煎服方瀉肝散治肝熱癰當歸赤芍羌活連翹生地梔子龍胆草大黃羌活甘草防風

清熱退翳湯 梔子炒 胡黃連 木賊草 生地 羚羊角 龍胆草 銀柴胡 蟬蛻 赤芍 甘草生 菊花

蒺藜 引燈心水煎服方清熱退翳消雲翳梔子木賊芍生地羚羊龍胆銀柴胡蟬蛻甘草蒺藜

逍遙散方見疳疳 羊肝散 青羊肝一具去筋膜切並藥厚片 人參 羌活 白木炒 蛤粉各等 右為細末令勻聽用將藥置荷葉上如錢厚一

層鋪肝一層包固外以新足青布包裹蒸熟任兒食之如不食者及夏月惡瘡壞則晒乾為末早晚白湯調下服完再

合以好為度若熟者減人參

鼻疳 疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤瘡痛難堪浸淫潰爛連唇隆咳嗽氣促髮毛乾熱盛清金化毒效疳蟲蝕鼻化蟲丸調