

金匱要略今釋 卷四

王新華



金匱要略方論今釋卷四

川沙 陸彭年淵雷 撰述
受業妻嘉定沈本琰 參校

○五臟風寒積聚病脈證并治第十一

論二首 脈證十七條 方二首

金匱所論諸雜病。此篇最爲難曉。風也。寒也。積也。聚也。爲四種病因。然篇中所論究不知其爲何種病。蓋吾人所以貫通中西古今之法。十之四。取之古書所載之證候。十之六。則取之古書所載之藥方。臨床上某藥方所治之病。合以其方之證候。推知古人所謂某病者。在今日之病理上。當爲某病。如此而已。此篇藥方不過二首。證候亦語焉不詳。積聚之病。難經巢源。雖有論列。猶難明曉。風寒則竟無可考。於是所謂風寒積聚也者。終不知其爲何種病矣。意者。古昔相傳有此四種病。仲景特述而不作。存而不論歟。篇中藥方二首。麻仁丸本出傷寒論。甘薑苓尤湯。



南京中医药大学图书馆版权所有

見外臺第十七卷腎著腰痛門。引古今錄驗。名甘草湯。不云出仲景傷寒論。貴方皆云
出傷寒論然則金匱此篇。本非仲景舊文。後人取難經巢源等書以補綴之歟。皆未可知也。

肺中風者。口燥而喘。身運而重。冒而腫脹。

運卽眩暈之暈。喘爲肺臟疾患必見之證。身運而重及冒皆因炭養之交換不足所致。乃呼吸障礙之結果。腫脹則鬱血性水腫也。此條頗似肺氣腫之證。

尤氏云。肺中風者。津結而氣壅。津結則不上潮而口燥。氣壅則不行而喘也。身運而重者。肺居上焦。治節一身。肺受風邪。大氣則傷。故身欲動而彌覺其重也。冒者。清肅失降。濁氣反上。爲蒙冒也。腫脹者。輸化無權。水聚而氣停也。

肺中寒。吐濁涕。

濁涕卽黏痰。已詳肺痿肺癰篇。吐濁涕亦是呼吸器疾患常見之證。中風條云。口燥。知是不吐濁涕。殆以風則生熱。故口燥。寒則化水。故吐濁涕歟。

肺死藏浮之虛。按之弱如葱葉下無根者死。

此所謂真臟脈也。脈法。真臟脈見者死。故曰死臟浮之謂輕。按之謂重。按也。下放此。

程氏云。內經曰。真臟脈見者死。按此句內經屢見此五藏之死脈也。肺藏死。浮而虛。肝藏死。浮而弱。心藏死。浮而實。脾藏死。浮而大。腎藏死。浮而堅。五藏俱兼浮者。以真氣涣散。不收無根之謂也。內經曰。真肺脈至。如以毛羽中人膚。案見玉機真藏論下放此非浮之虛乎。葱葉中空草也。若按之弱。如葱葉之中空。下又無根。則浮毛虛弱。無胃氣。此真藏已見。故死。淵雷案。五藏之死脈。皆云浮之按之。明是輕按重按之謂。程氏以爲俱兼浮。殆誤矣。

肝中風者。頭目瞤。兩脇痛。行常僵。令人嗜甘。

程氏云。肝主風。風勝則動。故頭目瞤動也。肝脈布脇肋。故兩脇痛也。風中於肝。則筋脈急引。故行常僵。僵者不得伸也。淮南子曰。木氣多僵。僵之義。正背曲肩垂之。

狀以筋脈急引於前故也。此肝正苦於急。急食甘以緩之。是以令人嗜甘也。淵雷案。此不知是何種病。千金第十一卷肝臟脈論門載此條。末有如阻婦狀四字。

肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜大息。胸中痛。不得轉側。食則吐而汗出也。

汗脈經干金云時盜
汗飲食已吐其汁

魏氏云。肝中寒者。兩臂不舉。筋骨得寒邪。必拘縮不伸也。舌本燥。寒鬱而內熱生也。喜大息。胸中痛者。肝爲寒鬱。則條達之令失。而胸膈格阻。氣不流暢也。不得轉側者。兩脇痛滿急。輾轉不安也。食則吐而汗出。肝木侮土。厥陰之寒侵胃。胃不受食。食已則吐。如傷寒論中厥陰病所云也。汗出者。胃之津液爲肝邪所乘。侵逼外越也。此俱肝藏外感之證也。

金鑑云。兩臂不舉。舌本燥二句。而汗出三字。文義不屬。必是錯簡。不釋。

淵雷案。前條頭目瞤。兩脇痛。兩脇爲肝經部位。頭目瞤卽少陽證之目眩。少陽膽與肝爲表裏。以是斷爲肝病。猶可說也。此條證候。則與舊說之肝全不相涉。魏氏

之注亦牽強已甚。愚謂此等諸條是古醫家別一派之說，混入仲景書中，今則此派已失傳，遂無可考耳。

肝死藏浮之弱。按之如索不來。或曲如蛇行者死。

程氏云：肝藏死，浮之弱，失肝之職，而兼肺之刑。按之不如弓弦而如索，如索則肝之本脈已失，不來則肝之真氣已絕。或有蛇行之狀，蛇行者，曲折逶迤，此脈欲作弦而不能，故曲如蛇行，其死宜矣。尤氏云：按內經云：眞肝脈至中外急，如循刀刃責責然。如按琴瑟絃與此稍異，而其勁直則一也。

肝著。其人常欲蹈其胸上。先未苦時，但欲飲熱，旋覆花湯主之。

本臣旋覆花湯諸
德億等校

同方皆

尤氏云：肝藏氣血鬱滯著而不行，故名肝著。然肝雖著，而氣反注於肺，所謂橫之病也。參看傷寒今釋百十五條故其人常欲蹈其胸上。胸者肺之位，蹈之欲使氣內鼓而出肝邪，以肺猶橐籥，抑之則氣反出也。先未苦時，但欲飲熱者，欲著之氣得熱則行，迨



既著則亦無益矣。

金鑑云。旋覆花湯主之六字。與肝著之病不合。當是衍文。

淵雷案。千金無旋覆花湯主之六字。趙刻本及徐鎔俞橋諸本。皆不載方。丹波氏謂原注同字。恐闕字之誤。而徐程諸家以爲卽婦人雜病篇中之方。然其方治婦人半產漏下。與肝著之證不合。今從千金。

心中風者。翕翕發熱。不能起。心中飢。食卽嘔吐。

程氏云。心主熱。中於風。則風熱相搏。而翕翕發熱。不能起。心中雖饑。以風擁逆於上。卽食亦嘔吐也。徐氏云。飢者火嘈也。食卽嘔吐。邪熱不殺穀也。尤氏云。心中飢。食則嘔者。火亂於中。而熱格於上也。鄭田精一云。文選張平子思玄賦溫風翕其增熱兮。注良曰。翕熱。白衡曰。說文曰。翕熾也。是翕有熱義。

義引實述

淵雷案。千金心臟門作心中飢。而欲食。食則嘔。此條頗似半夏瀉心湯之證。當是胃病。非所謂心中風也。下二條同。古人多誤胃病爲心病。仲景亦稱胃爲心下。是

也。

心中寒者。其人苦病心如噉蒜狀。劇者心痛徹背。背痛徹心。譬如蠱注。其脈浮者。自吐乃愈。

程氏云。內經曰。心惡寒。寒邪干心。心火被斂而不得越。則如噉蒜狀而辛辣。憒憒然而無柰。故甚則心痛徹背。背痛徹心。如蠱注之狀也。若其脈浮者。邪在上焦。得吐則寒邪越於上。其病乃愈。

淵雷案。千金心臟門。蒜下有蠱字。無蠭字。巢源蠱注候云。蠱是聚蛇蟲之類。以器皿盛之。令其自相噉食。餘有一箇存者。爲蠱也。而能變化。人有造作敬事之者。以毒害於佗。多於飲食內而行用之人中之者。心悶腹痛。其食五藏盡則死。有緩有急。急者倉卒十數日之閒便死。緩者延引歲月。遊走腹內。常氣力贏敗。骨節沈重。發則心腹煩懊而痛。令人所食之物。亦變化爲蠱。漸侵食府藏盡而死。死則病流注。染著傍人。故謂之蠱注。



南京中医药大学图书馆版权所有

心傷者。其人勞倦。卽頭面赤而下重。心中痛而自煩發熱。當臍跳。其脈弦。此爲心藏傷所致也。

尤氏云。其人若勞倦。則頭面赤而下重。蓋血虛者。其陽易浮。上盛者。下必無氣也。心中痛而自煩發熱者。心虛失養。而熱動於中也。當臍跳者。心虛於上。而腎動於下也。心之平脈。累累如貫珠。如循琅玕。又胃多微曲。曰心平。今脈弦。是變溫潤圓利之常。而爲長直勁強之形。故曰此爲心藏傷所致也。淵雷案。千金心臟門。作心中痛。徹背。自煩發熱。當臍跳手。

心死藏浮之實。如丸豆。按之益躁疾者死。

丸。趙刻本。俞橋本及徐沈尤諸本並誤麻。今據徐鎔及魏程諸本改。

程氏云。內經曰。真心脈至堅而搏。如循薏苡子。累累然。卽浮之實。如丸豆。按之益躁疾之脈。丹波氏云。丸謂彈丸。豆謂菽也。

邪哭使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏冷。

目欲眠。夢遠行而精神離散。魂魄妄行。陰氣衰者爲癲。陽氣衰者爲狂。

尤氏云。邪哭者。悲傷哭泣。如邪所憑。此其標有稠淡濁火之殊。而其本則皆心虛

而血氣少也。於是寤寐恐怖。精神不守。魂魄不居。爲顛爲狂。勢有必至者矣。徐氏云。心爲君主之官。一失其統禦。而陰虛者。邪先乘陰。則癲。陽虛者。邪先乘陽。則狂。

癲狂雖不同。心失主宰。則一也。程氏云。內經言重陽者狂。重陰者癲。

案二句出雜經二十難。非內經文。此陰氣衰者爲癲。陽氣衰者爲狂。似與彼異。然經亦有上實下虛。爲厥癲疾。

問素篇解。此句待攷二十難。脫陽者見鬼。則知陰陽俱虛。皆可爲癲。爲狂也。魏氏云。陰

氣衰者。正陰衰而邪陰盛也。癲乃不識不知之狀。陰邪凝閉。而靈明之竅塞矣。故

爲癲。陽氣衰者。亦正陽衰而邪陽亢也。狂乃如神如鬼之狀。陽邪暴發。而禮讓之

意絕矣。故爲狂。朱氏云。哭字疑誤。陽氣衰。陰氣衰。衰字當作病字解。

淵雷案。此條諸證。除癲狂外。皆是神經衰弱。神經衰弱之根本原因。固屬多端。然此病之成。必以漸。及其日久。而不能愈。必因血少。神經闕所榮養之故。金匱以爲

血氣少是矣。然謂心主血脈，心主神識，而謂血氣少者屬於心，則古人之誤也。神經衰弱之甚，有發爲歇斯的里，及依卜昆氏病者，則甚似癲狂，亦爲血氣少之故。若真癲狂，則別是一病，殆非血少使然矣。又古人辨別癲狂，以潛靜者爲癲，躁動者爲狂，是以難經謂重陽者狂，重陰者癲。此乃就病狀上比較，以別爲陰陽。若癲狂之病因，固未必爲陰陽之偏勝也。徒以難經爲昔賢所必讀，讀難經而執定陰陽以論癲狂，乃無以解於金匱陰衰陽衰之適相反。於是徐程魏諸君紛紛曲解，以求調和。徐魏用意略同，皆謂邪乘其衰而病作。然推金匱之意，但言血氣少，非謂有外邪。求之今日之病理，癲狂亦無外鑠之病毒。程氏意謂癲狂之病，陰陽俱致之，然與金匱難經辨析陰陽之意，又顯相抵牾。則三子之說，俱不可從。朱氏以衰爲病，衰固不可訓爲病。推其意，殆以經文承血氣少說來，故不曰病而曰衰歟。要之，癲狂之病理，決非對立之陰陽。金匱難經師承，又不必盡同。正不必彼此牽合，強作解人也。



脾中風者。翕翕發熱形如醉人。腹中煩重皮目瞓瞓而短氣。

程氏云。風爲陽邪。故中風必翕翕發熱。脾主肌肉四肢。風行於肌肉四肢之間。則身懈惰。四肢不收。故形如醉人。腹爲陰。陰中之至陰。脾也。故腹中煩重。內經曰。肌肉蠕動。命曰微風。以風入於中。搖動於外。故皮目爲之瞓動。腹中煩重。隔其息道。不能達於腎肝。故短氣也。金鑑李彥云。風屬陽邪。而氣疏泄。形如醉人。言其面赤而四肢軟也。淵雷案。皮目干。金牌臟門作皮肉。是李氏以皮目爲上下眼胞誤甚。脾死藏浮之大堅。按之如覆盆。潔潔狀如搖者死。

臣億等詳五藏各有中風中寒俱
今脾只載中風腎中風中寒俱

古不載者以古文簡亂極多去
既遠無文可以補綴也

金鑑引李彥云。脈弱以滑。是有胃氣。浮之大堅。則胃氣絕。眞藏脈見矣。覆盆則內空。潔潔者。空而無有之象也。狀如搖者。脈躁疾不甯。氣將散也。故死。淵雷案。潔潔。千金作絜絜。又於次條出脾中寒三字。而無證候。知其闕佚在唐以前矣。趺陽脈浮而濶浮。則胃氣強。濶則小便數。浮濶相搏。大便則堅。其脾爲約。

麻子仁丸主之。

趺陽脈浮濇相搏云云。決非仲景文字。麻仁丸之證候爲大便堅。小便利而不渴。老人虛人燥急者宜之。詳傷寒論今釋。

尤氏云。浮者陽氣多。濇者陰氣少。而趺陽見之。是爲胃強而脾弱。約約束也。猶弱者受強之約束而氣餒也。又約小也。胃不輸精於脾。脾乃乾澀而小也。

麻子仁丸方

麻子仁

二升半斤

芍藥

一斤

枳實

一斤

大黃

一斤

厚朴

一尺

杏仁

一升

右六味末之。煉蜜和丸梧子大。飲服十九。日三。以知爲度。

傷寒論作枳實半斤。尤氏云。大黃枳實厚朴所以下令胃弱。麻仁杏仁芍藥所以滋。令脾厚。用蜜丸者恐速下而併傷及脾也。

腎著之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲

食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣一作裏。冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腰重。如帶五千錢。甘薑苓朮湯主之。

腰重。徐鎔本。俞橋本。徐程諸注本及外臺並作腹重。千金兩載此條。腰痛門作腹。

腎藏脈論作腰。

腎在腰部。故腰以下之病證。古人漫稱腎病。其實非腎藏病也。此因水氣停積於腰部。故腰以下冷痛。如坐水中。水氣卽溼氣。溼勝。故身重。腰重。如帶五千錢也。形如水狀。千金作形。如水洗狀。謂浮腫也。凡水氣病多渴。故以不渴爲反。不渴與飲食如故。皆胃無停水之徵。胃無停水。故曰病屬下焦。水氣病有衝逆證者。多小便不利。此無衝逆證。故小便自利。身勞汗出三句。言其病因。然此病不必因於衣裏。冷溼。但溼之傷人。下部爲甚。故水氣積於腰部耳。尤氏云。腎受冷溼。著而不去。則爲腎著。然其病不在腎之中藏。而在腎之外府。故其治法不在溫腎以散寒。而在燠土以勝水。甘薑苓朮辛溫甘淡。本非腎藥。名腎著者。原其病也。



南京中医药大学图书馆版权所有

甘草乾薑茯苓白朮湯方

甘草

白朮各二兩

乾薑

茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中卽溫

千金外臺用草朮各四兩乾薑三兩

聖惠方云治腎著之爲病身體冷從腰已下痛重甘草散方

於本方加當歸

三因方云除溼湯卽本方治冒雨著溼鬱于經絡血溢作衄或脾不和溼著經絡血

流入胃胃滿吐血頭疼加川芎二錢最止浴室中發衄

宣明論云腎著湯卽本方治胞痺小便不利鼻出清涕者湯本氏云小便自利者膀

胱括約筋麻痺小便不利者利尿筋麻痺也

方極云苓薑朮甘湯治心下悸小便自利腰中冷如坐水中若疼重形如水狀者

方機云治身體重腰冷小便自利者兼用應鐘

類聚方廣義云此方加杏仁名腎著湯案千金出治妊娠浮腫小便自利腰體冷痛喘

欵者

又云治老人平日小便失禁。腰腿沈重。冷痛者。又男女遺尿。至十四五歲猶不已者。最爲難治。此方加反鼻。蝮蛇也能奏效。宜隨證加附子。

方函口訣云。此方一名腎著湯。用於下部腰閒之水氣。陰脣水腫等有效。婦人久年腰冷帶下者。加紅花與之更佳。

湯本氏云。本方卽苓桂朮甘湯去桂枝加乾薑。二方之異。於此可辨。苓桂朮甘湯無乾薑有桂枝。故有上衝目眩之證。是因水毒上泛而集中於上半身。且見胃內停水也。本方無桂枝有乾薑。則主水毒下降而集中於下半身。故無上衝目眩之證。胃內亦無停水。有之亦甚微也。乾薑與附子同稱大熱。而有驅逐水毒之效。故其證必惡寒厥冷。師云身體重。卽組織中有水毒之徵。又云腰中冷。如坐水中形如水狀。又云腰以下冷痛。腰重如帶五千錢。皆因水毒積集於下半身故也。此毒浸潤之結果。使組織弛緩膨大。故腹部軟弱無力。往往類似八味丸之臍下不仁。



南京中医药大学图书馆版权所有

然彼有口渴煩熱之證。可以分辨。又本方證之小便自利。疑於猪苓湯證之小便淋瀝。然彼屬陽證。有口渴熱狀。此屬陰證。口反不渴也。

古方便覽云。友人某患淋瀝之證多年。腰腳冷。夜不寐。心下悸。與此方諸證全愈。又云。一婦人平生上衝甚。而有心悸之證。故先生謂吉益東洞也令服苓桂朮甘湯。一夜腹大痛。苦楚不可言。先生往診之。見疼痛之狀。腰部爲甚。與此方一劑頓瘥。

又云。一士人年七十三。平生小便頻數。腰冷如坐水中。厚衣覆蓋而坐。精液時泄。不自禁。諸治並無效。如此已十餘年矣。余診之心下悸。卽與此方而全愈。

生生堂醫談云。京師古門前一嫗來請治。腰腳冷。腳痿弱。一步不可行。如此十年矣。予乃作苓薑朮甘湯。且爲之放痧。血迸出許多。初來時以肩輿。次來時人扶。次來時倚杖。次來時自步。不俟杖矣。

麻疹一哈云。吉邑季平之妻。年可三十。疹發時。身熱甚而不多。兩頰赤如裏朱。喘欬短氣。煩躁不得眠。口渴欲飲水。因作大青龍湯服之。盡五貼。前證稍安。遍身汗

