

疫論類編

瘟疫論類編卷之二

延陵吳有性又可甫著

諸城後學劉奎松峯訂正男劉秉錦濯西編釋

福山後學劉嗣宗南瑛參閱

統治

論者、ハ賅論其理、理明而治療之方、不可不講也、原本九傳治法在下卷之末、已經倒置、且列於調理法後、正名論前、豈有先調理而後施治者乎、又豈有先施治而後方正其名者乎、其編次之不倫甚矣、今將其九傳治法

移在瘟疫初起之後、合二篇成一卷、爲治瘟疫之大綱焉、第其中止有治三陽經法、而三陰經竟乃闕如、豈作者原未及此耶、抑有之而偶然遺落耶、此其間有甚不可解者焉、編統論、

瘟疫初起治法 原題瘟疫初起

瘟疫初起、先憎寒而後發熱、日後但熱而無憎寒也、初得之、一二日、其脉不浮不沉而數、晝夜發熱、日晡益甚、頭疼身痛、其時邪在伏脊之前、腸胃之後、雖有頭痛身痛、此邪熱浮越於經、瘟疫邪自口鼻入膜原、茲復由內攻注于外、不可認爲傷寒表症、

自神景而後習
傷寒家遇瘟疫
而用麻桂不知
誤治幾許先生
達原飲可謂獨
闢蚤叢

輒用麻桂之類強發其汗此邪不在經汗之徒傷表氣既
浮越于經何又言邪不在經蓋邪之本根
在膜原其浮越於外者猶樹之有枝耳
熱亦不減又不
可下此邪不在裡裡臟腑也下之徒傷胃氣其渴愈甚宜

達原飲

達原飲

枳榔 二錢
厚朴 一錢薑汁炒
草果仁 五分
知母 一錢

白芍 一錢
黃芩 一錢
甘草 五分
水煎午後服

按枳榔能消能磨除伏邪為疎利之藥又除嶺南瘴
氣厚朴破戾氣所結草果辛烈氣雄除伏邪盤踞三

原艾先以少陽
爲首今改正之
先太陽次陽明
次少陽
芷葛皆陽明表
藥但白芷散陽
明寒邪故不用
葛根散熱邪且
能解利陽明時
疫之氣

味協力直達其巢穴使邪氣潰敗速離膜原是以為
達原也熱傷津液加知母以滋陰熱傷營氣加白芍
以和血黃芩清燥熱之餘甘草為和中之用以後四
味不過調和之劑如渴與飲非拔病之藥也凡瘧
邪遊溢諸經當隨經引用以助升泄如頭痛身熱
脊強腰背項痛此邪熱溢于太陽經也本方加羌活
一錢如目痛眉稜骨痛眼眵痛鼻乾不眠此邪熱
溢于陽明經也本方加葛根一錢如脇痛耳聾寒
熱嘔而口苦此邪熱溢于少陽經也本方加柴胡一

錢症有遲速重輕、藥有多寡、緩急務在臨時斟酌所
定分兩、大畧而已、不可執滯、凡立方皆宜如此、間有感之輕
者、自上白胎亦薄、熱亦不甚、而無數脉、其不傳裡者
一二劑自解、不汗亦愈、稍重者必從汗解、如不能汗、乃邪
氣盤踞于膜原、內外隔絕、表氣不能通于內、裡氣不
能達於外、不可強汗、或者見加發散之藥、便欲求汗、
誤用衣被壅遏、或將湯火慰蒸、甚非法也、然表裡隔
絕、此時無遊溢之邪在經、三陽加法不必用、宜照本
方、感之重者、舌胎如積粉、滿布無隙、服湯後、服達原飲不

用達原飲外又
有此三法更詳
盡周密治法始
無遺憾

從汗解而從內陷者舌根先黃漸至中央邪漸入胃
此三消飲症若脉長洪而數大沫多渴此邪氣適離
膜原欲表未表此白虎湯症如舌上純黃色兼之裡
症為邪已入胃此又承氣湯症也有兩三日即潰而
離膜原者有半月十數日不傳者有初得之四五日
淹淹攝攝淹纏不快之狀至五六日後陡然陡音斗忽然也勢張者
凡元氣勝者毒易傳化傳者邪氣流行之勢化者邪氣變動之機元氣薄
者邪不易化即不易傳設遇他病久虧適又微瘟能
感不能化安望其傳不傳則邪不去邪不去則病不

瘰延纏日久愈沉愈伏多致不起時師誤認為怯症
日進參芪愈壅愈固不死不休也原按

三消飲 卽達原飲加羌活葛根柴胡大黃 薑棗煎

白虎湯

石膏煨 知母鹽酒炒 甘草 糯米炒 薑煎或止用水

松峯曰達原飲誠治瘟疫之仙方和平穩當如勞症
之有地黃湯也仲景之治傷寒用麻桂尚多避忌而
此獨無之治瘟疫初起者按症問因加減出入無往
不利如因食積而觸動其邪者本方加神麴麥芽因

肉積者加山查之類類而推之可應變於無窮矣唯

方內用白芍雖曰活血而其性未免收斂瘟疫雖不

宜發汗然始終賴汗以解芍藥乃斂汗之物於瘟疫

症中似不相宜也承氣方已見前三消白虎原在

後卷別門今俱移于此以三消白虎等症上已言之

鑿鑿則其方即當附錄於後以便查閱後不再贅

瘟疫十傳治法原題總論瘟疫有九傳治法傳本有十而題止言九是遺却一條矣今特

改作十傳似與下條列者有照應耳

瘟疫夫疫之傳有九病人各得其一非謂一病而有九傳也然

治邪如初起用
達原飲如減消
息之當下則用
諸承氣是也餘
可類推

總不出乎表裡之間而已蓋瘟疫之來自口鼻入感于膜

原伏而未發者不知不覺已發之後漸加發熱脉洪而數

此眾人相同宜達原飲疏之此仍從上篇說來原原本本自然貫串與上相承當日此

篇在四本之末與上篇渺不相屬繼而邪氣一離膜原察

其傳變衆人不同者以其表裡各異耳醫者昧十傳治法

不知邪之所在當汗不汗當下不下顛倒誤用但治其症

見頭治頭不治其邪邪去而諸同歸於誤一也

有表而不裡者其症頭痛身痛發熱而復凜凜內無胃滿

腹脹等症谷食不絕不煩不渴此邪氣外傳由肌表而出

合此三層治法

始備

舉班湯見下發

班門

而字怎讀

或自班消者則有班疹桃花班紫雲班之異或從汗解者
有自汗盜汗狂汗戰汗之異此病氣之使然不必較論但
求得班得汗為愈疾耳凡自外傳者為順勿藥亦能自愈
間有汗出不徹而熱不退者宜白虎湯見前班出不透而熱
不退者宜舉班湯有班汗並行而愈者若班出不透汗出
不徹而熱不退者宜白虎合舉班湯
有表而再表者所發未盡膜原而有隱伏之邪或二三日
四五日後依前發熱脈洪而數及其解也班者仍班汗者
仍汗而愈未愈仍用前法治之然亦希有至於三表者更

希有也

有裡而不表者、外無頭痛身痛、而後亦無三班四汗、唯胸

膈痞悶、二字欲吐不吐、雖得少吐而不快、此邪傳裡之上

者、上宜瓜蒂散吐之、邪從其減、邪盡病已、邪傳裡之中、下

者、心腹脹滿、不嘔、不吐、以或燥結便閉、或熱結旁流、或

協熱下利、或太腸膠閉、上四句並宜承氣輩導去其邪、邪

減病減、邪盡病已、上中下皆病者、不可吐、吐之為逆、但宜

承氣導之、則在上之邪順流而下、嘔吐立止、脹滿漸除、

有裡而再裡者、愈後二三日、或四五日、依前之症復發、在

上者仍吐之在下者仍下之再裡者常事有甚有三裡者有希有也雖有上中下之分皆為裡症

有表裡分傳者始則邪氣伏于膜原膜原者即半表半裡也此傳法以邪氣平分半入於裡則現裡症半出于表則現表症此瘟家之常事然表裡俱病內外壅閉既不得汗而復不得下此不可汗而強求其汗必不可得宜承氣先通其裡裡邪先去邪去則裡氣通氣不能達表向者鬱于肌內之邪乘勢盡發于肌表矣或斑或吐汗宜蓋隨其性而升泄之也諸症悉去既無表裡症而熱不退者膜原尚有已

斷字、疑孫漸字
之誤、閱坊刻各
版皆然、以訛傳
訛、未有能正之
者何也

發之邪未盡也、宜三消飲調之、瘟疫舌上白胎者、邪在

膜原也、舌根斷黃至中央、乃邪斷入胃、設有三陽現經症、

太陽頭痛云云、用上篇達原飲加法、大陽羌因有裡症、復加大黃

名三消飲、三消者、消內消外消不內外也、此治瘟之全劑、

以毒邪表裡分傳、膜原尚有餘結者、宜之

松峯曰、瘟疫舌上白胎一段、吳又可原本另標一題目

表裡分傳、列于上卷急症急攻之後、邪熱散漫之前、絕

無倫次、今移入此處、遂成一類、以便觀覽焉

有表裡分傳、而再分傳者、照前表裡俱病、宜三消飲復汗

復下如前而愈此亦常事至有三發者亦希有也

有表勝於裡者膜原伏邪發時傳表之邪多傳裡之邪少何以治之是表證多而裡症少也當治其表裡症兼之

有理勝于表者若裡症多而表症少者但治其裡表症自

愈上節言裡症兼之者是尚治其裡而以治表為重此節但治其裡表症自愈是絕不用解表矣二節當如此看

有先表而後裡者始則但有表症而無裡症宜達原飲有

現三陽經症者當用三陽加法經症不顯但發熱者不用

加法繼而脈洪大而數自汗而渴邪離膜原未能出表耳

宜白虎湯辛涼解散邪從汗解脈靜身涼而愈愈後一二

汗心太過陽氣不周

不周

日後或四五日後依前發熱宜達原飲至後反加胸滿腹
脹不思食煩渴舌上胎刺等症加大黃微利之久而不去
在上者宜瓜蒂散吐之如在_中下者宜承氣導之_{即前但裏}
有先裏而後表者始則發熱漸加裡症下之裡症除_{二三}
日內復發熱反加頭疼身痛脉浮者宜白虎湯若下後熱
不甚減三四日後精神不慧脉浮者宜白虎湯汗之_{此二}
小柴胡加_羌服後不得汗者因精液枯竭也加人參覆_六
防始為對症
則汗解_{此近表裏}若大汗後大下後表裡症悉去繼而一
身盡痛身如被_火被_火甚則不可反側周身骨寒而痛非表症

不知所云

也。不必解表。勿藥靜候。則身痛自愈。以上十傳已完。下節推廣言之。以盡其致。
凡瘟邪再表再裡。或再表裡分傳者。醫家不解。反責病家。不善調理。以致反復。病家不解。每責醫家用藥有誤。致病復起。彼此歸咎。胥失之矣。殊不知病勢之所當然。蓋氣性如此。一者不可爲二。二者不可爲一。絕非醫家病家之過也。但得病者向賴精神完固。雖再三反復。隨復隨治。隨治隨愈。間有延挨失治。或治之不得其法。日久不除。精神耗竭。嗣後更醫投藥。固當現在之邪拔去。因而得效。殊不知膜原尚有伏邪。在二三日內。前症復起。反加循衣摸床。神