

產後惡露不止 五三

產後惡露不止若因血熱者宜保陰煎清化飲○有傷衝任之絡而不止者宜固陰煎加減用之○若肝脾氣虛不能收攝而血不止者宜壽脾煎或補中益氣湯○若氣血俱虛而淡血津津不已者宜大補元煎或十全大補湯○若怒火傷肝而血不藏者宜加味四物湯○若風熱在肝而血下泄者宜一味防風散

一止血方 用蒲黃二兩水煎頓服

血不止論外方

人參當歸湯

婦百十四

佛手散

婦四一  
血多煩暈

產後發瘧

五四

產後發瘧乃陰血大虧證也其證則腰背反張戴眼直視或四肢強勁身體抽搐在傷寒家雖有剛瘧柔瘧之辨然總之則無非血燥血枯之病而實惟足太陽與少陰主之蓋膀胱與腎為表裏腎主精血而太陽之脈絡於頭目頂背所以為病若此若其所致之由則凡如傷寒誤為大汗以亡液大下以亡陰或潰瘍膿血大泄之後乃有此證故在產後亦惟去血過多或大汗大瀉而然其為元氣虧極血液枯敗也可知凡

遇此證速當察其陰陽大補氣血用大補元煎或理陰煎及十全大補湯之類庶保其生若認爲風痰而用發散消導等劑則死無疑矣

產後大便秘澀

五五

產後大便秘澀以其失血亡陰津液不足而然宜濟川煎加減主之及後立齋法俱妙

曰前證若計其日期飲食已多卽用藥通之禍在反掌之間矣必待其腹滿覺脹欲去不能者此乃結在大腸宜用猪胆汁潤之若服苦寒踈通反傷中氣通而不止或成他證○

若去血過多月十全大補湯○血虛火燥用加味四物湯○  
 氣血俱虛用八珍湯○雖數日不通飲食如常腹中如故仍  
 用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食之多而通之則  
 誤矣

產後雜證方 五六

良方 黃龍湯 婦八五  
 產後外感

海藏愈風湯 和二一七  
 失血筋急搐搦

七珍湯 婦七九  
 產後不語

良方 人參湯 婦七七  
 產後諸虛

良方 交加散 婦百  
 產後中風

交加散 和二五二  
 產後類風不省人事

補脾飲 婦八一  
 產後脾破淋瀝

麻黃根湯 婦八三  
 產後虛汗

趁痛散

婦八十

產後發熱骨節疼痛

加味小柴胡湯

散二十

乳母肝火發熱

產後類論列總方

五七

四君子湯

補一

五君子煎

新熱六

金水六君煎

新和一

六君子湯

補五

大補元煎

新補一

十全大補湯

補二十

四物湯

補八

五物煎

新因三

補中益氣湯

補三一

大營煎

新補十四

小營煎

新補十五

補陰益氣煎

新補十六

五福飲

新補六

八珍湯

補十九

當歸六黃湯 寒六五

溫胃飲 新熱五

胃關煎 新熱九

加味四物湯 補九

壽脾煎 新熱十六

理陰煎 新熱三

增損四物湯 婦百十

三陰煎 新補十一

一陰煎 新補八

加減一陰煎 新補九

五陰煎 新補十三

貞元飲 新補十九

人參當歸湯 婦百十四

保陰煎 新寒一

固陰煎 新四二

一味防風散 婦百十五

右歸飲 新補三

蟠葱散 熱百十一

當歸補血湯 補四五

羊肉湯 婦七十

猪腰湯 婦七四

黃雌雞湯 婦七二

母雞湯 婦七三

決津煎 新因二

駿胞煎 新因十

通瘀煎 新因五

濟川煎 新補二一

清化飲 新因十三

失笑散 婦百四

奪命丹 婦六五

四神散 婦七五

二陳湯 和一

六安煎 新和二

五積散 散三九

抽新飲 新寒三

徙薪飲 新寒四

延胡索散 婦九八

白茯苓散 婦七八

正柴胡飲 新散六

一柴胡飲 新散一

三柴胡飲 新散三

四柴胡飲 新散四

五柴胡飲 新散五

九蜜煎 新因十二

大岩蜜湯 婦七六

迴生丹 婦六六

排氣飲 新和六

大和中飲 新和七

# 帶濁遺淋類

帶下 五八

凡婦人淋帶雖分微甚而實爲同類蓋帶其微而淋其甚者也  
總由命門不固而不固之病其因有六蓋一以心旌之搖之  
也心旌搖則命門應命門應則失其所守此由於不遂者也  
一以多慾之滑之也情慾無度縱肆不節則精道滑而命門  
不禁此由於太遂者也一以房室之逆之也凡男女相臨遲  
速有異此際權由男子而婦人情興多致中道而止止則逆  
逆則爲濁爲淋此由於遂而不遂乃女子之最多而最不肯  
去者也以上三證凡帶濁之由乎此者十居八九而三者之  
治必得各清其源庶可取效然源未必清而且旋觸旋發故

藥餌之功必不能與情實爭勝此帶濁之所以不易治也此三者之外則尚有濕熱下流者有虛寒不固者有脾腎虧陷而不能收攝者當各因其證而治之

一心旌搖心火不靜而帶下者先當清火宜硃砂安神丸清心蓮子飲直指固精丸之類主之○若無邪火而但見心虛帶下者宜秘元煎人參丸心虛白濁歌茯苓丸之類

一慾事過度滑泄不固而帶下者宜秘元煎壽脾煎固陰煎苓朮兔絲丸濟生固精丸鎖精丸金鎖思仙丹之類主之

一人事不暢精道逆而爲濁爲帶者初宜六味地黃湯或威喜

丸之屬以利之从不止者宜固陰煎苓朮兎絲丸之屬以固之

一濕熱下流而爲帶濁脉必滑數色見紅赤證有煩渴而多熱者宜保陰煎加味逍遙散或經驗猪肚丸亦佳若熱甚兼淋而赤者宜龍胆瀉肝湯

一元氣虛弱而帶下者宜壽脾煎固陰煎兎絲煎七福飲十全大補湯九龍丸之屬○若陽氣虛寒脉見微濇色白清冷腹痛多寒者宜加薑附或用家韭子丸

一脾腎氣虛下陷而多帶者宜用壽脾煎固陰煎歸脾湯補中

益氣湯之屬

立齋曰前證或因六淫七情或因醉飽房勞或因膏粱厚味或服燥劑所傷或虧損陽氣下陷或濕痰下注蘊積而成故言帶也凡此皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見證之藥○若色青者屬肝用小柴胡加山梔或濕熱壅滯小便赤澀龍胆瀉肝湯○色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥○色白者屬肺用補中益氣加山梔○色黃者屬脾用六君子加山梔柴胡不應歸脾湯○色黑者屬腎用六味地黃丸○若氣血俱虛八珍湯○陽氣陷下補

中益氣湯○濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏○氣虛  
痰飲下注四七湯送腎氣丸○不可拘肥人多痰瘦人多火  
而以燥濕瀉火之藥輕治之也

帶濁論外方

醋附丸

婦百七

氣滯帶濁腹中急痛

金櫻膏

補百一

虛勞帶濁

克應丸

婦一二八

虛滑帶濁

固元丹

同三一

赤白帶

白芷散

婦一二六

下元虛滑

益母丸

婦六四

帶濁諸病

白芍藥散

婦一二七

帶濁疼痛

白濁遺淋

五九

淫濁與帶下之不同者蓋白帶出於胞宮精之餘也淫濁出於膀胱水之濁也雖膀胱與腎爲表裏故帶濁之源無非皆出於陰分然帶由脾腎之虛滑者多淫濁由膀胱之濕熱者多此其所以有辨也○若淫濁初起而見熱澀者宜大分清飲○若初起無火而但有室塞者宜小分清飲或五苓散○若肝經怒火下流宜加味逍遙散○若肝火盛而見痛澀者宜龍胆瀉肝湯○若服寒涼利藥太過以致下焦虛寒不固者宜萆薢分清飲○若元氣虛寒下陷者宜壽脾煎補中益氣湯○若脾濕下流者宜歸脾湯六君子湯○若久而不愈肝

腎虛滑下陷者宜壽星煎秘元煎家韭子丸

淋濁論外方

滑石散

婦一二九  
熱淋

牛膝膏

和三四六  
死血作淋

三味牛膝湯

寒一二六  
血熱淋痛

婦人夢與鬼交

六十

人稟五行正氣以生氣正則正氣邪則邪氣強則神旺氣衰則  
鬼生如刺法論曰神失守位則邪鬼外干卽此類也然婦人  
之夢與邪交其證有二一則由慾念邪思牽擾意志而爲夢  
者此鬼生於心而無所外干也一則由稟賦非純邪得以入

故妖魅敢於相犯此邪之自外至者亦有之矣病因有內外則證亦有不同病由內生者外無形迹不過於夢寐間常有所遇以致遺失及爲恍惚帶濁等證亦如男子之夢遺其機一也但在女子多不肯言耳至若外有邪犯者其證則異或言笑不常如有對晤或喜幽寂不欲見人或無故悲泣而面色不變或面帶桃花其脉息則乍踈乍數三五不調或伏沉或促結或絃細或代易不常是皆妖邪之候凡此二者若失於調理久之不愈則精血日敗真陰日損乃至潮熱發熱神疲體倦飲食日減經水日枯肌肉消削漸成勞損脉見緊數

多致不救矣○凡治此者所因雖有不同而傷精敗血其病則一故凡病生於心者當先以靜心爲主然後因其病而藥之神動者安其神定其志精滑者固其精養其陰尤當以培補脾腎要約門戶以助生氣爲主若爲妖魅所侵則內當調補正氣如歸神湯之類外宜速灸鬼哭穴以驅邪氣則自當漸愈其穴以兩手大指相並縛定用艾炷於爪甲角騎縫處之務令兩甲連肉四處着火方效或七壯或二七壯兩足大指亦名足鬼眼

帶濁類論列總方 六一