

增訂
蒼柳指迷



序

嗟乎託風流之雅會貽日後之隱憂者孰有如花柳哉當其燈紅酒綠鬢影衣香極良辰美景之歡
寫訪艷尋芳之樂鮮不謂客妻繾綣足暢間情外妾姻緣無傷盛德豈料一時花夢百病叢生藏垢
納污貪歡染毒小則疳生數月戕賊其身大則害及畢生陰傷其命將見求方速效而旋發瘡瘍更
或諱疾忌醫而漸嗟殘廢縱慾片刻貽禍百年甚至近則波及蘭芳遠則毒傳苗裔每為當日輒用
練心嘉醫士憫其痛苦不忍棄遺溯其致疾之由推其流毒之自米奇方於海外消惡禍於人憫
當南方小住之時考西國獨精之法殫精竭慮勤繙繹以成書壹志凝神務安祥而立說也相從
鈔撮共事網羅編纂既成刊流用布囑為小序記厥勤功論症則極其周詳窮原竟委用法則極其
精妙達變通權肘後共仰奇方壺中咸推妙藥將使世登仁壽彌缺憾於蒼生豈徒念切痼癩起沉
迷之素疾補岐黃所未備獨著良規搜廬扁所或遺不辭互考洵香城之炯鑒亦慈海之慈航矣茲
者功成告退事畢言旋猶復特著是篇深留厚意語垂勸戒非故悚以危詞喚醒癡迷冀勿甘於疾
疾與其歡貪一刻抱終身殞命之虞何如悟徹三生免異日噬臍之恨所願回頭及早勿藥攸占須
知過眼終虛空花何戀用是挽斯民於陷溺醫林共荷鍼砭救浪子於荒淫地獄不沉香粉謹據素
簡聊表丹忱

光緒二年中和節莆田林湘東謹序

叙

慨自迎新送舊藏垢納污是最險者莫如狎妓矣而不謂好淫者安其危利其菑偏執迷而不悟抑知花柳之樂雖足移情而花柳之毒寔能敗體嘗見因妓貽害者祇貪片刻之歡娛遂博終身之荼毒樂事反成悲事怡情轉以傷情甚至波及蘭房遠及毒貽苗裔是豈天作孽乎抑亦自取禍耳迨至屢醫莫效欲蓋彌彰玷祖辱宗敗名失業而父母為之瞋怒妻子為之怨恨兄弟為之憎惡朋友為之恥笑赧顏無地四顧淒然迴思當日柳眼傳情花言挑引所謂娉婷婀娜者而今安在哉又况天道禍淫報應尤烈生前肉體固宜因淫慾而染沉疴死後靈魂更當以淫惡而墮地獄陽誅陰伐律法難逃動魄驚心癡迷當醒矣余念切痼瘵不忍坐視故特採前賢名論譯為花柳指迷書論症則窮原竟委務使周詳用法則按部就班特求精妙庶令久染惡毒者亦不至斂手待斃而已然要之備嘗艱苦始求脫夫牢籠何如不染淫邪豫遠離去陷阱所願同超慾海共出迷途是則余之所厚望矣昔馬太傳有云見色而好其心已淫誠能凜此古訓寡慾清心將見閨房之外不敢二色而内存正氣外絕邪緣又奚至染花柳惡毒哉

光緒二年歲次丙子仲春上澣美國嘉約翰識於羊城博濟醫局

此乃楊梅肉粒生於陽物頸時或糞門及婦人陰戶此有之其數或多或少其形或大或小不等色如荔枝皮時有膿水流

第一圖



此乃硬疳生於側便胞皮曾經爛過漸愈者

第二圖




此乃在小便頭連過陽物頸胞皮上面之處生疳後來漸生潤皮肉變爛此形乃已脫去機者肉漸生肉芽將有痊癒之機者

第三圖



此乃小便嘴生一硬疳微凹瘡之邊攔壁直並非斜下形如蠶豆然亦有形略圓者胞皮所生三粒亦屬硬疳惟其形微凸

第四圖




此乃陽頭皮反胞皮縮上竊緊不能褪下小便頭生疳處腫起陽具之形甚為彎曲

第五圖



此小便包頭乃胞皮發炎腫起裏便生疳有膿流出

第六圖



此乃好人大髀骨外面光潔滑澤中有似海絨質

第七圖



此乃疔毒入長骨格外腫大外面歪扭參差並不端正滑澤也

第八圖



此乃將有疔毒之長骨破開見骨中似海絨質盡變象牙色堅寔異常同骨一樣骨枝較常加倍腫大


第九圖



南京中醫藥大學圖書館藏

此乃無病者之頭顱骨外面光潔滑澤

第十圖




此乃疔毒入骨頭生膿皮骨皆爛一處或數處數年則漸變腐逐塊脫去形甚參差

第十一圖



第十二圖



此乃左右髀髌核生魚口

第十三圖



此乃楊梅肉粒生於陽物腎囊大髀裏及糞門後臀等處内外皮皆有大小長圓不等形若荔枝皮大粒者發出膿頗多

增訂花柳指迷

美國

嘉約翰輯譯

梧城

林應祥筆述

東莞

尹端模參訂

第一章花柳總論

竊思世人若一夫一婦不敢二色則共篤房幃之好雖白首同諧亦永不生花柳症蓋以夫婦乃由上帝配合所以聖誠內有云毋姦淫又聖經云行淫者害必及其身可見凡在夫婦敦倫之外一輕私合皆能生花柳之症此上帝所以刑罰淫邪者也夫瘡疔本由花柳而起其毒最易傳染者也而覆其傳染之由每乘溺管皮薄易爛之處而入及至三四十日其毒即由肉核而發由是內皮外皮悉染其毒而患症愈深若延至半載或載半則該毒並能入臟入筋入骨而成為難治之症矣西醫因其毒由淺而深即以此分作三層誠歷歷可考也該毒傳染有數端一由花柳而致一由嬰兒或飲疔毒之乳而致一由浣巾煙鎗及杯箸等物沾染而致一由該症器具未曾拭清傳染別人而致一因手沾該膿或無意按及自己身上或無意按及他人身上其毒均能乘爛處而入一因種痘而痘漿或有疔毒亦能傳染別嬰是皆宜察及也

凡宿娼易患之症有三 一硬疳 一軟疳 一白濁

硬疳與軟疳分別之處約有數端

其瘡脚硬者則

形狀略圓或長如雞卵形 瘡穴深而直 瘡脚至六日則硬 瘡底有灰色膜一層 變魚口者少 大如半邊白豆或大至三四分

其瘡脚軟者則

形略圓而不甚正

生在小便頭者穴深而直內有灰色之膜

瘡腳始終有皆軟

生在胞皮者穴淺而邊爛亦有灰色之膜

瘡能變深闊

生三四粒者多或七八粒不等

毒易入核變魚口者多

宿娼者其始數日內尚不覺有事然陽物所受疔毒快則十日即起疔症遲則數十日或七、十日乃

發出疔症

在三十日發出者居多六七

西醫曾試以小刀刺破脾肉將疔膿搽上兩三日亦能理

口覺其無事迨至十八日或遲至三十五日而所刺之處發出疔瘡即可信其為疔症無疑蓋疔瘡之膿乃有此酷毒也

瘡之膿乃有此酷毒也

第二章硬疔症

凡宿娼後數日有時小便損爛或因受婦人白帶及受一切污穢而起者疔毒每於損破處而入然硬粒未曾發出且能埋口故斯時難定其有無疔毒須至十日或遲至七十日始得疔疔實據及疔毒發出之時即在感受毒氣之處生一硬粒用兩指在皮上捻之覺硬粒在皮內移動如核然其皮尚未損破此時無論在十日或數十日內均屬此症初起之候然或醫者用丹藥搽損破處以發炎起此硬粒者數日即無消散此則猶未足為疔疔寔據也

硬粒初起數日或皮未損破即行消散然硬粒雖已消散其毒亦必由吸管傳入吸核漸入至血而毒即發於周身或皮蓋處損爛硬粒變成疔瘡所發出惡水畧稀而並非膿瘡口雖不漸生潤亦頗難埋口後來皮蓋處好回漸漸埋口其硬粒猶在須服藥至一年或數年去清其毒乃能消散昔有一人年二十三歲於八月十三宿娼嗣於次日即覺小便頭下正筋畧見炎痛過兩三日全愈及



至九月初十。小便頭下正筋處生一硬粒。後來該處之皮破損成疳。漸生至三分。大瘡穴淺而滑。無甚水流出。以指捻摸。覺硬粒尚在。又一人宿娼。後三禮拜之久。在小便胞皮內生一硬粒。其始大如白豆。後漸生至如最大之荔枝核。其胞皮亦畧腫大。以致胞頭嘴生窄。難於小便。若用針挑開。可見其皮內硬粒損破。畧有灰色惡水流出。此時已顯疳之形狀。加以兩邊髀髁核腫大。反身上發出之點。如黃銅色。尤足為生疳之實據。此人治法。醫者將其核連皮割去。因其毒已入血。故後來服藥至兩三年始消其毒。

疔瘡由患處入血

如上文所云宿娼後十日。或數十日內所起硬粒。變為疳瘡。無論生在面上身上。其毒均可由附近吸管傳至吸核。此時吸管吸核格外脹大。毒既有吸核後二十日至六十日。則毒由吸核傳入血。或傳入別腑。男人生在小便頭胞皮及女人生在陰道陰戶者多。生在溺管者。男女間亦有之。其餘生於陽物中間。或生於陽物之根。其毒傳入兩邊髀髁核。致令髀髁核腫大。有時生在左則左邊肉核腫大。生在右則右邊肉核腫大。或生左而右核腫。或生右而左核腫。然亦有一邊生而兩邊肉核皆腫大者。自宿娼後十餘日。有硬粒起。固足見疳疔寔據。即未起硬粒。惟兩邊肉核腫大。亦有疳毒大概情形。此核或大如白豆。或大如蠶豆。或如大荔枝核。乃毒由吸管傳入。以致吸核腫大。並非由發炎以致吸核腫大者。所以摩之不覺其痛。惟該核生大。或受壓則畧覺痛。若病者屬身弱血薄。或平日有瘰癧症。則該核發炎腫大。漸漸生膿。變成魚口。否則硬粒甚少。變成魚口者。以上所詳疔毒收入皮肉。有數日或數十日不覺。然後始生硬粒者。乃此症之初候。既生硬粒而毒由吸管入吸核者。乃此症之次候。毒既入吸核。以致腫大。或二十日或四十日之久。又有各吸管傳入血而遍於週

身乃此症之三候也。

疔症入皮後其患處之形狀有五。

一生硬粒所蓋之皮不損爛。一毒入皮處乾而硬逐層脫落恍類魚鱗。一硬粒黏住所蓋之皮略損。一患處脫皮凹陷成窩疔邊摩之覺硬微有惡水無甚膿。一患處脫皮生滿肉砂略湮闊或生一層灰色之膜遮蓋肉砂。以上五端皆屬硬疔每因衣服擦損或行房過多或搭丹藥或飲酒多均能令其發炎致硬粒變成膿瘡所發之膿亦有疔毒能染人者以小刀刺損大體將膿搽去該處即發出軟疔瘡除硬粒變成膿瘡之外尚有一種變成死肉者患處生濶甚速而陽物頭或成個脫落或半截脫落。

凡宿娼後小便頭無論有無損破或起水泡膿泡或數日即愈或變為似疔之瘡醫者此時未能決其是否生硬疔須俟四十日乃確。

凡疔症久不收口其故不一或因身體虛弱或因胃不消化或因垢而不浴皆能令延纏難愈也醫者於此概宜細察。

治法有數端。

一用割治。一用藥外治。一用藥內服。

割治之法

疔生在胞皮其已穿者先用暖水洗淨隨用加播匿珠一份清水四十分和勻洗之未穿者不用即加播匿水洗以兩指將瘡塊拈起用銀線綁住然後以小刀刺入分兩便割之割後用線縫好病人宜臥床三日割口以布蘸加播匿水搽之三日後將線解去尚未埋口則貼以白膏藥。

敷搭外治之法

倘若硬疳在小便頭或在陽物身左右則不宜割須用水銀黃膏或淡水銀黃膏搭之若硬疳損破或略爛宜滲以汞綠散并以連布包住又法以黑汞鉛水或黃汞鉛水洗之乃貼以白膏藥硬疳發炎變膿瘡治法宜用暖水洗或用暖水浸繼敷以麥糠又一方以鉛霜鴉片各七釐清水八錢和勻搭之又法用方散摻之患處生肉砂法治先磨以銀淡養再用上文藥水洗之然後貼以膏藥陰頭變死肉治法須以麥糠和堅炭末敷之然後摻以方散又法先用暖水洗淨次以淡礬酒搽之搭後用爛飯及加些鴉片酒鉛霜水攪勻煮熱用布敷上冷則再行煮熱連敷數次換藥時另用銀丹搭之若陰頭死肉已卸不妨輕輕剪去以免臭腐剪去後用暖水加入硝強水鴉片酒攪勻洗之或洗以藍石水亦可洗畢用布開白膏藥外敷或用汞黃膏一豬油六和勻敷之均驗至所用之藥水藥膏又須日日變換庶易見效輕症治法宜用暖水加些生鹽或鉛霜攪勻日濯數次若該疳而為該皮遮蓋則另以小水節納藥水射入洗畢再用炭匿酸臘芬大酒及加些鴉片調勻隨以軟布蘸而敷之或用藍石水蘸敷亦佳又法用汞黃膏一豬油六和勻搭之將搭時須先用藥水洗淨此膏宜日換三四次迨至該症將愈而發出肉芽則另用白膏藥塗之或用汞紅膏一豬油六和塗均妙重症致發熱腫痛治法須先用爛飯敷之或用麥糠及甘菊煮熱敷上每日宜敷數次爛飯等物一冷即宜煮熱再敷又法用暖水加些鉛霜鴉片和勻以布蘸敷但敷時其陽具須以布帶紮之令其朝上不可垂下至若陽具腫痛異常則無論有無身熱均宜服些涼劑或輕瀉服後仍須戒食熱毒等物如此則疳症雖重亦可治也鹹疳生至深潤治法則須用藥水加鴉片酒和勻洗之及將該酒內服令其止痛其或身熱口乾則另服涼劑及發表帖抑或大便艱澀則兼服清瀉帖惟疳邊屬輭

者不宜用汞質所製各藥也。若該疳而深潤愈甚，宜用暖水日浣數次，隨以汞淡養水一、清水二，調勻用筆搽上，搽畢再以敷法治之。法用樹膠水每一安士，加入硝強水三滴，鴉片酒三十滴，和勻用布蘸敷。又法用銅磺養二釐，炭匿酸八釐，鴉片末八釐，清水八錢，和勻布蘸敷上，亦妙。若在虛弱者，須再服補劑。如金雞納霜、黃連、鐵酒等類，即饗養二膳，亦宜多用肉食培養。疳症生於溺管內治法，此與生諸外者遲速不同，並與白濁相似，寔亦不同。蓋患白濁者，其毒祇在陽物，而小便則每覺痛患，此症者，其毒並在週身，而小便則不甚痛也。試驗內疳法，法用小刀先在大髀處挑破少許，隨以溺管流出之膿塗之。如歷數日而發出一疳，即得其寔據也。若非疳證，斷難傳染別處。又法以指捻其陽具，若在外面而頓覺其硬者，即知其內函有疳，及生在何處也。倘生在溺管口處，則陰頭將變為硬，並發紅色。又况患是症者，其陽具時或挺舉。恍如總動一般，舉時則痛疼異常，須服鴉片酒止之，並外用冷水淋之，令勿發動。治法先以小水節納藥水射入溺管，隨以銀丹插入搽之，由是再用布條塗淡汞黃膏，插入自能令溺管口不生窄，並可療治其症。至陽具或發紅腫，則另用爛飯及加些鴉片酒和勻敷之。

服藥之法

治疔之藥不一而足，然二百年來所有西國名醫屢治此症者，皆謂汞質所製之藥最佳，但必小服為宜，無論新起以至數月或數年，自始至終均須服此汞質之藥，以去毒水銀所製之藥約有數種。詳見西藥畧釋醫者可擇而用之，其用法詳列於下。

一法用汞鏹一釐，分三服，每日食兩三服以後漸服多些。若服至牙肉畧見紅腫，或有吐瀉，則宜稍為減輕，或歇三兩天再服。醫者須視病人身體可受得若干為度，服之一二年或三年不等。又一

法用汞藍丸六釐。鉄礦養三釐。煎去水如製枯礬之法樹膠末足用三樣和勻。為丸六粒。每日食兩三粒。宜照

上文服汞腴之法。又一法。汞綠散或火石汞粉均可照上文小服用之。又一法。用汞藍膏搽之。

其法以汞藍膏四五分。如今早敷左腮面。今晚敷右腮面。次早敷左夜。次晚敷右臉。至覺牙肉紅腫。

始略停敷。以後或用敷法。或食藥。至兩三年為度。

凡疔毒入血之後。或發在外膚。或發在內皮。或發在眼鼻口等處。無論如何發出。均照上文各法。

拘服至一年或兩三年。總以服至全愈為止。斷不可半途而廢也。

如內皮處發出小瘤。或腐爛則雖用上文之法。仍須另用藥敷患處。一方。用銀淡養六分半。

一安。和勻。用筆蘸搽患處。若杏仁核爛。亦照此法施治。或在手與面及皮膚等處。發出小粒。則用汞

黃膏。或輕淡汞綠膏。均須以豬油和勻。輕重與搽小粒患處。若不用豬油。則用花士珍油亦可。用

上文各法治疔毒之時。宜食鮮補有益之物。須忌減少不可多食。一切酸鹹煎炒及生熟烟。均不宜食。因斯時

疔毒恒令喉嚨積血。漸至生爛。及津液反常。若食生熟烟。則助疔毒。令喉積血。且耗津液。勢必轉劇。

而培增危險也。至若燒酒。亦宜切戒。

第三章 軟疳症

此症自宿娼後。速則一二日。遲則十日八日。即成軟疳。所有軟疳與硬疳。其起之遲速固屬不同。即

其毒亦有別。蓋以軟疳之膿。刺入皮肉。而發出者。亦屬軟疳。並非硬疳。瘡邊之皮。形若犬牙。參差不

齊。此症多生於陽物胞皮之邊。或在該頭之際。其上面並有薄膜一層。則或黃或灰或白。瘡底膿多而膿發

出之膿。白而畧稠。生此疳多屬二三粒。或至五六粒。其膿穴則頗淺。惟生在陰頭者。或略深耳。無論

因花柳起。或以膿刺入皮。其或瘡之候。皆分四級。始則積血。次則發炎。再次則發膿。終則爛肉。初起

皮爛處固易受毒成瘡。並偏旁為其膿所染。致生多數粒軟疔。即皮未損破之先。亦能收毒入血。致成軟疔。獨是同患疔症。亦有易治難治之分。其在身體無事。飲食如常。不食煎炒熱毒等物者。則自起以至兩個禮拜。或至五個禮拜之久。其瘡生至二分至五分大。亦能調治漸愈。全愈後其從前患處。如被大烙者。自發膿至收口。毒均能傳染別人。但將傳染發出之膿。又傳染別處。如是者數次。則其毒亦逐次減輕。繼後毒漸失去。自不能染人。其在身體殘壞。屋舍污穢。身不潔淨。入飲酒食熱毒肥膩等物者。恒令加培發炎。且膿極多。速則數點鐘。遲或數日不等。便能將陽物脫落一邊。或脫落半截。軟疔之皮。自起以至數年。均係逐漸生潤。將見患口之防。其內變為腐爛也。無論初起數日。或數十日。其毒亦能由吸管傳入吸核。漸覺吸核腫痛。數日即發膿。又數日始穿。此時已變成魚口。而膿之酷毒與軟疔之膿等。

治法 初起之時。尚非難醫。若用丹藥搽其疔口。令去腐毒。則雖有毒之瘡。亦能變為無毒。法宜洗以加播泔水。或銅礬養。分開水一安。或錐礬養。分開水一安。洗之均可。然後貼以白膏藥。此症有輕有重。輕者不必用丹藥。惟用加播泔水及鐵礬養水搽之。並貼膏藥。至若汞質所製各藥。則凡軟疔皆不宜服。辨軟疔症。乍觀之狀。雖類疔。而細驗之。究非疔者。約有數種。一生水蠟癩。一生間沙。此二症詳見皮膚新編一因發炎而流膿。一因擦爛而生瘡。

生水蠟癩則

泡大者多合聚而生。屬大水泡小者多散開而生。屬小水其始畧覺熱腫。繼或流水。或發癢。

多生於陽物之胞皮。驗身體是症而益信。

生間沙則

初起有毒粒發出。粒頗硬。畧似疳。每多環聚而生。由漸變大。所流膿水其臭異常。歷數十日尚未發膿。

因發炎而流膿。則

初起畧覺紅腫。繼由胞皮內漸發膿。

小便頭及胞皮全行發膿。

膿多而稠。不止在患口一處。

因擦爛而生罅。則

一由陰戶污穢傳染而致。一由骹垢不浴。及被衣裳觸傷而致。蓋患此症者。每多生罅。及流膿水。抑或變為小瘡。而瘡邊並有紅圈環繞。所以乍觀其狀。殊難立判也。然要之此症無毒在內。而瘡邊易非若疳症有毒在內。而瘡治難。誠使日濯數次。搽以藥水。而不久可愈也。總之欲辨疳症。須先詢明來歷。次則觀其生在陽物何處。而且發出毒粒。或小或大。及陸續如何變動。皆宜驗及。如此庶得疳症實據。

婦人陰戶生疳

多在戶口兩旁。其次則在中間。

若屬中間者又多在

至於子宮及溺管口亦間有之。醫者須先以機

簫插入。令其撐開。方易細驗。

若該疳而生致深淹。則患口之皮。每多損爛。甚至疳邊之肉亦變為硬。

大抵按其疳邊。如係軟者。則該疳略大。而多屬二三粒。如係硬者。則該疳略細。而多屬一粒。又況生在子宮口者。則尤覺堅硬如石。並發紅色。醫者概宜知也。

治法。先以水節納暖水射入洗淨。

日洗數次。

次則搽以藥水。敷以藥膏。其或作痛。則服鴉片酒止之。凡

患是症。其在壯婦。宜兼服涼帖瀉帖。其在弱婦。宜兼服補帖。倘若延纏難愈。則宜服永藍丸。或迦路

米。每服二三釐。每日三服。至二年之久為度。

妊婦生疳

若妊婦原有疳症。則分娩之時。其在醫士及接生者均宜自知提防。倘若手沾其陰戶之膿。而無意按及自己身上。或無意按及他人身上。其毒均能乘爛處而入。此所以宜知防衛也。若沾其毒。須照上法療之。

魚口症

由軟疳轉成者。魚口是也。蓋凡生在魚口。多在貼近陽具兩旁之髀。髀肉核。醫者嘗攷其症。寔由該核與陽物有吸管相通。凡有疳症者。若該核一感其毒。隨發出魚口一症。大抵此症。多自軟疳發出之日起。或數十日。即由漸而生也。如疳症生在陽物之左。則發出魚口亦在左。若生在陽物之右。則發出魚口亦在右。至疳症生在陽物中間。則左右均有魚口。惟疳生於溺管裡者。則甚少。再生魚口也。大抵患是症也。在男子則比婦人較多。凡用刀刺破魚口。蓋欲令其口濶而膿庶幾易流。惟當順刺。不宜橫刺。刺破後。再以樹膠管插入。以引膿出。令其不腹閉塞可也。大抵該膿發出。其多者。每日夜則約有七八錢。其少者。每日夜亦約有一二錢。但此時之膿。即能傳染別人也。至該膿有略稠略白者。此則易於收口。有稀而不稠。畧帶微血者。此則難於收口。若魚口內並有薄膜一層。其色或綠或黃。而遮蓋膿穴之底。如此則尤難收口也。魚口既穿。而數日內。其患口有漸生漸濶者。抑近患處之旁。其肉有變為死者。醫者皆宜細驗。又況魚口之邊。其皮每多變硬。或厚或薄。及至損爛。而參差不齊。此殆由身體之不和。亟宜用治療也。

辨症 凡疳邊屬軟者。其發膿頗多。此則或有魚口。或無魚口。若屬硬者。其發膿頗少。此則必兼生肉核。而該核或穿或不穿也。有一種肉核發腫。不作甚痛。而按之頗硬者。此蓋由疔毒而致。亦屬魚口之類也。惟此症歷數月不散。亦不發膿。而人每以為無甚大害。豈知該症蓄毒既久。而將來則

散於週身其貽害為更甚所以凡遇是症不可不亟治也復有一種紅腫作痛而膿蘊於內其患

處之大恍如雞卵者

此症若一穿破則膿多而稠也

醫者於此須當其將熟時用刀刺破以免膿日積日多而為患

愈深也

另有一種髀上生核係非由花柳而致者此則或因脚爛或因髀生惡瘡其毒由漸升上

遂令髀上肉核發炎腫痛而類似魚口但此與由疔毒而致者不同大約三四日內便可發此而且

此核甚少發膿及少穿破若足上症一愈其核自消此症因吸核感受軟疳之毒腫痛發熱數日

即發膿又數日即穿而成魚口不特硬疳發膿無如此之速亦無如是之多也

治法凡屬魚口一症須於肉核未發炎時先搽錫酒隨以薄鉛一塊蓋之再用軟布數層蓋上後

後以布帶用法纏緊如此自不能成患也又法當此症乍起即以吊膏貼其肉核令發水泡洩是

將該泡刺破隨以銀養丹少許敷之約歷兩點鐘自能將皮肉打爛變作小瘡而引症外出也發出

瘡後即以清水洗淨再用爛飯敷上

或敷以溼布亦可令其發膿倘若該膿腥臭宜用加搗匿酸洗之

如此則亦能散去其毒

而不至成為魚口也若魚口業已蘊膿而始行療治宜用麥糠甘菊花煮熟敷之敷熟後用刀刺破

再敷爛飯然後陸續搽以加搗泐水敷以藥膏自可治也至若久不收口宜用藍石或銀丹磨之如

此自能令發肉芽而再貼以收口膏可也總之凡瘡是症須再驗其身體壯弱如何壯者則兼投涼

帖弱者則兼投以補藥方易告痊

第四章發出皮膚各症

前所論花柳之症祇言其生在前陰等處而已此則論其累及週身也蓋瘡症歷三十餘日或至五

十餘日而其毒並能入藏由是或發在內皮或發在外皮或合內外皮而俱發醫者均宜細驗大抵

由瘡症而起則必兼有此患夫當瘡未收口固能發出此患即瘡症已愈而髀上吸核或尚有餘毒

亦能令內外皮發出此患甚或疳愈而餘毒尚伏內腑亦能令內外皮發出此患况又有此患者或發水泡或發膿瘡若向外人皮肉刺破少許而以此泡之水瘡之膿塗之逾數日亦能令別人發出一疳即用其血塗之亦能傳染而尤有甚者若父母有疔毒並能傳染後嗣亦足見其毒之酷而遠矣病狀 凡疔毒將發出週身之時前數日則必先覺精神困倦作事恍惚毛髮枯乾四肢微痛骨節室礙胃不消化大便乾結夢寐顛倒其迭生各弊有如此再逾數日則每向下午先發寒後發熱身出汗此殆由疔毒而發出熱症醫者尤宜細察也蓋自疔毒入臟而發出皮膚之症殆有六種一發紅色 二生鱗 三起水泡 四發膿泡 五生毒粒 六致浮腫異常 顧前三種則多發在三十日後或五十日後若當疳症乍起而一併發出者則間有之耳至後三種則發在數載後者多而發在數月後者少也以上六種遍體皆有生焉惟在額上臉上背上及臂裡髀裡等處而生耳凡患此皮膚各症多致延纏難愈此與非由疔毒而致者究不相同也醫者驗之其法有五一搜疔毒之據若陽具或有損爛及近陽具兩旁之髀髀處或有癰痕身中或有骨痛喉內鼻內及頭上或有臭爛如此則症發於皮膚者即屬疔毒所致也二驗其皮色凡有疔毒伏內則皮色恍如紅銅而並覺污垢太抵乍起症處略帶紅色漸即變黃即患處已愈尚覺暗晦而隱隱有紅黃之色也三驗其形狀凡有疔毒則患處發出之形多屬圓的顧該症初起其現出圓形數顆尚屬分明不混若由漸生大而顆顆相連則頗難分晰然要之細辨其形則究屬圓者也他如皮膚生鱗其無疔毒者該鱗則厚而多若有疔毒者該鱗則薄而少况又其色多灰其形亦圓尤易辨也至若因疔毒而生水泡其泡之形則平而弗尖及不易破又其甚者皮膚患處若有疔毒則易變瘡並易發膿而且