

癰疽用藥論
惡候主治論
瘡疽鍼烙論
潰瘍

初起治方
惡候療治方
腫瘍
潰後調攝

瘍科選粹卷二

易科選粹目錄

第二卷

用藥論第十七

托裏消毒散

薛加減法

護心散

阿膠飲子

牛膠飲

黃礬丸

千金化毒丸

國老膠

柞木飲子

萬金散

遠志酒

忍冬酒

槐花酒

保安湯

紫金錠二

轉毒散

大黃湯

單壹味

神仙截法

黑虎丹

荊芥散

練子灰

拔毒仙丹

冬方

破堅丹

商方

忍冬酒

灸法
照火方

敷藥方
敷治神方

初起湯藥十八

仙方活命飲

托裏散

瓜蒌托裏散

清熱消毒飲

升陽益胃湯

黃連消毒散

東垣

清涼飲

破棺丹

黃連解毒湯

內疎黃連湯

內托榮衛湯

東垣

內托復煎散

人參敗毒散

清心湯

濟陰湯

中和湯

回陽酒

漏蘆湯

化毒丹

內消丸

五利大黃湯

內消升麻湯

五香連翹飲

牡蠣大黃湯

和血通氣丸

內消散

六味車螯丸

止痛寶靈散

清心內固金粉散

神秘陷脉散

千金托裏散

川烏丸

二烏丸

神効托裏散

排膿十宣散

人參順氣散

茯苓開胃散

獨聖散

香附

梅花飲子

綠雲散

寸金丹

乳香止痛散

金銀花散

白芷升麻湯

托裏溫經湯

柴胡黍粘子散

黃耆柴胡湯

散毒飲子

當歸黃耆湯

萬靈丸

乳香托裏散

惡候主治論第十九

惡候療治方第二十

托裏溫中湯

附子理中湯

薑附湯

參附湯

獨參湯

人參理中湯

竹葉黃耆湯

竹葉石膏湯

加減八味丸

參朮膏

連翹散

托裏健中湯

托裏益黃湯

托裏養榮湯

托裏越菊湯

回毒金銀花湯

忍冬丸

黃耆六一湯

五味子湯

犀角膏

鍼烙論第二十一

替鍼丸

青金錠子

透膿散

一粒丹

牛旁子

獨腳虎

蜀葵子

隔皮取膿法

瘡瘍第二十二

內疎黃連湯

內托復煎湯

當歸黃耆湯

加味當歸飲

蟾酥丸

奪命丹

內托羌活湯

托裏溫經湯

內托耆柴酒煎湯

內托黃耆酒煎湯

當歸拈痛湯

升麻和氣飲

十宣散

托毒散

托裏散

瀉心湯

清涼飲

湯和退米

內消升麻湯

宣毒散

五香連翹飲

中和湯

內托散

藜豆乳香

獨聖散

香附

忍冬酒

二見

蠟凡丸

再見

托裏消毒散

清熱消毒散

黃連消毒散

連翹飲

內消散

化毒內托散

秘方拔毒散

歸耆湯

榮衛返魂丹

回陽玉龍膏

潰瘍第二十二

淋洗

生肌

去腐肉

托裏溫中湯

加味十全湯

補中益氣湯

人參養榮湯

四君子湯

六君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

黃耆人參湯
托裏當歸湯
麥冬湯

托裏散

東垣加減法

人參內托散

黃耆散

當歸補血湯
加味逍遙散

梔子黃芩湯

豬蹄湯

神異膏

止痛拔毒膏

精要生肌散
平肌散

立應散

生肌散

木香檳榔散

寒瘡斂口方

聖効散

桃紅散

黃丹散

調攝第二十四

將護

禁忌

人參內補散

托裏黃耆湯

內托散

黃耆茯苓湯

人參黃耆湯

聖愈湯

癆利選米

止痛當歸湯

和氣飲

寒熱瘧疾方

聖效散

婦科

黃氏錯

立應錯

生肌錯

木香神效錯

五淋毒膏

神效生肌錯

平肌錯

鮮子黃芩散

神效散

神效膏

黃耆錯

當歸補血散

神效散

升麻錯

婦科

八參山升錯

黃耆入參散

升麻當歸散

麥冬散

瘍科選粹卷之二

繡水陳文治輯

東吳繆希雍叅校

癰疽用藥論第十七

瘡之始發也既灼艾矣或用騎竹馬法矣勢之微者亦可自消勢之重者不免腫發苟不因其陰陽虛實酌量用藥惟執古方之已効者槩施於人不能無實實虛虛之禍變證之所由生危殆因而立至可不慎諸大率主治之法若腫高焮痛者宜先服仙方活命飲後用托裏消毒散漫腫微腫者用托

裏散如不應則加薑桂他如黃礬丸阿膠飲子牛
膠飲之類俱有消毒之功有益無損之劑也相兼
用之自無不可

若夫隨證加減之法薛立齋以托裏消毒散立論所
敘甚明雖有巧者豈能越其軌範哉茲於本方之
後條述其法醫者因是而察所患之陰陽虛實復
能以已意增損一二斯爲上工矣

托裏消毒散

治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服此
未成卽消已成卽潰腐肉自去新肉自

生

人參

黃耆

鹽水
拌炒

當歸

酒
拌

白芍藥

炒

川芎

杜裏消毒公家本
此藥歸白芍與
赤芍若銀花此
藥調雲胃氣
清溪是

白朮炒

白茯苓各壹錢

金銀花

白芷各柒分

甘草炙

連翹各伍分

薛立齋加減法

高腫愀痛熱毒也加黃連

漫腫微痛氣虛也去金銀花連翹加參朮

頭痛發熱邪在表也本方加川芎羌活

外邪在表而元氣實者暫用人參敗毒散

頭痛惡寒表虛也去金銀花連翹加參耆

發熱飲冷便秘內熱也去參芪歸朮加大黃

發熱飲熱便秘內虛也去金連加參耆歸朮

發熱飲冷小便瀇滯肝熱也去參耆加柴胡山梔
不作膿膿不潰氣虛也去金連及白芷加參朮肉
桂如不應暫用十全大補湯

腫赤作痛血凝滯也本方加乳香沒藥如不應暫
用仙方活命飲

膿出反痛氣血虛也去金連白芷三味加參耆歸
地

肉赤而不斂血虛而有熱也去上三味加熟地牡
丹皮

肉黯而不斂陽氣虛寒也去上三味加參耆白斂

官桂

漫腫不痛或肉死不潰脾氣虛也去上三味加人參白朮如不應加姜桂更不應急加附子

肉白而不斂陽氣虛也去上三味加參耆歸朮

膿多而不斂氣血虛也去上三味加參耆歸朮熟

地如不應暫用十全大補湯

飲食少思而不斂胃氣虛也去上三味加參耆如

不應暫用補中益氣湯

飲食難化而不斂脾氣虛也去上三味加參朮如

不應暫用六君子湯又不應佐以八味丸

膿少而帶赤血虛也去止三味加歸地參朮如不應暫用八珍湯加牡丹皮

忿怒晡熱而出血肝火血虛也去上三味加牡丹皮熟地炒黑山梔如不應暫用八珍湯送六味丸

面青血脹而出血肝氣虛而不能藏血也去上三味加山茱萸五味子如不應兼用六味丸

食少體倦而出血脾氣虛而不能攝血也去上三味加參耆歸地兼鬱少寐加遠志酸棗仁茯神龍罪肉如不應暫用歸脾湯

欲吐作嘔或外搽內服寒涼或痛甚或感寒邪穢

氣而嘔胃氣虛也。去上三味加藿香參朮。
飲食少思。腸鳴腹痛。腹冷泄瀉。脾氣虛寒也。去三
味加炮薑木香。

手足逆冷。脾血虛寒也。去三味加炮薑木香附片。
煎送四神丸。

飲冷作渴。熱毒也。加赤小豆知母。如不應。暫用竹
葉黃耆湯。

善食作渴。胃火也。加石膏山梔。如不應。暫用竹葉
石膏湯。

膿多作渴。氣血虛也。去三味加熟地黃五味子。如

不應暫用十全大補湯加五味子麥門冬

口乾舌燥腎氣虛也去三味加熟地山茱萸山藥

如不應兼用六味丸又不應佐以補中益氣湯

自汗內熱口乾胃氣虛也去三味加參耆歸朮如

不應暫用六君子湯

盜汗內熱口乾陰血虛也去三味加熟地麥門五

味如不應暫用當歸六黃湯

莖中痛而小便不利精內敗也去三味加山茱萸

山藥澤瀉如不應佐以六味丸

愈便則愈痛愈痛則愈便精復竭也去三味煎送