

崩漏

虞天民治一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効以椽  
斗蒼耳草根二物燒存性用四物湯加白芍花乾薑煎  
湯調服其經血自此而止再不行矣

醫學正傳

疑是丹溪宗

薛立齋治一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛小

胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此皆肝火之症肝自病則  
外症見土受剋則內症作先以四物加白朮茯苓柴胡炒  
炮炒龍膽清肺養血次用四君加柴胡白芍神麴吳茱萸  
炒黃連以土制肝漸愈惟月經不止是血分有熱以氣

一婦人懷抱不舒。腹脹少寐。飲食素少。痰涎上涌。月經頻數。  
薛曰。脾統血而主涎。此鬱悶傷脾。不能攝血歸源耳。用補  
中益氣。漸生歸脾而愈。

一婦人血崩。兼心痛三年矣。諸藥不應。每痛甚。虐症悉具。面  
色痿黃。薛曰。心主血。蓋由去血過多。心無所養。以致作痛。  
宜用十全大補湯。參朮倍之。三十餘劑。稍愈。百餘劑。乃全  
愈。

大尹王天成之內久患崩。自服四物涼血之劑。或作或徹。日  
怒發熱。其血不止。服前藥不應。乃主降火。更加脇腹大痛。  
手足俱冷。薛曰。此脾胃虛寒。致先用附子理中湯。體熱  
痛止。又用劑生歸脾。補中益氣二湯。崩血頓愈。若泥痛無

補法則誤矣

錦衣楊永興之內患血崩過服寒涼之劑其症益甚更加肚  
腹悶痞飲食不入發熱煩躁脈洪大而虛羸曰此脾經氣  
血虛而發躁也當急用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不  
效不信乃用止血降火之劑虛症蜂起始信其言緩不反  
治矣

一婦人因怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木剋脾土而  
血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸脾補十二  
湯益脾氣王用血而瘥此症若曰肝經風熱而血不寧者

燒鐵器燂酒調服無不効者

周暉內人病血山崩諸醫皆危之劉春齋用當歸一兩荊芥一兩酒一鍾水一鍾煎服立止如神續金陵瑣事

易思蘭治一婦患崩晝夜十餘次每次去血升許用止血藥愈甚卧牀月餘羸瘦食少面青爪黑氣促痰喘診之心脉平和肝脉弦大時一結脉沈而大且有力脾胃脉沈瀼瀼西尺沈而無力曰此氣鬱病也詢之果曰午餐小婢忤意發怒構疾隨以四神散與之服藥半盂未及一時頓覺神爽易曰未也明日子時分指甲變赤紅色方可救至期甲色果紅復診之左三部如前右脉微起脾胃雖沈緩而不瀼二尺仍舊謂其家曰午時血當大崩毋得驚惶以駭病

乙未佳于午時肝氣  
得令邪不能害也

者至期果然下紫黑血塊數枚自此遂止後用壯真五和  
丸調理月餘全愈次年生子用四神散以香附行氣為  
君烏藥為臣蘇梗通十二經之閉竅白芷也膈血生新血  
為佐加當歸引氣入心而生新血撫芎引氣入肝舒肝之  
鬱而平舊納新神麴引氣入脾暢脾結而統新血白朮健  
脾胃而和中氣為使以行氣為主活血輔之此治血先調  
氣之法也

吳寧先治俞氏婦血淋念載已成痼疾目幼孫出痘危臨忽  
下血兩晝夜不止汗瀉交作暈數次

思慮恐懼三  
陰並傷也脉沉弦

熱且謂何不用血藥曰血脫補氣古人精義謂有形之血不能速生。癸微之氣所當急固又脾胃氣血俱喜溫而惡寒。薑附宜服也。二劑脈漸轉前方加歸芍等血藥。忘已除然脈氣不強非三年調設未易復也。自後參耆不絕計服補劑六百餘帖膏丸數料而起并宿疾亦瘳。

一婦年月前小產經以血虛舌硬心搖汗出髮潤日夜俱熱耳閉不聞目視不見身浮々如在舟車六脈細數欲脫用人參二兩黃耆二兩白朮一兩熟地二兩當歸五兩炮薑製附子各三鈔龍骨一鈔五分一劑頓減二劑精神爽慧。

示新嘉坡  
更張之

陸肖愚治王笠雲母年四十九經事已止半年一日忽暴至  
不止昏暈厥逆脉之兩手沈微如絲急以八物湯加附子  
薑灰煎灌之半時方醒連進二大劑乃止十三七八至十  
劑六日方止後數日復崩亦昏暈或以犀角地黃湯加藕  
節同膠之屬不止脉仍沈弱以附子乾薑鹿茸俱燒灰存  
性同釜底墨酒調服之以止後以六味加四物料服之約  
二斤一年不作次年八月間又暴至昏暈更久脉之如舊  
仍以八物湯加附子連進二劑昏暈自晡至晚未甦咸謂  
必死診之決其必甦蓋氣血暴脫一時補劑未能與胃氣

甦乃牛黃丸之功公實不知也向因屢服參附致屢崩今  
人事既省此宜順氣行瘀去其病本豈可復蹈前轍曰昨  
早投大補之藥即不服牛黃丸亦甦此等脉症急宜續投  
參耆少緩恐成不救况可更以他藥乎或乃怫然而云曰  
讀父書而坑趙卒天下每多此人陸令先服並劑隨制存  
性附子等灰午後八事更進粥晚投末藥一服夜間血  
少山明日又湯散並投血遂止再服前湯十劑而瘳

陳良甫治羅安人每經行脰腹痛甚以桃仁桂枝湯一劑而  
瘳桂枝白芍生地黃各二分桃仁七枚去皮尖甘艸一分  
薑水煎

立壽治  
一婦人飲食後因怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口禁如發瘧

然吐痰如涌。灌以二陳、柴胡、山梔、枳殼。吐出酸味。神思稍醒。藥止。次日進薄粥。少許。但覺脇脹痛。此悉屬肝火熾盛。致脾氣不能運化。先用六君、柴胡、山梔、釣藤。諸恙頓退。惟四肢不遂。血崩如初。或又以為肝火未息。欲投清肝涼血之劑。此肝脾氣血俱弱。先用補中益氣湯。培其脾土。而血氣歸經。又用四物。參朮。此胡養肝筋。而四肢便利。餘見要一婦人月經淋瀝無期。作鬱怒傷肝脾。虛火動。而血不歸經。乃肝不能藏。脾不能攝也。當清肝火。補脾氣。與婦脾而道。遂散二藥。四劑而愈。

釣藤黃連熟地山危而愈

王執中治皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減而未斷因檢得耆域方如聖散用梭櫚烏梅乾薑各一兩並燒存五分性為末每服二分食前烏梅湯調下合一劑與服而疾平患甚者不過三服

資生經

有巡鋪之妻年踰五十巨飢寒而血崩與膠艾四物湯一服漸愈後自勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或云此丹燒鹿角存性為末酒調服亦佳

全上

陳良甫治一婦人崩漏暴下諸醫投薑附桂等藥服之愈甚診之六脉驤數遂用金華散煮局方龍腦雞蘇丸數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

良方

一親戚婦人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無效診之六脉微濡問服何藥云先服當歸川芎瀝血諸品丹藥服之皆不作效遂合博濟方伏龍肝散兼白礞丸服之愈全上

廖仲亨治董法山夫人患血崩由于中年鬱怒百藥不効用大劑參耆全克胎最百餘丸火煨調入藥服久之漸愈煨髮用砂礬鹽泥煉極熟將髮入罐中封固陰乾以炭火圍之俟黑烟將盡即起若青烟出髮枯不可用矣非細心人不可任蓋火候不可過也

一親戚正黃鄉內子凌夫人怨苦血崩百藥不効用五靈脂一味不拘多少炒令烟盡研末每服一水溫酒調下旋服遂安

蔣仲芳治毛氏婦經來淋瀝不斷已經三月涼血止血之藥服至五六十劑不効而口乾唇燥愈甚脉來微澹詢其大便必瀉果然所以口君二湯加熟附炮薑熟地血餘二劑而止血定客于中火浮于上脾虛而不攝血故淋瀝不已也

聶久吾婦年三十九生子月內調養未善次年春其經兩月餘不行一日忽暴至不止一二飯久即昏暈不省人事急用十全大補湯去桂倍加參耆又加熟附子炮乾薑各一

鈔灌之甦省後連服二大劑遂止十之七八又十餘日共  
服二十餘劑乃得全止次年春崩又大作比前尤甚昏暈  
更久又服前方三十餘劑尚未全安後用鹿茸炒燒存性  
研末酒調二大服數次而血止繼服補峻丸藥幸年餘不  
發然病根未除次年中秋忽又暴至前方連服二大劑血  
流如水涌吐冷痰五日昏暈初更而氣絕惟胸次微溫  
至三更用灶心土研細水調灌一二酒杯冷痰少用遂飲  
滾湯一瓊甦省漸安豈初發時服大補二劑能令生意不  
絕耶後又服峻補之劑而血止因思三年之內嘗服峻補

抑知土虛不固然後山崩今既血崩則是血大虛且血氣相依附氣虛甚則降令多升令少是以不能攝血致血不歸經而妄下不惟大補血而尤當大補氣也前丸方雖峻補不合挽入香附益母砂仁元胡等損氣之品乃令病根不除而屢作也目純用補氣血藥一料而神氣奕健二料而病根除次年遂孕而生第八兒矣

# 崩漏

劉氏媼年七十病血行如壯年事久之淋漓不斲而月餘  
耳鳴心跳頭暈目眩惡食罕眠奄奄就斃醫者不一有與  
婦脾補中者六味四物者十全八珍者諸治未為無見然  
服婦脾補中則上滿脹而面腫似不宜于補氣服六味四  
物則少腹脹而足腫似不宜于補血服八珍十全則中脘  
脹而氣急似氣兼補又不宜延診先告以不宜用補以症  
皆緣補而增也脉之沈小而澀兩關尤甚且無神曰此肝  
脾兩傷之候也以七旬之年兩月之病非補何以能瘳第

去連四劑而腫脹消諸症亦愈

姚氏婦早寡年三十餘日月事暴至遂崩漏不止勢甚猛脈之兩寸上溢兩尺甚弱據脈不可與補中益氣據症又不可不暫升提以挽其下陷先與熟地杞子白芍芩仁重劑服之果不應急以葶麻仁十數粒去殼研入麝一分捏作餅子用綠雲膏貼臍上再服前藥血去漸復少頃再服藥覺血不行即令揭去之又服數劑全愈

# 白帶

朱丹溪治陶遵外姑年七十形瘦善啖白帶食前薑湯吞六  
補丸五十九丸一二次午膳後及臨卧時各與小胃丹十五  
丸愈

胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中如有血塊者  
有如筋膜者與參朮等補血氣調脾胃後諸症皆退惟帶  
未止以樗皮丸主之

薛立齋治一婦人帶下四肢無力薛曰四肢者土也此脾胃  
虛弱濕痰下注以補中益氣湯濟生歸脾二藥治之而愈