

中

瘡
腸
經
驗
書

瘡瘍經驗全書目錄

第四卷

手心毒圖說

方二

手腕毒圖說

方二

腕疽圖說

方二

蜈蚣三串

圖說方四

發膊圖說

方一

遊丹圖說

火赤瘡圖說

方二

發背圖說

方一

魚脊瘡圖說

方一

散走流注發圖說

方三

背發兩頭圖說

腎俞發圖說

對心發圖說

方二

蜂窠發圖說

方一

經體發圖說

連子發背圖說

方一

上中下三搭手圖說

連珠發圖說

方三

上中下三發背圖說

對臍毒圖

腰疽圖說

痰注如袋形圖說

方四

暑疔圖說

方六

青疔圖說

黃疔圖說

赤疔圖說

白疔圖說

黑疔圖說

芝蔴疔圖說

氣疔圖說

冷疔圖說

方一

魚臍疔圖說

方二

瘡瘍經驗全書卷之四

宋燕山竇漢卿輯著

天都洪瞻巖

全校

桐川陳友恭

圖論方

手心毒

與手背
毒同治



此毒右手受在陰火太陽陽明氣血流於左足厥
陰經左手毒在心火太陽流於右足太陰陽明土
復生流于五行子母更相生養或因喜怒憂思寒

凝氣血阻滯不通結聚成毒當用定痛解毒之劑

紫蘇

芍藥

甘草

桔梗

枳殼

烏藥

白芷

防風

羌活

獨活

川芎

茯苓

黃芩

薄桂

乳香

威靈仙

右水姜三片煎服

后用內托流氣飲

人參

木香

乳香

當歸

川芎

黃芪

芍藥

防風

甘草

厚朴

枳殼

桔梗

烏藥

白芷

檳榔

紫蘇

姜三片棗一枚煎服外用金箍散敷之

手脫毒



此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不

流通結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之

定痛敗毒散

白芍

白芷

乳香

末

桔梗

枳殼

防風

當歸

羌活

茯苓

甘草

薄桂

靈仙

木通

金銀花

姜二棗一煎服

夏天加黃芩

內托清氣飲

人參

黃芪

紫蘇

桔梗

金銀花

枳殼

青皮

甘草

厚朴

川芎

防風

天花粉

木香

羌活

當歸

芍藥

煎同前

腕疽



此毒生于左肋下三指初起如痞日漸長大如碗
卽時就成水邊皮週圍攻結成膿形如蠱脹肚無
青筋而臍不凸只是腫脹便服二十四味流氣飲

猪苓

茯苓

藿香

砂仁

桔梗

枳實

厚朴

澤瀉

陳皮

紫蘇

當歸

青皮

香附

枳殼

赤茯苓

檳榔

木瓜

川芎

赤芍

黃芪

甘草

肉桂

木香

肉蓯蓉

水煎空心服只可一服不可再服

然後用

內托散

桔梗

厚朴

白芷

防風

人參

黃芪

香附

陳皮

川芎

甘草

官桂

當歸

赤芍

金銀花

或加木香

行藥用賜癰方

蠅蛄三串



蠅蛄三串上下三種因受濕毒傷于膚氣血傷于
腎怒氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用

流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

烏藥

甘草

芍藥

白芷

川芎

防風

厚朴

木瓜

香附

官桂

川楝子

水二鍾姜三片棗一枚不拘時服

三香內托散

人參

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

乳香

烏藥

防風

官桂

厚朴

桔梗

姜三片棗一枚水煎溫服

又方

紫蘇

枳殼

桔梗

甘草

赤芍

防風

當歸

川芎

羌活

厚朴

茯苓

前胡

生地

白芷

姜三片棗一枚不拘時服

熟加

柴胡

陳皮

半夏

定痛降氣飲

芎藭

白芷

細辛

各一兩 僵蚕 五錢生用

右爲細末煉蜜丸每服一九清茶嚙化

治法同三串及諸癰疽

發膳



蓋膈乃少陽經多氣少血厥陰因少陽有相火尤
甚于厥陰皆由多慮勞神六氣七情相感預宜防
肌肉難長暴戾之藥勿輕用之

一人右膈外側生一結核身微寒熱易怒平居奉養
甚厚診其脉俱浮大弦數重按似瀉皆因憂慮傷
血時在初秋切勿輕視宜急補以防變症宜人參
一觔作膏和淡竹瀝服之方保無虞奈病家吝費
求他醫治之以十宣五香相間服之旬日后忽大
風拔木病者發熱神思不佳其核卽稍高大似有
膿狀外腫起紅線延至肩後趨背脊入左脇下不

痛肩背重急食欲嘔急服人參膏入川芎生姜汁服盡三觔而安然瘡潰膿乾又以四物湯加人參白朮陳皮炙草生姜水煎服數劑而安此病生于春令甚難療者幸生在秋不幸暴風大作激起木中相火非人參川芎膏驟補何由得生也

人參 四兩 川芎 一兩 生姜 五錢

右剉片水四碗煎至一碗去渣重湯熬膏每次如之臨服加竹瀝

但此症之發紅腫或如粟勿以小而忽之

遊丹



越凡

微盡二動而實外...
春令...
中相...
右...
之...
但此...
如果...
以...
怒...
之...

